

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224487

UNIVERSAL
LIBRARY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سر جیکل ایڈلڈ انامی

جراحی اطلاق تشریح

جلد اول
آٹھواں ایڈیشن
مصحفہ

سرفریڈرک ٹریوزیر ونٹ
بنظر ثانی

سی سی چوئس۔ سی ایم جی ایس بی۔ ای بی بی۔ ایس سی این۔ نیڈیم۔ ڈی (ایڈیٹر) ایف آر سی ایس (مکمل)

ڈاکٹر غلام ونگیر صاحب ایم بی بی۔ ایس، منشی فاضل۔ کرن شتر تالیف و ترجمہ جامعہ کلاں
۱۳۵۶ھ ۲۴ صفر ۱۳۵۶ھ ۱۹ صفر ۱۳۵۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ کتاب مسز کمیل اینڈ کمپنی لندن کی اجازت سے
جن کو حق اشاعت حاصل ہے اردو میں
ترجمہ کر کے طبع و شائع کی گئی ہے۔

فہرست مضامین

جراحی اطلاقی تشریح

جلد اول

حصہ اول - سر اور گردن

صفحہ	باب
۱	۱ چاندلی
۱۵	۲ تجملہ کی عظمیٰ مجرا بی چھت
۴۰	۳ مشمولات تجملہ
۶۱	۴ مجر اور آنکھ
۹۶	۵ کان
۱۱۵	۶ ناک اور انفی کیفے
۱۳۴	۷ چہرہ
۱۶۷	۸ منہ زبان، خنک اور بلعوم
۱۹۳	۹ گردن
	حصہ دوم صدر
۲۳۴	۱۰ پھاتی اور اس کے اعضاء
	حصہ سوم - جارجہ اعلیٰ
۲۵۹	۱۱ کندھے کا خطہ

باب	صفحہ
۱۲	بازو
۱۳	کہنی کا خطہ
۱۴	پیش بازو
۱۵	پوہنی اور ہاتھ
۱۶	جارحہ اعلیٰ کی عصبی رسد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURGICAL APPLIED ANATOMY

جراحی اطلاق تشریح

جلد اول

حصہ اول - سر اور گردن

باب اول

چاندلی

(THE SCALP)

طالب علم کو ضرور تمام سر کا خیال رکھنا چاہئے، اور اگر اسے چاندلی کے کسی زخم کا معائنہ کرنا ہو تو اسے نہ صرف زخم کے حقیقی حدود معلوم کرنا چاہئیں، بلکہ اسے اپنے تشریح کے علم اور ان تعلقات کی مدد سے جو مریض میں مشاہدہ کردہ امارات سے زخم کو ہیں، ماتحت بافتوں اور بالخصوص شمولات مجملہ کو ایذا پہنچنے کے احتمال یا امکان کا بھی استنباط کرنا چاہئے۔ اگر جھجکا کسر دماغ یا جمجمی سوراخوں میں سے گزرنے والے عروق یا اعصاب کو مضرت پہنچنے سے پیچیدہ نہ ہو گیا ہو تو یہ اتنا عظیم الہامیت نہیں ہوتا۔ لیکن سبب مغمون کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ مناسب ہو گا کہ چاندلی اور عقلی کھوپڑی اور جمجمی شمولات کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے۔

چاندلی کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ یہ وہ نرم حصے ہیں جن سے کھوپری ڈھکی ہوتی ہے۔ اور یہ حصے طبقات میں مترتب ہیں جو عجیب محراب اور مدغی خطہ پر کسی قدر مختلف ہوتے ہیں۔ وہ نرم حصے جن سے محراب مذکور ڈھکی ہوئی ہے پانچ طبقات میں

تقسیم کئے جاسکتے ہیں :- (۱) جلد (۲) زیر جلدی شحمی بافت (۳) برجمبی عضلہ (قذالی جہبی عضلہ) اور اسکا وتر عریض (۴) ڈھیلی زیر برجمبی انصالی بافت (۵) گرد و جھجہ۔

اس لئے جب ”چاندلی اتاری جاتی ہے“ تو یہ طبقہ چہارم کی ڈھیلی زیر برجمبی انصالی بافت پر سے علحدہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اتری ہوئی چاندلی پہلی تینوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ’چاندلی‘ کی اصطلاح کو انہی تینوں ساختوں کے اتحاد تک محدود رکھنے کا رواج عام ہے۔ مگر امریکہ کے وحشی اصلی باشندوں کے مقابلہ میں جراح اس اصطلاح میں اب اکثر پانچوں طبقات کو شامل کر دیتا ہے۔


(۱) چاندلی کی جلد (شکل ۱- الف) جسم کے ہر حصہ کی جلد سے زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ یہ ہر مقام پر نیچے کے وتر عریض اور عضلہ سے زیر جلدی بافت کے ذریعہ سے مضبوطی سے منضم ہوتی ہے۔ اور اس لئے یہ اس عضلہ کی تمام حرکتوں کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔

(۲) زیر جلدی بافت ہتھیلی کی زیر جلدی بافت کے مشابہ ہوتی ہے اور

کثیر التعداد لیفی بندوں سے جن میں شحمی لٹنک کم و بیش منفرد فضاؤں میں بند ہوتے ہیں، مرکب ہونے کی وجہ سے یہ دباؤ کا بخوبی مقابلہ کر سکتی ہے (شکل ۱- ب)۔ یہ زیر جلدی بافت جسم کی عمومی سطح کی زیر جلدی بافت کے خلاف ڈھیلی وصالی نہیں ہوتی۔ چاندلی کی ڈھیلی بافت جس پر حرکت واقع ہوتی ہے، اور جس میں انقباضات کے جمع ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے جو تحفا طبقہ ہے جو برجمبی عضلہ اور گرد و جھجہ کے درمیان ہوتا ہے۔ پہلے تین طبقوں کی کثافت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں انقباضات، جو خواہ زوف کی وجہ سے ہوں یا التهاب کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے۔ لہذا بالدار چاندلی پر کوئی نلیاں نمودار نہیں ہوتیں اور نہ سطحی التهابات مثلاً سرخ بادہ (erysipelas) ہی میں اس پر ایسے التهاب کے ہر دو مشہور و معروف خصائص یعنی سرخی اور درم (سوائے بہت ہی خفیف ہونے کے) نمودار ہوتے ہیں۔

جلد پر ذہنی غدد کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اور ان سے بعض اوقات ذہنی دویرے
پارسلوئیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے دویرے جسم کے دوسرے حصوں کی نسبت چاندلی پر زیادہ
کثیر الوقوع ہوتے ہیں۔ جلدی بالیدیں ہونے کی وجہ سے یہ رسولیاں عظیم الجسامت ہونے
پر بھی نثریجی عضلہ سے باہر رہتی ہیں۔ اور اس لئے یہ ذہیلی زیر نثریجی اتصال بافت میں مداخلت

3



شکل ۱۔ یہ شکل چاندلی کے طبقات اور دماغ کے اغشیہ کی ترشش کو ظاہر کرتی ہے۔
الف۔ جلد۔ ب۔ زیر جلدی بافت بالوں کی جڑوں اور عروق کے ساتھ۔ ج۔ نثریجی عضلہ۔
د۔ زیر نثریجی لمبقتہ۔ س۔ گردنجمہ۔ ص۔ جلداری ہڈی۔ ص۔ ام جانیہ۔ ق۔ عکبوتیہ۔
ک۔ ام حونہ۔ ل۔ قشرہ۔ زیر جانی نضائیں ایک جسم کیونی کے قریب جو فوقانی
طولی جوف میں ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

کرنے کے بغیر ہی دور کیا جاسکتی ہیں، اور اسی طرح ان کو دور بھی کرنا چاہئے۔ یہ لازمی طور پر سہراست زدہ
مادہ پر مشتمل ہوتی ہیں جس کا، بلا ضرورت گہرا شکاف دے کر، بے احتیاطی سے زیر نثریجی بافت پر
اتصاف کر دینے سے خطرناک غلوی التهاب کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔
زیر جلدی بافت کے علاوہ چاندلی میں اور کسی جگہ بھی بافت نہیں ہوتی۔ اور یہاں بھی

یہ تھوڑی سی اور بند ہوتی ہے۔ اسلئے فربہ میں چاندلی میں بہت کم تغیر واقع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاندلی کے کئی سلعات بہت نادر الوقوع ہیں، اگرچہ یہ واقع ضرور ہوتے ہیں۔

بالوں کی پیوستگی چاندلی کے ساتھ جراثیمیت مجموعی اس قدر مضبوط ہے کہ یہ جسم کا تمام وزن برداشت کر سکتے ہیں۔ اور ایسا اکثر ہوا ہے کہ جب کسی عورت کے بال چپتی ہوئی مشین میں آگئے ہیں تو یہ ٹوٹے نہیں بلکہ تمام کی تمام چاندلی زیر برجمی ڈھیلی اتصالی بافت پر سے کھویری سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ تسی۔ تسی۔ چو اس کے مشاہدہ میں ایک مریض آیا ہے جو اپنی چاندلی کو کاغذ کے پارسل میں دار الشفا میں لایا تھا۔ اس کو صاف کر کے احتیاط سے ٹانگے لگانے سے اس کا ایک حصہ بچ گیا۔

(۳) زیر برجمی عضلہ (قذالی جہی عضلہ) کی کوئی خاص جراحی اہمیت نہیں۔

(۴) زیر برجمی اتصالی بافت (subepicranial connective tissue)

(tissue) جو چاندلی کا چوتھا یا خطرناک رقبہ ہے سرجن کے لئے عظیم الامہیت ہے۔ یہ ڈھیلی اتصالی بافت سے مرکب ہوتا ہے اور برجمیہ اور گرد و مجملہ کے درمیان واقع ہوتا ہے (شکل ۱-۵)۔ اس طبقہ کا ڈھیلا پن ہی زیر برجمی عضلہ کو حرکت پذیری کی اجازت دیتا ہے اور اسی وجہ سے چاندلی حادثات میں بڑے بڑے دامنوں کی شکل میں جو منہ پر بھی لٹک آتے ہیں علیحدہ ہو جاتی ہے۔ امتحانات بعد الموت میں چاندلی کو اسی ڈھیلے طبقہ پر سے اتارنے سے کھویری منکشف ہو جاتی ہے۔ یہ ڈھیلا طبقہ تمام چاندلی پر مسلسل طور پر واقع ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کا تسلسل ایک اور اسی قسم کے طبقہ سے قائم ہے جو پیشانی پر واقع ہوتا ہے، لہذا اس لیول پر واقع ہونے والے التہابی انصبابات کو سارے سر پر پھیلنے سے روکنے کے لئے کوئی چیز نہیں۔ چونکہ اسی طبقہ میں بڑے بڑے عروق خون اور عروق لطف بھی پائے جاتے ہیں، اور نیز بہت سی وریدیں وسیط وریدوں (emissary veins) کے راستے سے مجملہ کے اندر کے وریدی جنوں سے بھی ربط و راہ رکھتی ہیں اس لئے یہ ظاہر ہے کہ اس عرق پر کے التہاب سے اہم جراحی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اس رقبہ کو خطرناک رقبہ کے نام سے موسوم کرنا جائز ہے۔

(۵) گرد و مجملہ (pericranium) ہڈی سے بہت کم منغم ہوتا ہے۔ مگر

درزوں پر یہ مضبوطی سے چسپیدہ ہوتا ہے (شکل ۱-ا- سا)۔ دیگر مقامات پر سے یہ جراحی علیوں یا اتفاقی چوٹوں میں کھوپری پر سے آسانی بڑے بڑے حصوں میں اتر سکتا ہے۔

5

نیچے کی ہڈی کے لئے مغذی غشا ہونے کی حیثیت سے گردنجمہ اور دوسرے مقامات کے گرد غظمہ میں فرق یہ ہے کہ قبل الذکر کو ام جافیہ (dura mater) سے مزید تقویت پہنچتی ہے۔ گردنجمہ کو کھوپری کی محراب کے معتدبہ حصہ پر سے اتار لینے سے بھی قلیل المقدار سطحی انفشار کے علاوہ جوشاید پیدا ہو جاتا ہو تخریق نہیں ہوتا، کیونکہ حجمی ہڈیوں کی رسد خون زیادہ تر ام جافیہ (dura mater) سے آتی ہے۔ مزید برآں گردنجمہ کے اس خاصہ کی توضیح اس کے اس فصل سے بھی ہوتی ہے جو حجمی ہڈیوں کے تخریق حالت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ لمبی ہڈی میں تخریق واقع ہونے کی صورت میں رتہ (sequestrum) کی علیحدگی چند ہفتوں ہی میں واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نئی ہڈی میں گرد غظمی بالیدگی بڑے زور سے رونما ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رتہ (sequestrum) کی علیحدگی سے جو جگہ خالی رہ گئی ہے وہ پر کر دیا جائے، مگر کھوپری کی محراب میں تخریق ظاہر ہونے کی حالت میں رتہ کی علیحدگی بہت آہستہ ہوتی ہے اور نئی ہڈی طیار نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم، اور نیز رخنہ بغیر رمت ہی کے رہ جاتا ہے۔ نئی ہڈی پیدا کرنے کے لئے گردنجمہ میں ایک عمومی منقارست پائی جاتی ہے۔ اور اس لئے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی حجمی نقص کے موجود ہونے کی حالت میں، جیسا کہ علم کے بعد رہ جاتا ہے، در دوسرا ور آگے کی طرف بھٹکنے میں عدم توازن کے موجود ہونے اور دیگر شکائت کردہ علامات کو رفع کرنے کے لئے رخنہ کو پر کرنے کی غرض سے جراحی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے۔

صدغی خطہ میں چاندلی کے آٹھ طبقات شناخت کئے جاسکتے ہیں۔

یعنی (۱) جلد، (۲) سطحی ردا، (۳) کان کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے خارجی عضلات، (۴) برزجمی وتر عریض کی باریک کور، (۵) ایک باریک ردا جو صدغی حید سے صیوان الاذن کی طرف کو جاتی ہے، (۶) صدغی ردا، (۷) صدغی عضلہ، اور (۸) گرد غظمہ۔

محراب کی نسبت یہاں سطحی ردا کم گھنی ہوتی ہے اور اس میں غشی ذرات کم دکھائی دیتے ہیں۔ برزجمی وتر عریض صدغی ردا پر ایک باریک تہ کی شکل میں پھیل کر کوئی واضح کنارہ ظاہر نہیں

غائب ہو جاتا ہے۔

6 صدغی حفہ (temporal fossa) میں چربی بہت ہوتی ہے۔ اور لاغر اشخاص میں اس کے انجذاب سے وجنہ (zygoma) اور عظم العارض باہر کی طرف ممیز طور پر ابھرتے ہیں۔ وجنہ (zygoma) کے اوپر کی طرف صدغی عضلہ بہت گھنی ردا سے ڈھکا ہوتا ہے جس کا نام صدغی ردا ہے۔ یہ ردا اوپر کی طرف عظام جبہی و جداری کے صدغی حید سے اور نیچے کی طرف وجینی قوس سے پسیدہ ہوتی ہے۔ تحت صدغی ازالہ مضغطہ (subtemporal decompression) کے عملیہ میں جو دروں بھی دباؤ کو رفع کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کھوپری کے عظمی حصہ میں رختہ بنانے کے بعد اس ردا میں پھر ٹانگے لگا دئے جاتے ہیں۔ اس سے دماغ کی جواکے نیچے ہوتا ہے کسی قدر محافظت ہو جاتی ہے اور یہ باہر کی طرف زیادہ ابھرنے نہیں پاتا۔ صدغی خطہ میں جواکے انقباضات ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ وجنہ (zygoma) کے اوپر سے سطح تک آنے سے اس ردا کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ اور اس لئے جنسیجی (pterygoid) اور فکی (maxillary) خطہ جات اور گردن میں باسانی پھیل جاتے ہیں۔ خون کی زیر بجمی و عابد ریاں اس خطہ کے قرب و جوار میں نہایت ہی نادر الوقوع ہیں کیونکہ یہاں پر گرد عظمہ کھوپری سے محراب کے دیگر حصوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوطی سے منضم ہوتا ہے۔

چاندلی کے عروق خون۔ فوق مجری (supraorbital) شریان اور

اعصاب فوق مجری کٹاؤ سے جو بالائی مجری کو رکے درمیانی اور اندرونی ثلث کے مقام اتصال پر واقع ہوتا ہے اوپر کی طرف کو عموماً جاتے ہیں۔ خط وسطی کے قریب ہی (frontal) شریان اور فوق البکری (supratrochlear) عصب اوپر کی طرف کو چڑھتے ہیں۔ یہ شریان اس دامن کے لئے باعث حیات ہے جو ترقیع الانف (rhinoplasty) میں نئی ناک طیار کرنے کے لئے پیشانی سے لیا جاسکتا ہے۔ صدغی (temporal) شریان وجہی (facial) عصب کی اذینی صدغی (auriculo-temporal) شاخ کی رفاقت میں اس (شریان) کے پیچھے ہوتی ہے اور وجنہ کے قاعدہ کو کان کے عین آگے سے کاٹتی ہوئی گذرتی ہے۔ یہ عرق وجنہ (zygoma) کے دواخچ اوپر دوا انتہائی شاخوں (مقدم اور موخر) میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

ان شاخوں میں اور خاص کر شاخ مقدم میں صلابت الشریانی پیچ اکثر بخوبی نمایاں ہوتے ہیں۔ ان شاخوں میں دوالی نما اور سما (cirroid aneurysm) کے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور چاندلی کی دوسری شریانوں مثلاً قذالی شریان میں یہ اتنی کثرت سے واقع نہیں ہوتا۔ موخر اُذینی (posterior auricular) شریان اور عصب (جو وجہی سے نکلتا ہے) زائدہ علیہ اور کان کے درمیان کے میزب میں سے گزرتے ہیں اور قذالی (occipital) شریان اور کبیر قذالی (great occipital) عصب (جو دوسرے عرق میں سے نکلتا ہے) قذالی ابھار (occipital protuberance) اور زائدہ علیہ کے درمیان نقطہ کے ذرا اندر کی طرف سے چاندلی کی طرف گزر جاتے ہیں۔ چاندلی کو رسد پہنچانے والی شریانیں اور اعصاب زیادہ تر اوپر کی جانب کو قمتہ الرأس (vertex) کی طرف جاتے ہیں۔ لہذا عرقی اور عصبی رسد بافراط حاصل کرنے کے لئے علیہ جات میں چاندلی کے دامنوں کا خاکہ اس طرح طیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عریض قاعدوں پر نیچے کی طرف کو مڑ جائیں اور اس امر کا لحاظ عموماً رکھا جاتا ہے کہ رسد مذکور کا کم از کم ایک عمدہ ماخذ ان میں موجود ہو۔ جالیاتی اغراض کی بنا پر شکاف بالدار چاندلی پر بنانے کی کوشش کرنا چاہئے اور اگر کسی صورت میں معرا جلد میں مداخلت کرنا لازمی ہو تو اسے کسی لمبی خط مثلاً صدغی جید (temporal ridge) پر سے کاٹنا چاہئے۔ بعض حالتوں میں اس طریقہ سے بغیر کسی بدشکلی کے زیادہ گنجائش حاصل کی جا سکتی ہے کہ دامن بنانے کے لئے جو شکاف دیا جاتا ہے اسکے ایک جارحہ کو نیچے کی طرف کان کے پیچھے سے زائدہ علیہ کے اوپر تک بڑھالیا جائے اور پھر صیوان الاذن کے غضروفی حصہ کو منفذ سمعی خارجی (external auditory meatus) سے کسی قدر علحدہ کر دیا جائے۔ چاندلی کی کثرت عرقیت اور یہ امر کہ عروق زیادہ تر زیر جلدی بافت یعنی ڈھیلی زیر برجمبی بافت کے اندر سے اسکے قدرتی خط علحدگی سے اوپر ہی گزرتے ہیں اغتاث کا انداد کرنے کے لئے دو قوی اسباب ہیں۔ دریدہ چاندلی کے بڑے بڑے دامنوں کا رجحان مردہ ہو جانے کی نسبت زندہ رہنے کی طرف زیادہ ہوتا ہے خواہ وہ ایک وسیع حد تک جی علحدہ ہو گئے ہیں یا تقریباً الگ ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ دباؤ سے چاندلی میں گنگرین کا واقع ہونا نہایت ہی نادر الوقوع ہے۔

ان زخموں سے زخف بالعموم بہت کثرت سے واقع ہوتا ہے اور اس کار کو مکمل ہوتا ہے۔ اس امر کا انحصار اتنا تعدد عروق پر نہیں ہوتا جتنا کہ ارد گرد کی بافت کی ہستکی

اور شریانوں کے بیرونی طبقہ کے چاندلی کی ساخت کے ساتھ منغم ہونے اور اس لئے کاٹے جانے پر ان کے بخوبی باز کشیدہ نہ ہو سکنے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چمٹی کے ذریعہ سے چاندلی میں سے کسی کٹی ہوئی شریان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جریانِ خون کو بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مزاحم کچھیری پر جو اس کے نیچے ہوتی ہے دباؤ ڈالا جائے، اور کٹے ہوئے عرق کے نیچے سے سوئی گزار کر بندش لگائی جائے۔ اگر چاندلی اتفاقی طور پر پھٹ کر علحدہ ہو جائے یا عملیہ میں دامن بنانے کی ضرورت ہو تو سر کے ارد گرد و رز کا بند باندھنے یا دامن کے قاعدہ کو کسی اوزار سے، مثلاً معمولی شکنجہ کے بازوؤں میں دبا دینے سے جریانِ خون کا عارضی انسداد کیا جاسکتا ہے اور یا مددگار کا ہاتھ سے دامن کے قاعدہ پر صرف دباؤ ڈالنا ہی اتنا اعتبار اس الدم پیدا کر سکتا ہے کہ اس سے سر بن خون کا شدید نقصان ہونے سے پیشتر ہی عروق کو فرداً فرداً بندشوں سے باندھ سکتا ہے۔

جراحی میں بعض وسیط و ریدیں (emissary veins) عظیم الہمیت ہیں۔ یہ وریدیں جمجمی دیوار کے روزنوں میں سے گذرتی ہیں، اور درونِ جمجمی جوفوں اور بیرونی وریدوں کے درمیان ربط پیدا کرتی ہیں۔ بڑی بڑی وسیط وریدیں مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) سب سے بڑی ورید جو ہمیشہ پائی جاتی ہے حلی سوراخ (mastoid foramen) میں سے گذرتی ہے اور جانبی جوف (lateral sinus) کو موخر اپنی (posterior auricular) ورید یا کسی قذالی (occipital) ورید سے ملاتی ہے۔ (۲) ایک دوسری ورید فوقانی طولی جوف (superior longitudinal sinus) کو جداری سوراخ (parietal foramen) کے راستہ سے چاندلی کی وریدوں سے ملاتی ہے۔ (۳) ایک اور جانبی جوف (lateral sinus) کو موخر قذالی سوراخ (posterior condylar foramen) کے راستہ سے مل کر اور گردن کی عمیق وریدوں سے ملاتی ہے (یہ ہمیشہ موجود نہیں ہوتی)۔ (۴) چھوٹی چھوٹی وریدیں بارہویں عصب کے ساتھ مقدم قذالی سوراخ (anterior condylar foramen) میں سے گذرتی ہیں اور قذالی جوف (occipital sinus) کو گردن کی عمیق وریدوں سے ملاتی ہیں۔ (۵) چھوٹی چھوٹی وریدیں بیضوی سوراخ (foramen ovale)، سوراخ ویسلیس (foramen of Vesalius)، سوراخ ورید وسطی (foramen lacerum medium)، اور قنال سباتی (carotid canal) میں سے گذرتی ہیں اور کھلی جوف (cavernous sinus)

کو (علی السریب) یعنی وریدی ضفیوہ (pterygoid venous plexus)، 'بلعوی ضفیوہ' (pharyngeal plexus) اور داخلی و داجی ورید (internal jugular veins) سے ملاتی ہیں۔

مزید برآں بہت سی چھوٹی چھوٹی وریدیں چاندنی کی وریدوں کو عظامِ حجمہ کے ڈپلوئی (diploe) کی وریدوں سے ملاتی ہیں۔ ڈپلوئی کی چار وریدوں میں سے دو (جہی) اور مقدم صدغی (صدغی) سطح کی وریدوں (فوقِ مجحری اور عمیق صدغی) میں داخل ہو جاتی ہیں، اور باقی دو (موجر صدغی اور قذالی) جانبی جوف میں کھلتی ہیں۔ اخیر میں ایک اور مشہور و معروف ربط باقی ہے جو خارجی اور داخلی مجحی وریدی دورانات کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور یہ مجحی کے اندرونی زاویہ پر وجہی ورید کے ابتدائی مقام سے عمل میں آتا ہے۔ اس ربط میں زاویہ (angular) اور فوقِ مجحری (supra-orbital) وریدیں فوتانی چشمی (superior ophthalmic) ورید سے جو کفلی جوف (cavernous sinus) کی ایک معاون ہے متحد ہوتی ہیں۔ انفی کہفوں کے اندر کی اور اذینِ سطی کی وریدیں بھی اسحیہ (meninges) کی وریدوں سے ربط و راہ رکھتی ہیں۔ ان مختلف مجاری اور بہت سی ان وریدوں میں سے جو بہت ہی کم واضح ہوتی ہیں، التہابی اعمال کھوپری کی سطح پر سے اندر تک پھیل سکتے ہیں، چنانچہ چاندنی کے سرخ بادہ (erysipelas) اور اس کے انتشاری نتیجے اور مجحی ڈپلوئی کے نتخ اور اسی قسم کے دوسرے عوارض میں سرأت بعض اوقات عظامِ حجمہ کے متوسط طبقہ تک پھیل جاتی ہے، یا اس سے التہاب سمایا (meningitis) یا وریدی جوفوں میں علقیئت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر وسیط وریدیں موجود نہ ہوں تو چاندنی کے تضرعات اور امراض سے پیدائندہ خطرہ نصف رہ جائے۔

بالائی لب اور ناک کے اطراف کے شب چراغوں (carbuncles) یا دوسری سرایتوں سے کفلی جوف کی سرأتی علقیئت کے پیدا ہونے کا خاص طور پر امکان ہوتا ہے۔ گاہے گاہے مرض کی سرأت وسیط ورید کے ذریعہ سے اندر کی طرف سے باہر کی طرف کو بھی پھیل جاتی ہے۔ ایرحسن (Erichsen) ایک مریض کے متعلق اطلاع دیتا ہے کہ اس میں طلوی ورید کے راستہ سے علقیئت زدہ اور متقیع جانبی جوف (lateral sinus) میں سے پیپ خارج ہوتی تھی اور اس سے ایک عنقی خراج پیدا ہو گیا تھا۔

کھوپری پر بعض وریڈی سلعات (venous tumours) بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ سلعات وریڈی خون کے اجتہاتات پر مشتمل ہوتے ہیں، جو گردِ ججمہ کے شیخے ہوتے ہیں، اور کھوپری کے سوراخوں کے راستہ سے فوتانی طولی جوف (superior longitudinal sinus) سے ربط و راہ رکھتے ہیں۔ ان کا محل وسطی ہوتا ہے اور دبانے پر یہ رجعت پذیر ہوتے ہیں۔ نیز ان میں ایک خفیف سانبضان بھی موجود ہوتا ہے جو دماغ سے آتا ہے۔ یہ سوراخ بعض اوقات حادثات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ہڈی کے مرض یا کسی جسم کیمپوئی (Pacchionian body) پر ذبول واقع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور چند کسی دوائی مٹاؤسیط وریڈیا ججمہ کے کسی خلقی نفق کی وجہ سے جو خاص طور پر جدراری سوراخ (parietal foramen) کے نزدیک ہوتا ہے رونما ہوتے ہیں۔

تذالی اور موخر جدراری خطہ جات کے عروق لمف تذالی اور علی عدد میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے ان خطہ جات کا لمف جانبی فوقانی عمیق عنقی عدد (lateral superior deep cervical glands) میں چلا جاتا ہے۔ لہذا مرض نقمل الراس (pediculosis capitis) میں جس میں کہ طفیلیے خاص کر تذالی حصہ کو سرائت زدہ کرتے ہیں، ان تمام عدد کے کلانی یافتہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ جبہ اور مقدم جدراری خطوں کے عروق لمف نکھنی عدد (parotid glands) میں جاتے ہیں۔ مگر جبہ خطہ کے بعض عروق وجہی عروق لمف سے لمباتے ہیں، اور زیر فکی عدد (submaxillary glands) میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں (دیکھو شکل ۵۵ صفحہ 288)۔


چاندلی کے بڑے بڑے اعصاب مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) حرکی (motor) - (ا) وجہی (facial) عصب کی عددی (temporal) شاخیں وجہ سے اوپر کی طرف کو جاتی ہیں، اور تذالی جبہ عضلہ (occipito-frontalis) کے پیٹے اور عضلہ محیط البغضیہ (orbicularis palpebrarum) اور عضلہ کٹشہ حاجبہ (corrugator supercilii) کو رسد بہم پہنچاتی ہیں۔ (ب) وجہی عصب کی موخر اذینی شاخ طمی زائدہ کے سامنے کی طرف پر سے گذر کر کان کے عین پیچھے سے اوپر کی طرف کو جاتی ہے اور اس کے ساتھ موخر اذینی شریبان ہوتی ہے۔ یہ تذالی جبہ عضلہ (occipito-frontalis)

کے غذائی پیٹے کو رد نہیں جاتی ہے۔

(۲) حسی (sensory)۔ تہرہ اور چاندلی کی حسی رسد شکل ۲ میں دکھائی گئی ہے۔

کبیر قذالی (great occipital) عصب دوسرے عنقی عصب کی موخر ابتدا کی قسمت



شکل ۲۔ چہرہ اور چاندلی کے عصبی رقبہ جات۔ ۱۔ پانچویں جمجی عصب کی پہانت کی تقسیم۔
۲۔ انفی شاخ۔ ۳۔ فوق الکبریٰ۔ ۴۔ فوق عمری۔

ب۔ ب۔ دوسری قسمت کی تقسیم۔ پ۔ زیرِ محجر شاخ۔ ب۔ ماضی شاخ۔ ب۔
صدغی شاخ۔

ج ج تیسری قیمت کی تقسیم۔ ج۔ ذوقی شاخ۔ ج۔ بوقی شاخ۔ ج۔ ادیبی شاخ۔
۱۔ کبیر قدالی کارقبہ۔ ۲۔ صیف قدالی کارقبہ۔ ۳۔ کبیر اذیبی کارقبہ۔ ۴۔ سطحی عشقی
کارقبہ۔ ۵۔ تیسرے قدالی کارقبہ۔

سے، صغیر قذالی (small occipital) عصب دوسرے عقیقی عصب کی مقدم ابتدائی قسمت سے، کبیر ازینی (great auricular) عصب دوسرے اور تیسرے عقیقی اعصاب سے

اور تیسرا قذافی عصب تیسرے عصب کی موثر ابتدائی قسمت سے پیدا ہوتا ہے۔

پانچویں عصب کی شاخوں میں اکثر شدید وجع العصب (neuralgia) پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا علاج اب زیادہ تر یا تو بذریعہ عملیہ اور یا انخُل کے اشتراب سے عقدہ گیر سی (Gasserian ganglion) میں مداخلت کرنے سے کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اس باب میں کیا جائے گا جس میں چہرہ کا ذکر کیا گیا ہے (صفحات 137، 144)۔

چاندلی کے زخم - چاندلی کی بافتوں کے بستہ اور تنیدہ ہونے اور

اسکے نیچے کھوپری کے موجودہ ہونے کی وجہ سے ایک دلچسپ جراحی اور طبی قانونی نکتہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کند شے مثلاً گریڈی یا پولیس کے سپاہی کے ڈنڈے سے ماری ہوئی ضرب سے ایسا چراہو ازخم پیدا ہو سکتا ہے جس کے دیکھنے سے یہ معلوم ہو کہ یہ کسی تیز آواز سے کٹا ہوا زخم ہے۔ یہ حادثہ بزرگالہ کے چمڑے کے دستانوں کے پھٹنے کے مشابہ ہے جبکہ ان پر ایسی حالت میں ضرب لگے جبکہ یہ ڈگیوں پر کھچ کر تنے ہوئے ہوں۔

اگر زخم صرف جلد اور زیر جلدی بافت پر اثر انداز ہوا ہے تو اس کے لب ہرگز کشادہ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر زخم گہرے کٹ گیا ہو تو زیر زخمی طبقہ کے ڈھیلے پن اور عضلہ بزخمیہ کے انقباض کی وجہ سے زخم کے کناروں کے دور تک علیحدہ ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر زخم عضلہ مذکور کے طویل محور سے مستعرض واقع ہوا ہو تو توبوں کی کشادگی کے خاص طور پر معتد بہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔

جریان خون کے کثرت واقع ہونے اور اسکے بند کرنے کے طریقہ پر بحث کجاچکی ہے (صفحہ 7)۔ مزید برآں جس آسانی سے چاندلی کے زخم مندمل ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے۔ چاندلی کے زخم کا علاج کرنے میں زخم کو اصیت ط سے صاف کرنا اور بعد از اسکے متعلق مکمل تحقیقات کرنا خاص طور پر ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے اکثر معدم حص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن زخموں سے ہڈی معرا ہو جائے یا جو خطرناک زیر زخمی طبقہ میں کھل جائیں وہ صفحہ 4 پر دئے ہوئے اور مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

چاندلی کے خطہ کے خراجات (۱) بزخمی وتر عریض کے اوپر (۲) وتر عریض

اور گردنجمہ کے درمیان، اور (۳) گردنجمہ کے نیچے واقع ہو سکتے ہیں۔ محل اول میں جو خراج پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے اور نسبتاً قلیل الہمیت ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر چاندلی کی بافت کی کثافت ایسی ہوتی ہے کہ قلعی مہایت مشکل سے پھیل سکتا ہے۔ مگر دوسرے محل کا قلعی (وترعریض کے نیچے کی ڈھیلی بافت کا) بعض اوقات بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جب پیپ وترعریض اور گردنجمہ کے درمیان ایک دفعہ رستہ بنا لیتی ہے تو اس بافت کا ڈھیلان خراج کے پھیلاؤ کے لئے ہر قسم کی سہولت پیش کرتا ہے۔ اس رقبہ کا قلعی بعض اوقات تمام چاندلی کے نیچے پھیل جاتا ہے۔ اور ایسی حالتوں میں جبکہ قلعی شدید ہوتا ہے اور اس کا تدارک نہ کیا گیا ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاندلی خراج پر اس طرح واقع ہے جیسا کہ کسی قسم کے آبی بستر (water-bed) پر رکھی ہے۔ چونکہ چاندلی کے زخموں میں وترعریض اکثر کٹ جاتا ہے، اور تقصر کے بعد قلعی کے واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لئے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان ضررات کے عظیم ترین خطرو کا وار ودار اس قسم کے قلعی کے اسی ڈھیلی اقصالی بافت کے رقبہ تک پھیل جانے پر ہوتا ہے۔ چاندلی کے زخم میں غمخوری سی ہڈی کے معاہدہ جانے کی اسکو نقصان پہنچنے کے لحاظ سے، اتنی اہمیت نہیں، جتنی کہ چاندلی کا خطرناک رقبہ کھل جانے کی ہے کیونکہ وترعریض یقینی طور پر کٹ جاتا ہے جب اس رقبہ میں قلعی واقع ہو جاتا ہے تو اس کی تحدید صرف قذالی جبہی عضلہ (occipito-frontalis) اور اس کے وترعریض کی پیسیدگیوں ہی سے ہوتی ہے۔ لہذا وہ زبردترین مقامات جن پر سے پیپ خارج کیجا سکتی ہے اس خط پر واقع ہونگے جو سر کے گرد سامنے کی طرف سے ابروؤں پر سے شروع ہو کر وجہ کے ذرا اوپر سے گزرتا ہوا عظم قذالی کے فوقانی منحنی خط پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی جبکہ خراجات چاندلی کے خواہ کتنے ہی وسیع رقبہ کی بھی تقطیع کیوں نہ کر دیں، چاندلی تباہ نہیں ہوتی، کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اسکی رسد خون اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چاندلی کا خراج اکثر بہت آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے کیونکہ اس کی دیواروں کو زخمی عضلہ کی متواتر حرکت سے مکمل آرام نہیں ملتا۔

گردنجمہ کے نیچے جو خراجات واقع ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ایک ہڈی تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ کیونکہ درزوں پر اس غشا کے اندر چلے جانے سے قلعی زیادہ وسیع پیمانہ پر پھیل نہیں سکتا۔

چاندلی کے خطہ کے دموی سلعات (haematomata) یا سلعات خون

(blood tumours) انہی مقامات پر واقع ہوتے ہیں جن پر خراجات واقع ہوتے ہیں۔ خون کی وعابدری و ترعریض پر لازمی طور پر محدود ہوتی ہے مگر اسکے نیچے یہ بہت وسیع بھی ہوتی ہے۔ خوبی قیمت سے و ترعریض اور گردِ ججمہ کے درمیان کی خلوی بافت میں بہت کم عروق خون ہوتے ہیں۔ لہذا اس بافت میں بڑی بڑی وعابدریاں قلیل القوت ہوتی ہیں۔

گردِ ججمہ کے نیچے خون کی جو وعابدریاں واقع ہوتی ہیں انکو راسی دموی سلعات (cephalæmatomata) کے نام سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ لازمی طور پر ایک ہی ہڈی تک محدود ہوتے ہیں اور عموماً بوقت پیدائش سر پر دباؤ پڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ایک عظیم جداری پر بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی ہڈی ہے جو دباؤ پڑنے کے لئے شاید سب سے زیادہ معرا ہے۔ لڑکوں میں ان کے کثرت سے پائے جانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زینہ جنین کا سر بڑا ہوتا ہے۔ زندگی کے ابتدائی حصہ میں ایسی وعابدریوں کو گردِ ججمہ کے ڈھیلے ہونے اور ماتحت ہڈیوں کے نرم اور کثیر العروق ہونے سے مدد ملتی ہے۔

باب دوم

ججمہ کی عظمیٰ محسرابی چھت

(THE BONY VAULT OF THE CRANIUM)

سنختی اور لیجک - جراحی نقطہ نگاہ سے جو لمبھی کھوپری میں پائی جاتی ہے وہ عظمیٰ کھوپری میں نہیں، بلکہ اس کے مشمولات اور اس کے سوراخوں میں سے گزرنے والی ساختوں میں پائی جاتی ہے۔ اسکے کسر کی جیسا کہ باب اول میں ذکر کیا گیا ہے کچھ اہمیت نہ ہوتی اگر اس کے ساتھ دماغ، طبعی ساختوں، یا عصب بصری کو اس کثرت سے نقصان نہ پہنچتا۔ ایک مریض میں جو میرے (تبی - سی چو اس) مشاہدہ میں آیا کھوپری کے قاعدہ کے کسور ہونے کی صرف یہی ایک واقعہ سریری امارت پائی جاتی تھی کہ اس کی ایک آنکھ میں عصبی فقدان بصارت موجود تھا۔ مریض کو اس وقت تک اس کا علم بھی نہیں تھا جب تک کہ اس امر کا مشاہدہ نہیں کر لیا گیا کہ اسکی آنکھ کا حادثہ مثبت اور متسع ہے۔ اسکے بعد ایک امتحان سے ظاہر ہو گیا کہ اس آنکھ کی تمام بنیائی ضائع ہو چکی ہے، اور بصری ذلول موجود ہے۔ ایک اور مریض میں صرف یہی ایک امارت پائی جاتی تھی کہ طبعی غشا (tympanic membrane) میں ایک دریدگی موجود تھی جو اذنی منظار (aural speculum) سے دکھائی دیتی تھی۔ جریان خون صماخ تک نہیں پہنچا تھا۔ سکتہ کے زیادہ دیر تک رہنے سے مریض کا انتقال ہو گیا اور

لاش کا امتحان کرنے پر کھوپری کے قاعدہ میں ایک عریض انشقاق پایا گیا۔

کھوپری کو استوار صند و قجہ تصور نہ کرنا چاہئے۔ تمام عمر اس میں معتد بہ لچک موجود رہتی ہے۔ چوٹوں سے اس میں کافی بدشکلی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعد ازاں پھر یہ اپنی اصلی شکل پر آ جاتی ہے۔ دماغ کو تضرر پہنچنے کی توضیح جس میں کھوپری کا کسر واقع نہیں ہوتا اسی طرح کیجا سکتی ہے۔ زندگی میں کھوپری، دماغ، اغشیہ اور سیال سے بالکل پُر ہوتی ہے۔ بدشکلی پیدا کرنے والی چوٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو دماغی بانفت میں ایک معین دریدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور یا دماغی دوران خون میں ایک ایسا عارضی تغیر واقع ہو جاتا ہے جس سے پہلے عدم دمویت اور بیہوشی پیدا ہو جاتی ہے اور بعد ازاں امتلا اور خراش پذیری ظاہر ہوتی ہے۔ اغلب ہے کہ ارتجاج (concussion) کے مظاہر کی توجیہ انہی دورانی اغذلات سے ہوتی ہو۔

15


زمانہ طفولیت میں کھوپری میں بہت لچک پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ہڈیاں خود نسبتاً نرم ہوتی ہیں اور ان میں باجستگی کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ لہذا کھوپری بعض اوقات مسن ہونے ("ٹنگ پانگ گیند کے کسور") کے بعد بھی بعض اوقات پھیل سکتی ہے۔ زمانہ شیر خوارگی میں درزوں پر ہڈیوں کے حرکت پذیر ہونے اور بافوخات کی کٹا دگی کی وجہ سے بعض اوقات بہت بدشکلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ پیدائش کے دوران میں ہوتا ہے۔ اور جب بدشکلی پیدا کرنے والی طاقت کا اثر باقی نہیں رہتا تو کھوپری جلد ہی اپنی طبعی شکل پھر اختیار کر لیتی ہے۔ کم عمر بچہ میں کھوپری کے تغیر پذیر ہونے کے خاصہ کی توضیح سر کی اس انتہائی بدشکلی سے ہوتی ہے جو امریکہ کی بعض اصلی قومیں اپنے بچوں کے سر میں زمانہ شیر خوارگی میں اس کو پی سے کس کر باندھ دینے سے پیدا کر دیتی ہیں۔ رائل کالج آف سرجنز میوزم (Royal College of Surgeons Museum) میں امریکہ کے اصلی باشندوں کی بہت سی وچیٹے سر کی کھوپریاں موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی مصنوعی بدشکلی کس انتہائی درجہ تک پہنچائی جا سکتی ہے۔

ساحت - کھوپری اندر اور باہر کے دو الواح اور ایک عروق دار طبقہ متوسطہ یعنی ڈپلوئی (diplœ) سے مرکب ہوتی ہے۔ بیرونی لوح سے گرد و تجمہ درزی خطوط پر منقسم ہوتا ہے، اور اندرونی لوح سے جافیہ مضبوطی سے چپکا ہوتا ہے۔ اندرونی لوح بیرونی کی نسبت زیادہ باریک اور زیادہ پھونک ہوتی ہے۔

درزوں کا محل وقوع - سیما (bregma) یا اکیلی اور سہی درزوں

کا مقام اتصال اس خط پر واقع ہوتا ہے جو سر کے طبعی وضع پر ہونے کی حالت میں منفذ سمعی خارجی کے عین سامنے سے عموداً اوپر کی طرف کھینچا جائے (شکل ۳)۔

قمدو (lambda) یعنی قمدوی اور سہی درزوں کا مقام اتصال قذالی ابھار



شکل ۳ - وسطی سحائی عروق اور جانبی جوف کے ترخان کے لئے مقامات۔

(occipital protuberance) کے پ ۲ انچ اوپر خط وسطی میں واقع ہوتا ہے (شکل ۳)۔

قمدوی درز (lambdoid suture) کو یہ خط ایک کافی حد تک ظاہر کرتا ہے جو قمدوہ (lambda) سے زائدہ حلیہ کے راس تک دونوں طرف کھینچا جائے۔


اکیلی درز (coronal suture) اس خط پر واقع ہوتی ہے جو سیما (bregma)

16

سے لیکر وجہی محراب (zygomatic arch) کے وسط تک کھینچا جائے۔ اس خط پر جسبی عارضی (fronto-malar) (جسبی وجہی: fronto-zygomatic) اتصال سے پ ۱ انچ پیچھے کی طرف اور اسکے لیول سے پ ۱ انچ اوپر پرینہ (pterion) ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس پر

چار ہڈیاں ملتی ہیں۔ یعنی عظم صدغی کا فلسمان (squama) عظم وتدی (sphenoid) کا بڑا پر، عظام جمہی و جداری (شکل ۳) فلسمانی درز (squamous suture) کی چوٹی و جنبہ سے ۳۱ انچ اوپر ہوتی ہے۔

بعض درزوں اور بالخصوص قمدوی درز (lambdoid suture) میں چھوٹی چھوٹی بے ڈھنگی ورمی (Wormian) یا ورمی ہڈیاں (sutural bones) فحسی ہوتی ہیں۔ اور یہ بعض اوقات غلطی سے کسر سے پیدا شدہ ہڈی کے ٹکڑے تصور کر لی جاتی ہیں۔ چھلکے کی طرح



شکل ۴ - نوزائیدہ بچہ کی کھوپڑی، اوپر سے۔

کی ایک درزی ہڈی ہوتی ہے جس کا نام بے پریمی ہڈی (epipteric bone) ہے۔ اس کا خاص طور پر ذکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بعض اوقات وسطی سمانی (middle meningeal) شریان پر تنفان کرتے وقت ملتی ہے۔ یہ عظم جداری کے مقدم زیرین زاویہ اور عظم وتدی کے بڑے پر کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑے پر کی نوک علیحدہ ہو گئی ہے۔ سرجن کے لئے درزوں کے مہلات وقوع اور انہی شکلوں کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ چاندلی کے زخم یا جمہی شعاع نگارش (radiogram) کا امتحان کرتے وقت کوئی درز غلطی سے کسر تصور نہ کر لیجائے۔

17

جمہینی درز (metopic suture) (شکل ۴) عمر کے ابتدائی حصہ میں، پانچویں

چھٹے سال کے قریب، ہند اور غائب ہو جاتی ہے مگر یہ کبھی کبھی سن بلوغ میں بھی برقرار رہتی ہے (یورپی کھوپریوں کی تقریباً ۶ فی صدی تعداد میں)۔

تقسیمی موضوع میں یا فوختات (fontanelles) کے تمام شائبات اور کھوپری کے دیگر غیر متعظم حصے (شکل ۴) دو سال کی عمر سے پیشتر غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر کسٹ (rickets) اشتقاقی دماغ (hydrocephalus) اور مجموعی ترقوی ناقص نیکون عظم (cranio- (cleido-dysostosis) میں یہ یکسر رہتے ہیں۔ جبھی یا مقدم یا فنج سب سے آخر میں بند ہوتا ہے۔ اور قذالی یا موخر پیدائش کے وقت ہی بھرا ہوتا ہے۔

اشتقاقی دماغ (hydrocephalus) میں بطنوں کا امتصاص عام طور پر جبھی یا فنج میں سے یا اسی کے قریب سے کیا جاتا ہے۔ سوئی یا تو یا فنج کے اطراف پر طولی جوف سے بچنے کے لئے خط وسطی کے کافی فاصلہ پر داخل کی جاتی ہے اور یا اکیلی درزیں سے اس کے نقطہ وسطی کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر گزار دیا جاتا ہے۔ اشتقاقی دماغ (hydrocephalus) کے شدید واقعات میں محراب کی اکیلی اور دوسری درزیں بہت کھلی ہوتی ہیں۔

کھوپری کی دبازت کھوپری کے مختلف حصوں میں بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس اختلاف کے دوسرے اسباب، عمر، صنف، ذاتی شخصیت، نسل اور مرض ہیں۔ چنانچہ صدی خطہ قذالی یا جبھی ہڈیوں یا زائیدہ حلیہ سے عام طور پر تپلا ہوتا ہے۔ زمانہ طفولیت اور پرانہ مالی میس بلوغ کی نسبت تمام کھوپری زیادہ پتلی ہوتی ہے۔ آدمیوں کی ہڈی عورتوں کی نسبت زیادہ بستہ اور زیادہ دبیز ہوتی ہے۔ آدمیوں میں فوق محجری فرازا اور قفائینہ (inion) عام طور پر زیادہ اچھی طرح سے نمایاں ہوتے ہیں۔ جشیوں کی کھوپری نسبتاً موٹی ہوتی ہے۔ اور امریکہ کے بعض اصلی باشندوں میں ہڈی پتلی اور چھوٹک ہوتی ہے۔ ہزال حجمہ (craniotabes) اور پیرٹ کے کریب (Parrots' nodes) علی الترتیب کھوپری کے مرض کی وجہ سے تپلا اور موٹا ہونے کی مثالیں ہیں۔ اوسط دبازت ۵ ملی میٹر (۱/۲ انچ) ہوتی ہے۔ اور یہ عمر کیا تھا ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ پیدائش کے موقع پر عظم جداری اعلی میٹر (۱/۲ انچ) سے ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ تین سال کی عمر پر طبقہ متوسط پیدا ہوتا ہے اور کھوپری کی بیرونی لوح اندرونی لوح سے ممیز ہو جاتی ہے۔ بوڑھے آدمیوں میں عظم جداری کی دبازت ۵ ملی میٹر سے لیکر ۱۰ ملی میٹر تک (۱/۲ تا ۵/۸ انچ) ہوتی ہے۔ کھوپری کے سب سے زیادہ موٹے حصے قذالی الجھار (occipital

(protuberance) جہاں اسکی تراش ۱۲ یا ۱۳ ملی میٹر ہوتی ہے (زائدہ صلیب پر اور عظم جہی کے زیرین حصہ پر)۔ زیرین قذالی حضروں (inferior occipital fossæ) اور محسّر (orbit) پر یہ بڈی بہت پتلی ہوتی ہے۔ اور عظم فلسانی (squamous bone) پر سب سے زیادہ پتلی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بعض جگہ دہانت میں ملاقاتی کارڈ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور لاشعاعوں کے فوٹو گراف میں یہ ایک نیم شفاف رقبہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مزید برآں جو فوں (sinuses) اور ان میز ابوں پر جو وسطی سحائی (middle meningeal) عروق کے لئے ہوتے ہیں، ہڈی پتلی ہوتی ہے۔ عظم جداری کے مقدمہ تحتانی زاویہ پر یہ خاص طور پر پتلی ہوتی ہے۔ ترخان کرتے وقت یہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اندرونی لوح ہمیشہ بیرونی لوح کے متوازی نہیں ہوتی۔

جمجمی ہزال (craniotabes) ایک مرض ہے جس کو بعض کاحست

(rickets) سے اور بعض موروثی آتشک سے منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ بالعموم عظم قذالی کے بالائی یا لوجی حصہ اور عظام جداری کے ہم پہلو حصوں اور بالخصوص انکے موخر تحتانی زایوں پر پایا جاتا ہے۔ ہڈی بعض مقامات پر بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ اور اسلئے ماؤف حصہ جھلی کے کاغذ (parchment) یا کارتوس کے کاغذ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہڈی زیادہ تر اندرونی لوح اور طبقہ متوسط کے صف سے پتلی ہوتی ہے اور گڑھے ان نشانات پر واقع ہوتے ہیں جو ان تلافیف سے پیدا ہوتے ہیں جو پہلے پہل بنتی ہیں۔

چیرٹ کے کریب (Parrot's nodes)۔ موروثی آتشک کے بعض مریضوں میں یہ مسامدار ہڈی کے مدور ارتفاعات کی مانند دکھائے دیتے ہیں، اور مقدم یا فوخ کے قرب و جوار میں جہی اور جداری ہڈیوں پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ کباب (bosses) ایک صلیب نما نشیب سے ملحدہ ہوتے ہیں جو ایک طرف تو جہی اور سہمی درزوں سے اور دوسری طرف اکلیلی درز سے بنتا ہے۔ ان کی مجموعی شکل کی وجہ سے ”گرم صلیبی بن کی مانند سر“ (hot-cross-bun head) کی اصطلاح کا استعمال کیا گیا ہے اور ایم پیرٹ (M. Parrot) انکو سرین نما (natiform) ارتفاعات کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

التهاب العظم تشوہی (osteitis deformans) میں کھوپری کی محراب

ہڈیوں میں معتدبہ عمومی وبازت پیدا ہو جاتی ہے۔ لمبقتہ متوسطہ اور الواح کے درمیان واضح امتیاز موجود نہیں رہتا۔ کھوپری زیادہ بڑی اور زیادہ گول ہو جاتی ہے۔ اور صدغی حفراست (temporal fossae) بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

بغلاف اس کے کبرا الجوارح (acromegaly) میں کلانی خاصکر عضل

چسپیدگیوں کے قریب واقع ہوتی ہے اور عظمی حیود زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔

کھوپری کا نمو۔ اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو کھوپری کا قاعدہ غضروف


میں نمونہ پاتا ہے اور اس کا قبضہ غشا میں جو حصے غشا میں بنتے ہیں وہ تکمیل یافتہ کھوپری میں مندرجہ ذیل ہوتے ہیں۔ جبھی اور جدار ی ہڈیاں۔ صدغی ہڈی کا فلسفانی وجہی حصہ اور قذالی ہڈی کے لوحی حصہ کا بیشتر رقبہ۔ ان دونوں حصوں کا درمیانی فرق بعض اوقات مرض میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض ناقص النمو کم عمر شیر بھروں کی کھوپریوں میں جو اب رائل کالج آف سرجنسنز کے میوزیم (Museum of the Royal College of Surgeons) میں موجود ہیں، غشائی ہڈیوں میں معتدبہ مسا دار وبازت پائی جاتی ہے اور قاعدہ طبعی ہے۔ استسقاءے دماغ (hydrocephalus) میں صرف وہی ہڈیاں ضرورت سے زیادہ پھیل جاتی ہیں جو غشا سے بنی ہوتی ہیں۔ بغلاف اس کے عدم تکون غضروف (achondroplasia) میں قاعدی اور غضرونی ہڈیوں کی بالیدگی عجیب و غریب طور پر رک جاتی ہے۔ اور غشا سے بنے ہوئے عناصر میں کسی قدر تعویضی بیش بالیدگی پائی جاتی ہے۔ عدم دماغی (anencephaly) میں کھوپری کا قاعدہ یعنی اس کا غضرونی حصہ کم بیش مکمل طور پر نیویافتہ ہوتا ہے۔ اور غشائی ہڈیاں بالکل غائب ہوتی ہیں۔

قیلہ و سحائب (meningocele) دماغی اغشیہ کا ایک خلقی بروز ہے جو

کسی ناقص النمو کھوپری کے رخنہ میں سے واقع ہوتا ہے۔ جب اس میں دماغ موجود نہ پائے تو یہ قیلہ و دماغیہ (encephalocele) کہلاتا ہے۔ اور جب یہ خارج شدہ دماغ بطینوں میں سیال کے جمع ہونے سے متمدد ہو تو یہ استسقاءی قیلہ و دماغیہ (hydrencephalocele) کہلاتا ہے۔ یہ بروزات عظم قذالی میں نہایت کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور اسکے بعد

کثرت وقوع کے لحاظ سے جبھی عارضی (fronto-malar) دوز کا نام آتا ہے۔ اور نسا ذناذ حالتوں میں یہ قحط وی، سہمی اور دوسری درزوں میں بھی دیکھے گئے ہیں نیز یہ کھوپری کے قاعدہ کے طبعی اور غیر طبعی شقاقات (fissures) میں سے مجھناک اور کان میں بھی نکل آئے ہیں۔ ان کے عظم قذالی میں واقع ہونے کی کثرت کی توجیہ اس ہڈی کے نوکا ملا لہ کرنے سے کیستدر ہو جاتی ہے۔ یہ ہڈی پیدائش کے وقت چار علمدہ علیحدہ حصوں پر مشتمل ہوتی ہے (شکل ۵) ایک قاعدی، دو قندال، اور ایک لوجی یا پھیلا ہوا حصہ۔ لوجی حصہ میں جنینی زندگی کے ساتویں ہفتہ کے قریب چسارنات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بالائی اور ایک زیریں جوڑا۔ یہ نواتات ایک دوسرے سے ان شقاقات کے ذریعہ سے

کسیقدر الگ ہوتے ہیں جو چاروں زاویوں سے شروع ہوتے ہیں اور اندر کی طرف جا کر قذالی ابھار پر مل جاتے ہیں۔ وہ وقفہ جو سورخ کبیر (foramen magnum) کے زیریں زاویہ سے شروع ہو کر قذالی ابھار تک خط وسطی میں جاتا ہے خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ [سٹن (Sutton) کا عارضی قذالی یا قوخ]۔ یہ درون رحمی زندگی کے تیسرے مہینہ سے شروع ہو کر چوتھے مہینہ کے اخیر تک موجود ہوتا ہے۔ قذال کے قیلہ جات سہائیسہ (meningocoeles) ہمیشہ خط وسطی پر



شکل ۵۔ عظم قذالی پیدائش کے وقت

21

واقع ہوتے ہیں اور بروز غالباً اسی وقفہ میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو وقفہ قیلہ سہائیسہ (meningocoele) میں پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات عظم قذالی کے تمام عمودی طول میں سے گذرتا ہے اور اکثر سورخ کبیر (foramen magnum) میں مکمل جاتا ہے۔ جانی یا مستعرض شقاقات ہڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جن میں سے بالائی حصہ غشا سے نمود پاتا ہے اور زیریں حصہ غصروف سے۔ جانی شقاقات بعض اوقات برقرار رہتے ہیں اور کسور کے مشابہ دکھائی دیتے ہیں اور یہ درحقیقت غلطی سے بعض دفعہ کسور ہی تصور کر لئے گئے ہیں بعض خلاف قاعدہ نادار لو قوع حالتوں میں یہ اس قدر مکمل ہوتے ہیں کہ عظم قذالی کے بلند ترین حصہ کو لقیہ ہڈی سے بالکل علیحدہ کر دیتے ہیں۔

جداری شقاقات (parietal fissures) جو عظم جداری نمود پارہی ہو

اس میں تعظم سے تعلق رکھنے والے ریشے ان دونوں میں سے جو تقریباً مرکز پر واقع ہوتے ہیں محیط کی طرف نصف قطروں کی شکل میں جاتے ہیں تقریباً پانچویں ہسین میں ایک بین ریشکی فضا جو دوسری فضاؤں سے بڑی ہوتی ہے ان چھ درے غلطی ریشوں کو جو ہمیں کنارے کے موخر حصہ کے متصل واقع ہوتے ہیں ان مضبوط تریشوں سے علیحدہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جن سے بقیہ کنارہ مرکب ہوتا ہے (پوزی: Pozzi) جداری شقاق (parietal fissure) یہی ہوتا ہے۔ یہ بالعموم بند ہو جاتا ہے اور اسکا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ مگر بعض اوقات اسکا کچھ حصہ ایک درز نما شقاق کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے اور یہ غلطی سے کسر تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر طرفین پر ان انشقاقات کا مساوی حصہ برقرار رہے تو ایک منطول معین نما خلا باقی رہ جاتا ہے جو ہمیں یا فونخ (sagittal fontanelle) کہلاتا ہے (شکل ۲)۔ یہ قحودہ (lambda) کے ایک انچ آگے واقع ہوتا ہے، اور نورائیدہ بچوں میں سے ۴ فیصدی سے زائد میں پایا جاتا ہے (لی: Lea) جداری سوراخ اسی وقفہ کے بقیہ حصص ہوتے ہیں۔

مجمعی مخراب کی ہڈیوں کا متخمر (necrosis) نسبت سابق اب بہت قلیل الوقوع ہے۔ یہ بعض اوقات ایسی مغنتی درریش (gummatous infiltration) سے نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج نہ کیا گیا ہو اور جسکے ساتھ ریم زراعضویات کی سرائت بھی موجود ہو۔ اور بعض اوقات یہ جبھی جو فوں کی شدید سرائتوں کے بعد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جبھی اور جداری ہڈیوں پر نہایت کثرت سے حمل آور ہوتا ہے۔ اور کچھ وجوہ کی بنا پر جو ابھی زیادہ واضح نہیں ہوئے عظم قذالی میں یہ شاذ و نادر ہی واقع ہوتا ہے۔ خارجی لوح اکثر اکیلی ہی متخمر ہو جاتی ہے کیونکہ اسکو چوٹ پہنچنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور نیز اسکی رسد خون اتنی کثیر نہیں ہوتی جتنی کہ اندرونی لوح کی ہوتی ہے۔ اکیلی اندرونی لوح کا متخمر نہایت ہی نادر الوقوع ہے۔ گاہے گاہے ایک سیع رقبہ نیچے سے اوپر تک جمیں ہڈی کی تمام دبازت شامل ہوتی ہے ماؤف ہو جاتا ہے۔ کھوپری کے چھوٹے چھوٹے رقبوں کا تدریجی ذبول بہت ہی شاذ طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اس سے بعض اوقات ہڈی کا ایک قرص آہستہ آہستہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اگر تخم زیادہ ذبول سے اندرونی لوح ماؤف ہو جائے تو بعض اوقات ایک زیرجانی خراج بن جاتا ہے جو دماغی ضغط کا باعث ہوتا ہے۔ جب ڈپلوئی (diploë) متاثر ہو جاتا ہے تو اس میں وریدی علیقت یا تقیمی التهاب وریدی پیدا ہوجانے کا امکان ہوتا ہے اور اس طرح جو ضرر شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات

پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ علقہ سے بڑے بڑے درون دماغی جوف بند ہو جائیں یا غرقی مادہ عمومی دوران خون میں چلا جائے اور اس سے تقبج الدم (pyæmia) پیدا ہو جائے۔ صرف مقامی انتشار ہی سے التهاب سمایہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بیرونی لوج میں تنفر واقع ہونے کی صورت میں اریکی بافت کی بایلدگی جو معر اور عروق دار ڈپلوی (deplœ) پر واقع ہوتی ہے مردہ ہڈی کے ور قچہ کے انتشار میں مدد کرنے میں ایک بہت اہم فعل سر انجام دیتی ہے۔

عظمیٰ محرابی چھت پر عملیہ جات

(OPERATIONS ON THE BONY VAULT)

ترفان کرنا (trephining)۔ یہ عملیہ علم الجراحت کا ایک قدیم ترین عملیہ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرانس میں چھ ہزار سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ عملیہ سر انجام دیا جاتا تھا۔ کیونکہ اس زمانہ کی کھوپڑیوں کی یقینی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں تر فان کا میابی سے کیا گیا تھا۔ فی زمانہ یہ عملیہ کھوپڑی میں ابتدائی دخل حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور اسکے بعد سوراخ یا تو ہم پہلو ہڈی کے نیچے سے جافیہ علیحدہ کر کے اسکو کلاب سے ٹوڑ دینے اور یا عظمیٰ ترقیمی (osteoplastic) دامن طیارہ کر لینے سے زیادہ کثادہ بنالیا جاتا ہے۔

تر فان کرنے سے پہلے چاندلی کا جودامن اٹھایا جاتا ہے اس کا قاعدہ

نیچے سے عریض ہونا چاہئے۔ اور اسے عموماً اس طریقہ سے طیار کرنا چاہئے کہ اس میں کم سے کم ایک بڑا ثمر یا نی تیا موجود ہو۔ میری رائے (سی۔ سی۔ چوائس) میں قرین مصلحت یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ ہڈی تک کاٹ دیا جائے اور تمام دامن کو ایک ہی تہ میں الٹا دیا جائے۔ زنف دامن کے قاعدہ کو باقہ سے دبائے یا اسپر لچکدار پٹی باندھ دینے سے روک دیا جاتا ہے۔ دامن کے اٹھائے جانیکے بعد عروق زیادہ آسانی سے کڑے جاسکتے ہیں اور یا اسکے قاعدہ پر کلنگہ لگا دیا جاتا ہے۔

کھوپڑی کا تر فان کرنے میں صحیح دیوار کے مختلف حصوں کی تقابلی موٹائی کا خیال رکھنا

چاہئے۔ اور فوقانی طولی جوف (superior longitudinal sinus) کے قرب درجہ وارے
استرا کرنا چاہئے۔ آٹھ ترخان کو کھوپڑی کی مختلف وبازت کے مطابق بنانے کے لئے ترخان کے
پن کا بروز $\frac{1}{4}$ انچ سے زائد نہ ہونا چاہئے۔ صدغی حفہ (temporal fossa) میں وبازت
۲ سے ۵ ملی میٹر تک ($\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$ انچ) ہوتی ہے۔ اور قبہ پر عظمی دیوار زیادہ موٹی ہوتی ہے
اور ۱۰ تا ۱۵ ملی میٹر ($\frac{1}{2}$ تا $\frac{3}{4}$ انچ) کے درمیان ہوتی ہے۔ ان چھانشوں کا اطلاق تنور سٹو
کے بالغ شخص کے سر پر ہوتا ہے۔ جوانی اور سر کی جسامت اور شکل کی رعایت کا ضرور
خیال رکھنا چاہئے۔

جن مختلف ساختوں تک پہنچنا مقصود ہوا انکو معرا کرنے کے لئے جن محلات پر
ترخان کا سوراخ بنانا چاہئے انکی سطحی نشاندہی کے لئے بہت سے طریقے نکالے گئے ہیں مینڈی
ذیل مقامات آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں اور چاندلی کا دامن اٹھانے سے پہلے یا اسکے بعد
جلد تلاش کیے جاسکتے ہیں۔

وسطی سحائی (middle meningeal) شریان کی مقدم شناخ

آسانی سے تلاش کیجا سکتی ہے اور پریمین (pteron) کے خطہ پر اسے اکثر ضرر پہنچ جاتا ہے۔
عظم جبھی کے خارجی زاویہ زائدہ کے $\frac{1}{4}$ انچ پیچھے اور وجہ (zygoma) کے بالائی کنارے
کے $\frac{1}{4}$ انچ اور پر سوراخ کرنے سے یہ عرق اس مقام پر معرا ہو جائے گا جہاں یہ عظم جداری کے
پیش زبرین یا قندی زاویہ کو کاٹتا ہوا گذرتا ہے۔ یہاں یہ شریان اپنی رفیق وریدوں کیساتھ
ہڈی کے عمیق میزاب میں موجود ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات میزاب کی جگہ قنال بھی ہوتی ہے۔
پریمین (pteron) کے خطہ پر ہڈی میں کسر واقع ہونے سے جو کہ یہاں پر نسبتاً باریک ہوتی
ہے ان وریدوں کا چھٹنا تقریباً یقینی ہوتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ شریان بھی ساتھ ہی
ماؤف ہو جائے۔ اس سے زیر جانی زرف واقع ہو جاتا ہے جو دماغ کے ضغطہ پرنتج ہوتا ہے۔
پریمین (pteron) کی نشاندہی بھی یوں بیان کیجا سکتی ہے:- جبھی عسافی (جبھی وجہی)
درز کے کٹاؤ سے جسکا جس آسانی سے کیا جاسکتا ہے $\frac{1}{4}$ انچ پیچھے (شکل ۲- صفحہ ۱۵)
اور اس لائن سے $\frac{1}{4}$ انچ اور جو اس کٹاؤ سے وجہ کے بالائی کنارے کے متوازی پیچھے
کی طرف کو گھینی جائے یہ ہند سے آسانی سے یاد رکھے جاسکتے ہیں۔ اور سمجھنے (asterion) کے

لئے جو ہند سے مقرر ہیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جاسکتا ہے۔


واقعات کی اکثریت میں وسطی سحائی (middle meningeal) شریان کی موخر شاخ تک خارجی منفذ کے مرکز سے صین ایک انچ اوپر (منفذی نقطہ: meatal point پر) بذریعہ نرفان سوراخ کرنے سے رسائی ہو سکتی ہے۔ مگر نجمیہ (asterion) کے خطہ پر یا عظم جداری کے پس زریں زراویہ پر یعنی منفذی نقطہ سے ۱ ۱/۲ انچ پیچھے اور منفذی قفائی خطہ (meato-inion line) سے — جو منفذی نقطہ سے لیکر خارجی قذالی ابصار کے نمایاں ترین مقام تک کھینچا جاتا ہے — ۱ ۱/۲ انچ اوپر بھی اسے معر کیا جاسکتا ہے (شکل ۳)۔ اس مقام پر شریان مذکور کے تعریہ کا فائدہ یہ ہے (جو بعض اوقات نقصان میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے) کہ اگر سوراخ کا قطر ۳/۴ انچ ہو تو یہ جانی جوف (lateral sinus) کو بھی معر کر دیکتا اور اس سے اوپر کی طرف صدغی قندی (temporo-sphenoidal) لمحہ تک اور نیچے کی طرف دیمنغ (cerebellum) تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔

صدغی قندی لمحہ (temporo-sphenoidal lobe) تک ان

نشانات میں سے جو وسطی سحائی شریان کی موخر شاخ کے لئے اوپر دئے گئے ہیں کسی ایک کے ذریعہ سے پہنچا جاسکتا ہے۔ اس عرق کو ام جافیہ میں شفاف دینے سے پیشتر دو خوں کو اس کے نیچے سے گذار کر باندھ دیا جاتا ہے۔ لمحہ کے اس حصہ میں عام طور پر صدغی قندی خراج پایا جاتا ہے۔ اور یہ غلطے طبلی (tegmen tympani) کے اوپر واقع ہوتا ہے جو ہڈی کا ایک پتلا سا حصہ ہے جس سے کھفہ طبلی (tympanic cavity) اور حلی مغارہ (mastoid antrum) کی چھت بنتی ہے غلطہ (tegmen) کے لیول یوں ظاہر کیا جاسکتا ہے (شکل ۶) منفذ کے اوپر وجنہ (zygoma) کے بالائی کنارے کی سیدھ میں ایک نقطہ لے لیا جاتا ہے اور اس فوق منفذی نقطہ (suprameatal point) کو نجمیہ (asterion) سے چکے متعلق یہ یاد ہوگا کہ یہ منفذی (meatal) نقطہ سے ۱ ۱/۲ انچ پیچھے اور ۱ ۱/۲ انچ اوپر ہوتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ مذکورہ خط کا مقدم نصف غلطہ طبلی (tegmen tympani) کا متناظر ہوتا ہے۔ غلطہ (tegmen) کے لیول سے ایک انچ اوپر بذریعہ نرفان فتح بنانے سے صدغی خراج تک

25

رسانی ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے مریضوں میں سرجن اس امر کا خود تصنیف کر سکتا ہے کہ آیا اہم قسم کا خراج حلی مغارہ (mastoid antrum) کے مرض سے تانوی طور پر پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ اور اگر ہوا ہے تو حلی عملیہ (mastoid operation) کے دوران میں اسے غلطی طبعی (tegmen tympani) میں سے ایک فتقہ لمبائے گا جیسر اکثر اکی بافت کا ایک قطعہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اس فتقہ کو اور بڑا کر سکتا ہے اور خراج کی مسیلت اسکی ساق اور مغارہ (antrum) میں سے کر سکتا ہے۔



شکل ۶۔ جانبی بلیٹنوں، الجریہ (insula) یعنی (جزیرہ رائیل) اور صدغی قلع (temporal pole) کو ظاہر کرتی ہے۔


جانبی جوف (lateral sinus)۔ اس جوف کا لگنا (sigmoid) سرا

نجمیہ (asterion) پر واقع ہوتا ہے جسے حلی نشانات پہلے ہی بیان ہو چکے ہیں۔ اس کا نزولی جارح حلیہ (mastoid) کی پچھلی طرف مرکزی صماخی نقطہ سے ۳ انچ پیچھے کرید کے قاعدی خط (Reid's base line) پر باسانی معر کیا جا سکتا ہے (شکل ۱۳۔ صفحہ 49)۔ یہ خط ایک فرضی خط ہے جو مچھر کے فرش سے خارجی صماخ کے مرکزی نقطہ تک کیسچ کر تیجے کی طرف کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اکثر قفائینہ (inion) پر سے گذرتا ہے لیکن اس پر سے اسکا گذرنا ضرور نہیں ہوتا۔ بعض کھوپروں میں یہ اس نقطہ سے کیسچہ راوپر یا نیچے رہتا ہے۔ جوف مذکور کا افقی حصہ

ریڈ (Reid) کے قاعدی خط سے $\frac{1}{4}$ انچ اوپر ہوتا ہے۔ دیمغ (cerebellum) کو معرا کر نیا ایک طریقہ یہ ہے کہ ریڈ (Reid) کے قاعدی خط کے نیچے $\frac{1}{4}$ اور $\frac{1}{4}$ انچ کے فاصلہ پر دو نقطے لیکر انکے درمیان ترخان کا سوراخ ایسے مقام پر بنایا جائے جو کھوپری کے پیچھے کی طرف وسطی خط سے کافی دور ہو، تاکہ ترخان کے دندانے قذالی جوف سے دور رہیں۔ اس مقام پر سلعات کو دور کرنے کے لئے بہت زیادہ گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے اور بعد کے مراحل میں ایک یا دونوں سے بہت زیادہ ہڈی دور کرنا پڑتی ہے۔ اور جب اس امر کا شبہ ہو کہ تراج آیا صدعی لغتہ میں واقع ہے یا دیمغ میں تو سمجھنے (asterion) پر ترخان کرنا مناسب ہوتا ہے (دیکھو صفحہ 24) جہاں فتحہ کو زیادہ وسیع کرنے سے جانبی جوف معرا کر لیا جاتا ہے۔

حرکی رقبہ (motor area) تک کھوپری کو

رولینڈو (Rolando) کے شقاق کے عین سامنے سے کھولنے سے پہنچا جاتا ہے۔ اس شقاق کی نشاندہی کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے انفیسنہ (nasion) سے لے کر قفائینہ (inion) تک سر کی چوٹی کے عین وسط پر سے ایک رسی تان لی جائے اور اسکا نصف کر کے ان دونوں مقامات



نقشہ حرکی رقبہ
سوراخ کرنا۔

کا وسطی نقطہ معلوم کر لیا جائے۔ اور پھر اس نقطہ سے $\frac{1}{4}$ انچ پیچھے سے ایک خط نیچے کی اور اگے کی طرف کو وسطی مستوی سے $\frac{1}{4}$ درجہ کے زاویہ پر $\frac{3}{4}$ انچ لمبا کھینچ دیا جائے، چونکہ کھوپری کی تراش دماغ کی نسبت ایک زیادہ بڑے دائرہ کا حصہ ہوتی ہے، اسلئے اس کے اوپر کا $\frac{3}{4}$ انچ فاصلہ شقاق رولینڈو (Rolandic fissure) کا متناظر ہوگا جو $\frac{3}{4}$ انچ ہوتا ہے۔ $\frac{1}{4}$ درجہ کا زاویہ باسانی بنایا جاسکتا ہے کیونکہ یہ زاویہ قائمہ کا تین چوتھائی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی قائم الزوا یا کاغذ کے تختے یا ورق یا ٹین کے کڑے یا کسی اور شے کی تھاریں لگادی جائیں، اور پھر اسکا ایک چوتھائی کاٹ دیا جائے تو مطلوبہ زاویہ بنجاتا ہے جیسا کہ (نقشہ ۷) میں دکھایا گیا ہے۔ شقاق رولینڈو (Rolandic fissure) کے نشانات کی سمت سرسری لہریں معلوم کی جاتی ہیں کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ خط بڑھانے پر پیش اوینی نقطہ (pre-auricular point) تک پہنچ جاتا ہے۔ مذکورہ بالا ابعاد اوسط جسامت اور شکل کی

یورپی کھوپری پر استعمال کرنے کے لئے کافی حد تک صمغ ہیں۔

27 دماغی سلعہ کے لئے عملیہ جات کرنے میں یہ ظاہر ہے کہ عجیبی فحشا

کا محل مختص المقام علامات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ سلعہ تک پہنچنے کے لئے ترخان کے فحات سے جو جگہ ملتی ہے اس سے زیادہ گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ترخان کے فتح کو ضرورت کے موافق ہڈی توڑ کر بڑا کیا جاسکتا ہے۔ اور رخنہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو بعد میں مضبوط لیفی بافت سے پُر ہو جاتا ہے۔ یا ایک عظمی ترقیمی دامن بنایا جاسکتا ہے۔ پہلا طریقہ اکثر المہینان بخش ثابت ہوتا ہے مگر اس سے بعض اوقات بہت خراب علامات مثلاً آگے کی طرف جھکنے میں عدم توازن کا پایا جانا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ علامت بعض اوقات استدرنایاں ہوتی ہے کہ مجموعی رخنہ کو پسلیوں یا کسی اور جگہ سے عظمی پیوند لیکر پُر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

عظمی ترقیمی (osteoplastic) دامن بنانے کے لئے چاندلی کا ایک بڑا ساربانہ یا نصف دائرہ کی شکل کا دامن کاٹ لیا جاتا ہے جس کا قاعدہ نیچے کیلیرف کو ہوتا ہے اور کونوں پر ترخان کے چار چھوٹے چھوٹے فحات بنائے جاتے ہیں۔ بُعدی اور جانبی اطراف پر جو ہڈی ہوتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ ترخان کے ایک فتح سے لے کر دوسرے فتح تک جھجھ اور ام جافیہ کے درمیان سے ایک خم پذیر رہنہ (pliable director) گزرا جاتا ہے۔ اور کاٹنے والے کلاب (cutting forceps) کے لئے یا پکھلا راز (flexible saw) کا استعمال اسکے میزاب میں کیا جاتا ہے۔ اسکے بعد عظمی مربع کی قریبی طرف کو زاویہ حادہ پر خمیدہ کرنے سے توڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ایسا دامن اٹھایا جاتا ہے جسکو رسد خوب پہنچتی ہے، اور اسکے اندر کیلیرف ہڈی ہوتی ہے جس میں خون کی رسد اچھی طرح سے موجود ہوتی ہے۔ اس ہڈی کو اس مقام پر پھر لگایا جاسکتا ہے۔

کھوپری کے کسور۔ کم عمر شیرخوار بچہ کی کھوپری میں کسور واقع کرنا واقعی

آسان نہیں۔ اس عمر میں کھوپری بحیثیت مجموعی مکمل طور پر متعظم نہیں ہوتی۔ درزیں عریض ہوتی ہیں۔ اور ہڈیوں کے درمیان بہت سا غضروف اور بہت سی غشا موجود ہوتی ہے مزید برآں عمر کے ابتدائی حصہ میں ہڈیاں پکھلا رہتی ہیں اور مقابلہ نرم اور دب جانے والی ہوتی ہیں۔

لہذا معمولی حالت میں ضرب لگنے سے کسر کی نسبت تسنن (indentation) کے پیدا ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔

بالغوں میں بھی کھوپری عام طور پر جتنی چھوٹک تصور کیجاتی ہے اسکی نسبت یہ بہت کم پھونک ہوتی ہے اور خشک شدہ نمونہ جات کے مطالعہ سے جو رائے قائم کی گئی ہے اس کے مغالطہ انگیز ہونے کا امکان ضرور ہے۔ بہت سے مصدقہ واقعات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ دوران حیات میں جمجمی قبہ میں سے تیز نوک والا دوا گذرنے پر صرف سوراخ ہی بنے مگر ہڈی ریزہ ریزہ نہ ہو (لنڈن ہسپتال میوزیم (London Hospital Museum) مندرجہ ذیل تشریحی حالتیں کھوپری کی ضرب کے اثرات کو درجہ اقلیت تک پہنچا دیتی ہیں :- چاندلی کی کسنگی اور اسکی بہت سی حرکت پذیری محراب سر کی گنبد نما ترتیب - ہڈیوں کی تعداد جن سے سر بنا ہوتا ہے - اور بہت سے قطعات میں ضرب کے منتشر ہونے کا رجحان - کسی مفروضہ قوت کے تسلسل میں درزوں کی مداخلت اور درزی غشا کی موجودگی جو ایک خطی حائلہ (linear buffer) کی طرح کام دیتی ہے - سر کی شوکر پر حرکت پذیری - اور خود جمجمی ہڈیوں کی چوٹ -


مزید برآں کھوپری کو چھ پشتوں یا ستونوں کی موجودگی سے بھی اور تقویت پہنچتی ہے جو گنبد اور قاعدہ کے مقام اتصال پر واقع ہیں - انہیں سے دو جانی ہیں - آگے کی طرف مجری وندی (orbito-sphenoidal) اور پیچھے کی طرف مجری حلی (petro-mastoid) اور دو وہمی انفی (fronto-nasal) اور قدامی (occipital) کھوپری کے مقدم اور موخر سروں کو تقویت دیتے ہیں -

بچوں میں درزوں کے درمیان کی غشائی نہ بہت موٹی ہوتی ہے - مگر جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے یہ غشا غائب ہوتی جاتی ہے اور ہڈیاں آپس میں متحد ہوتی جاتی ہیں (اتحاد عظمیٰ : synostosis) - چالیس سال کی عمر کے قریب قریب درزیں بند ہوتا شروع ہو جاتی ہیں - اس تغیر کی ابتدا درز کی اندرونی جانب سے ہوتی ہے - اور یہ پہلے سہمی (sagittal) درز پر ظاہر ہوتا ہے - اور پھر اگیلی (coronal) اور قوس دوی (lambdoid) پر اور اخیر میں قسملانی (squamous) درز پر - مزید برآں جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے کھوپری کی ہڈیاں اندرونی لوح پر ایک جماؤ کے فراہم ہونے سے جو دماغ کے

گھٹتے ہوئے حصہ کی جگہ لے لیتا ہے زیادہ موٹی ہوتی جاتی ہیں۔ لہذا ان ہڈیوں میں معمر اشخاص میں جوان اشخاص کی نسبت زیادہ آسانی سے کسور واقع ہو جاتا ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ کسرے ہڈی کی تمام دباوت متاثر ہوتی ہے۔ مگر بعض اوقات کبلی بیرونی لوح ہی ٹوٹ جاتی ہے یا یہ ڈپلوئی (diplœ) میں گسکر صرف منحفض ہی ہو جاتی ہے اور جبھی خطہ کے زیرین حصہ میں بیرونی لوح جبھی جوف میں گس جاتی ہے۔ اندرونی لوح بھی بیرونی صفحہ میں تناظر کسر موجود ہونے کے بغیر ٹوٹ سکتی ہے۔ اور مکمل کسر کے تقریباً تمام واقعات میں اور خاص کر انہیں جنہیں نشیب موجود ہوتا ہے اندرونی لوح میں بیرونی کی نسبت زیادہ وسیع

29




شکل ۸

شکست پائی جاتی ہے۔ اسکے بہت سے وجوہ ہیں۔ اندرونی صفحہ بیرونی صفحہ سے نہ صرف زیادہ موٹا ہی ہوتا ہے بلکہ مقابلہ یہ بہت زیادہ چھوٹک بھی ہوتا ہے اور اس لئے اس کا نام ”زجاجی طبقہ“ (vitreous table) رکھ دیا گیا ہے۔ اگر خارجی طبقہ پر نہایت ہی محدود قوت استعمال کی گئی ہو تو توار کے زخم کی طرح ضرر محدود ہوتا ہے۔ جب قوت ڈپلوئی (diplœ) میں سے گزرتی ہے تو یہ پھیل جاتی ہے اور اندرونی لوح تک ضرب سے بہت منتشر ہو کر پہنچتی ہے۔ اور ایسا خاص کر ان حالتوں میں ہوتا ہے جب بیرونی طبقہ اندر کی طرف گس جائے۔ مزید برآں اندرونی لوح بیرونی لوح کی نسبت زیادہ چھوٹے ختم کا حصہ ہے اور اخیر میں ایگنیو (Agnew) اندرونی لوح کے زیادہ جراحت پذیر ہونے کی ایک وجہ بیان کرتا ہے جو ہڈی کے عمومی طور پر دبنے سے تعلق رکھتی ہے۔ شکل ۸ میں اب سر کی محراب کے

30

ایک حصہ کی تراش کو ظاہر کرتا ہے، جو دونوں الواح میں سے گذرتی ہے۔ اور ج ۱۰ اور ۱۱ میں دو انتصابی اور متوازی خطوط ہیں۔ اب اگر محراب پر ان متوازی خطوں کے درمیان قوت لگائی جائے تو قوس ۱۰ ب کے سروں کا رجحان ایک دوسرے سے دور ہٹنے کی طرف ہوگا اور تمام قوس دیکر اس خم کی شکل اختیار کر لینگے جو شکل ۹ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی حالت میں ج ۱۰ اور ۱۱ میں خط ۱۰ پر کیلیفر مستحق ہو جائیں گے اور نیچے کیلیفر منفرد (شکل ۹) اسٹیلے ضرب سے ہڈی کے اجزاء خارجی طبقہ میں تو اکٹھے ہو جانے کی طرف اور داخلی طبقہ میں منشر ہو جانے کی طرف مائل ہونگے۔

محراب کے کسور بلا واسطہ ضرب سے واقع ہوتے ہیں۔ کھوپری کی بناوٹ



ایسی ہے کہ کسور پیدا کرنے والی قوت کی مدافعت کئی طریقوں سے ہوتی ہے۔ (۱) جب ضرب جداری خط میں سر کی چوٹی پر لگتی ہے تو اسکی قوت کا رجحان دونوں جداری ہڈیوں کے بالائی کناروں کو اندر کی جانب دھکیلنے کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسکے ساتھ ہی زیرین کناروں کا باہر کی طرف کو حرکت کرنا لازمی ہوتا ہے۔ موصوفہ الذکر حرکت کی مدافعت عظم فلسفانی اور عظم قندی کا جناح کبیر جو عظم جداری کی زیرین کور پر متراکب ہوتے ہیں بڑی شدت سے کرتے ہیں مزید برآں عظم فلسفانی تک جو قوت پہنچتی ہے وہ وجہی قوس تک منتقل ہو جاتی ہے جسکو فک اعلیٰ کی ہڈی اور عظم جبہ ہی سہارا دیتی ہیں۔ یہ قوس اس حالت میں دوسرے مدافع پشتیبان کا کام دیتی ہے اور قوت کے اس انتقال کی وضاحت جو سر کی چوٹی سے لیکر جبہ ہڈیوں تک عمل میں آتا ہے اس امر سے ہوتی ہے کہ سر پر ضربات کے لگنے کے بعد درد اکثر چہرہ میں بھی محسوس ہوتا ہے۔

(۲) اگر ضرب عظم جبہ کے بالائی حصہ پر لگے تو قوت فوراً جداری ہڈیوں تک منتقل ہو جاتی ہے،

کیونکہ عظم جبہ کا بالائی حصہ (۱) اس طریقہ کی وجہ سے جس سے اسکا کنارہ سلامی دار ہے (حقیقت میں دونوں جداری ٹہریوں پر واقع ہوتا ہے، لہذا وہی مدافعت پھر عمل پیرا ہوتی ہے۔ اگر اس ٹہری کے زیرین حصوں میں باہر کی جانب نکل جانے کی طرف کوئی میلان ہو، اور وہ اسوقت یقیناً مجموعی ہوتا ہے جبکہ وسطی جبہ (mid-frontal) درز برقرار ہو تو ایسی حرکت کو عظم وتدی کا جناح کبیر اور عظام جداری کے پیشین زیرین زاوے جو جبہ کے ان حصوں سے متحد یا انپر متراکب ہوتے ہیں، مزاحم آتے ہیں۔ لہذا اس سے بظاہر ہو گیا ہوگا کہ جس طرز سے جبہ اور جداری ٹہریوں کی متناظر کوریں سلامی دار ہوں اس پر بہت کچھ منحصر ہوتا ہے۔ (۳) قذال (occiput) پر کی ضرب کی مدافعت کا زیادہ سامان موجود نہیں۔ اور یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر آدمی زور سے بھی نہ گریے تو اتنا صدمہ ہی ٹہری کو توڑ دینے کیلئے کافی ہوتا ہے، لہذا اسکی محافظت کی زیادہ ضرورت ہی گریہ والوں جلدی اور صدغی ٹہریوں سے متعلق رکھنے اور لچکدار نقری عمود سے متحد ہونے کی وجہ سے ایک بڑی حد تک محفوظ ہے۔

کھوپری کے قاعدہ کے کسور (۱) بلا واسطہ یا (۲) بالواسطہ ضرب سے

بجیسا کہ مام طور پر ہوتا ہے (۳) محراب کے کسر کی توسیع سے پیدا ہوتے ہیں۔ (۱) اجسام غریبہ کے انفی یا مجری پھت میں سے یا کھوپری کے قاعدہ کے اُس حصہ میں سے جو بلعوم میں پایا جاتا ہے، گھسنے پر انکی بلا واسطہ ضرب سے قاعدہ کا کسور واقع ہو چکا ہے۔ موخر حصہ میں گردن کی گڈی پر ضرب لگانے سے کسور واقع ہو جاتا ہے۔ (۲) بلا واسطہ ضرب سے جو کسور واقع ہوتے ہیں انکی مندرجہ ذیل مثالیں دی جا سکتی ہیں:۔ عظم جبہ کے حصہ زیرین پر جو ضربیں لگتی ہیں انمیں غرابلین صفحہ (cribriform plate) کے یا عظم جبہ کے مجری حصہ کے کسر کے علاوہ اور کوئی ضرر نہیں پایا جاتا کیونکہ ان حصوں کے نہایت ہی باریک ہونے کی وجہ سے ان میں کسر کا زیادہ امکان موجود ہوتا ہے۔ کھوپری کے قاعدہ کے کسر کے ۸۶ مریضوں میں مجری سقف ۷۹ میں بصری سوخا ۶۳ میں، اور غرابلین صفحہ جات تقریباً تمام میں متاثر پائے گئے (رالفنگ: Rawling)۔ ٹھڈی پر گرنے سے وقتی کہفہ (glenoid cavity) فک اسفل کے قذال سے اتنے زور سے دب گیا ہے کہ کھوپری کے وسطی حفرہ میں کسور واقع ہو گیا ہے۔ ٹھڈی کے سرے پر فیصلہ کن گھونے کی ضرب لگنے سے کھوپری میں کسور واقع ہونے کے بغیر ہی الرججاج دماغ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جسم زمین پر پاؤں یا گھٹنوں یا چوڑوں کے بل گرا ہے تو قوت نے ستون نقری

میں سے منتقل ہو کر قذالی خط میں کوپری کے قاعدہ کا کسور واقع کر دیا ہے۔ ایسے حادثات کے ظہور پذیر ہونے کا امکان سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ عمود فقری کو عضلی فعل سے استوار رکھا جائے۔ اس حالت میں جو میکانیہ بروئے کار آتا ہے وہ بعینہ وہی ہوتا ہے جس سے جھاڑو کا سر لکڑی کے سرے کو زمین پر مارنے سے جھاڑو کے دستے میں زیادہ مضبوطی سے ٹھنس جاتا ہے۔ یہ نظریہ کہ کوپری کے قاعدہ میں اکثر ضرب مقابل سے کسور واقع ہو جاتا ہے اب عام طور پر ایک کافی حد تک ترک کیا جا چکا ہے اگرچہ بعض حالتیں ایسی بھی ہیں جن سے اس نظریہ کی بظاہر تائید بھی ہوتی ہے۔ اس قسم کے ایک واقعہ کا اندراج ستر ہے۔ ہچنسن (Sir J. Hutehinson) نے کیا ہے۔ اس میں عظم قذالی کے کسر کے ساتھ ہی غربالین صفحہ (cribriform plate) کا کسر بھی پایا گیا تھا اور کوپری کے درمیانی حصہ میں کوئی ضرر موجود نہیں تھا۔ (۳) محراب کے کسور کے اور خاص کر ان خطی کسور کے جو منتشر ضرب سے واقع ہوئے ہوں جیسا کہ مر کے بل گرنے میں ہوتا ہے، قاعدہ تک پہنچنے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ اس طرح منتشر ہونے میں یہ قاعدہ تک راستہ کی درزوں اور ہڈیوں کی بستی کی لچا خا کئے بغیر چھوٹے سے چھوٹے راستے سے پہنچتے ہیں۔ چنانچہ گنبد کے جہی خطہ کے کسور قاعدہ کے مقدم حفرہ تک اور جداری خطہ کے وسطی حفرہ تک، اور قذالی خطہ کے موخر حفرہ تک پھیل جاتے ہیں۔ چند حالتیں اس قاعدہ سے متعلقہ بھی ہیں۔ جو معین ہڈیاں ان تین خطوں میں متاثر ہوتی ہیں، ان کا زیادہ صحیح بیان دینے کے لئے پی ہیوٹ (P. Hawett) نے کوپری کو تین منطقوں میں تقسیم کیا ہے۔ مقدم منطقہ میں جہی اور صفاتی (ethmoid) کا بالائی حصہ، اور جہی وندی، اور وسطی منطقہ میں عظام جداری، اور عظام صدغی کے فلسفانی اور ان کے جہری حصہ کے مقدم حصے اور قاعدی وندی کا بیشتر حصہ اور موخر منطقہ میں قذالی، حلیہ اور عظم جہری کا موخر حصہ اور وندی کا تھوڑا سا حصہ شامل ہیں۔

قاعدہ کے کسور میں بالعموم خون اور دماغی نخاعی سیال باہر نکل آتا ہے۔ (۱) مقدم حفرہ کے کسور میں خون بالعموم ناک میں سے خارج ہوتا ہے اور یہ سحائی اور صفاتی (ethmoidal) شریانوں میں سے آتا ہے، یا اسکا زیادہ حصہ فالہا انفی سقف کے دریدہ مغالی استر میں سے نکلتا ہے۔ ناک میں سے دماغی نخاعی سیال بہنے کے لئے انفی سقف میں کسور واقع ہونے کے علاوہ اسکے نیچے کی غشائے مغالی میں اور شمی (olfactory) اعصاب کے

33

غلافوں میں جو ام جافیہ اور عنکبوتیہ (arachnoid) سے حاصل ہوتے ہیں دریدگی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ دماغی نخاعی سیال کا مفروضہ اخراج انفی غشائے مخاطی میں سے ضرر کی موجودگی کے بغیر بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اور یہ غالباً شیمی (olfactory) اعصاب کے غلافوں کے ساتھ ساتھ عمل میں آتا ہے اور اسکا سبب یا تو اسکے انخذاب کی کمی اور یا اسکے انفرارز کی زیادتی ہوتی ہے۔ جبھی خطہ کے کسر کی بہت سی حالتوں میں خون مجھ میں چلا آتا ہے اور طمعہ کے نیچے آکر ظاہر ہوتا ہے۔ (۲) جب وسطیٰ حفرہ ماؤف ہو تو خون غشائے طبل کی دریدگی سے گزر کر خارجی منفذ میں سے باہر نکلتا ہے اور یہ یا تو طبل (tympanum) اور اسکی غشا کے عروق یا درون مجھی و عابدری سے آتا ہے۔ اور بعض حالتوں میں یہ کہنکی یا مجھری جو فوں کے انشتاقات سے آتا ہے۔ بعض اوقات خون یو سٹیکین نلیوں (Eustachian tubes) میں چلا جاتا ہے اور یہ یا تو ناک یا منہ سے نکل آتا ہے اور یا ٹھکرا جاتا ہے اور بعد میں تے سے باہر آ جاتا ہے۔ کان میں سے دماغی نخاعی سیال کبہنے (مصلیٰ اخراج کے لئے) (۱) یہ ضروری ہے کہ کسر داخل منفذ میں سے گذرتا ہو۔ (ج) اسس منفذ میں غشائے مخاطی کی جو انبوبی اطالت موجود ہوتی ہے وہ پھٹ گئی ہو۔ (ج) باطنی اذن اور طبل میں رابطہ موجود ہو۔ اور (د) غشائے طبل دریدہ ہو گئی ہو۔ (۳) موصخر حفرہ کے کسور میں خون کی درریش یا تو طلی زائده کے گرد و نواح میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور یا گردن کی گدی پر۔ اور بعض اوقات عین قی خطہ کے اندر تک بھی چلی جاتی ہے۔

مزید برآں گنبد کے مرکب کسور میں جنیں ام جافیہ اور عنکبوتیہ (arachnoid) پھٹ گیا ہو بعض شاذ و نادر مثالوں میں دماغی نخاعی سیال باہر نکلتا ہوا دیکھا گیا ہے بعض اوقات بچوں میں گنبد کے سادہ کسر کے بعد ضرر رسیدہ حصہ پر ایک ورم بنگاتا ہے جس میں توج پایا جاتا ہے۔ کچھ کے چلانے پر یہ ورم زیادہ تنیدہ ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ دماغ کے ساتھ اس میں بھی مزمن بھٹا موجود ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اورام نیم شفاف ہوتے ہیں۔ اور یہ چاندنی کے نیچے دماغی نخاعی سیال کے جمع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اغشیہ دماغ کے معاصر اشتقاق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انکو اکثر ضربی دماغی مالی قیلوں (traumatic cephalhydroceles) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

درزوں کی علحدگی (separation of sutures) یہ حالت جانتک

34

اس کے چوٹ سے نتیجتاً پیدا ہونے کا تعلق ہے تقریباً بچوں ہی کی کھوپری تک محدود ہے۔ بڑی عمر میں اگر کسی محدود درزی پر قوت کا استعمال کیا جائے تو اس سے ایسا کسر پیدا ہو سکتا ہے جو پرانے درزی خط پر ٹھیک ٹھیک واقع ہوتا ہے۔ بالوں کی کھوپری میں کسر سے بلا تعلق درزوں کی علیحدگی بہت ہی نادر وقوع ہے۔ اس حالت کی چند مثالوں میں عظم صدغی بالعموم اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اور یہ علیحدگی فلسفانی درزی پر دیکھی جاتی ہے۔ جب مذکورہ علیحدگی کسور کے ساتھ واقع ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کلیلی اور سہمی درزوں میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ قحطی درز کا نام کثرت وقوع کے لحاظ سے انکے بعد آتا ہے۔

وجہ (zygoma) بلا واسطہ یا بالواسطہ ضرب سے ٹوٹ سکتا ہے۔ موخر الذکر حالت میں ضرب ایسی ہوتی ہے کہ اسکا رجحان فک اعلیٰ یا عظم العارض (malar bone) کو پیچھے کو دھکیل دینے کی طرف ہوتا ہے۔ جب یہ بلا واسطہ ضرب سے ٹوٹتا ہے تو اس کا ایک ٹکڑا بعض اوقات صدغی عضلہ میں گھس جاتا ہے۔ اور جب ٹاٹلانے پر بہت درد ہوتا ہے۔ معمولی حالتوں میں غیر وضعیت موجود نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم، کیونکہ اوپر تو ان دونوں ٹکڑوں کے ساتھ صدغی ردا چسپیدہ ہوتی ہے اور نیچے عضلہ مضغیہ (masseter) چسپیدہ ہوتا ہے۔ وجہ عمیق حصوں کے محل وقوع کے لئے ایک نہایت مفید رہنما کام دیتا ہے۔ اسکے بالائی کنارے کا موخر ترین چوتھائی حصہ کھوپری کے وسطیٰ حفرہ کے فرش کا تناظر ہے۔ اور یہ دماغ کے صدغی لختہ کے (جو اس حفرہ میں واقع ہوتا ہے) زیرین کنارے کی نشاندہی کرتا ہے (شکل ۶)۔ اس کا مفصلی درنہ (articular tubercle) جو اسکی جڑ کے نزدیک بہت واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے، اس مقام کی نشاندہی کرتا ہے جس پر وسطیٰ سحائی شریان کھوپری کے قاعدہ کو شو کی سوراخ (foramen spinosum) پر منتقل کرتی ہے (شکل ۳)۔ نیز نیم قمری (semilunar) یا گیسری عقدہ (Gasserian ganglion) کے محل کو ظاہر کرتا ہے (شکل ۳۵ صفحہ ۱۴۵)۔ وجہ درنہ (zygomatic tubercle) (بعد وقبی شوک : postglenoid spine) جو چانوی حفرہ (mandibular fossa) کی موخر حد قائم کرتا ہے، قنال سباتی (carotid canal) کے سین اوپر واقع ہوتا ہے (ایس سکاٹ : S. Scott)۔


صدغی خطہ کا امتحان لاشعاعوں کے ذریعہ سے۔ بعض

دروں جمعی ساختوں کی، جو گہری واقع ہوں، حالت کا انکشاف کر نیکے لئے کھوپری کے صدغی خطہ کا امتحان کرنا اکثر ضروری ہوتا ہے۔ ان ساختوں کا محل وقوع معلوم کر نیکے لئے بعض ایسے سطحی نقاط پر جو آسانی سے لیں سکیں سید کی گولی سے نشان لگانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ بطور رہنما کے کام دیں۔ سب سے زیادہ مناسب و معتبر ترین نقاط وہ ہیں جو گل۔ اس میں ظاہر کئے گئے ہیں، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ (اجنبی عارضی) (fronto-malar) (جیبی جیبی) (fronto-zygomatic) کٹاؤ۔

85

ب۔ عارضی زاویہ (malar angle)۔ دپیش منغذی نقطہ (premental point) جو جہنہ (zygoma) کی جڑ پر منغذ کے سامنے کی طرف چانوی (وقبی) (glenoid) حفرہ کے پیچھے اور پس چانوی (پس وقبی) (postglenoid) شوک کے عین اوپر ہے۔ ج۔ ایک نقطہ جو جہنہ کے بالائی کنارہ پر ب۔ اور د کے وسط میں واقع ہے (وسطی وجہی نقطہ) (mid-zygomatic point)۔ ان نقطوں پر کھوپری کے دونوں طرف نشان لگانا چاہئیں اور جب کھوپری کو ایک جانب سے دیکھا جائے تو متناظر نقاط کو ایک دوسرے سے منطبق ہونا چاہئے۔ اس طرح سے امتحان کرنے پر جو خطہ صدغی عضلات سے پوشیدہ ہوتا ہے، وہ انکے نیچے کی ہڈیوں کے پتلا ہونے کی وجہ سے متور ہو جاتا ہے۔ متور رقبہ ہڈی کے جیبی صدغی استخوان (fronto-temporal pillar) کے ذریعہ سے جس کے ساتھ ساتھ وسطی سمائی عروق آتے ہیں، اور جو دماغ کے جیبی اور صدغی منتوں کی درمیانی حد کی نشاندہی کرتا ہے، ایک مقدم یا جیبی (ریسک) (frontal fenestra)، اور مخروطی صدغی درسیبہ (temporal fenestra) (شکل ۱۰) میں تقسیم ہوتا ہے۔ جس مقام پر سمائی نرف کے لئے عام طور پر نرف کیا جاتا ہے، یعنی جیبی عارضی کٹاؤ (fronto-malar notch) کے پانچ پیچھے اور پانچ اوپر، اس پر جیبی صدغی ستون کا سایہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان میں سے ایک مقدم افقی شاخ ہے جو مجر کی سقف کی تناظر ہوتی ہے اور جیبی عارضی کٹاؤ کے پانچ اوپر واقع ہوتی ہے، اور ایک نزولی شاخ ہے جو جہنہ (zygoma) کے بالائی کنارے تک نقطہ ج یعنی وسط وجہی نقطہ (midzygomatic point) کے سامنے پہنچتی ہے۔ نزولی شاخ وسطی جمعی حفرہ کی مقدم دیوار یعنی وقبی مجری فاصل کو ظاہر کرتی ہے۔ اور غیر عارضی کے صدغی کنارے کے پیچھے سے اس سے پانچ کے فاصلہ پر نیچے کو آتی ہے۔ اس لئے اس سے یہ ظاہر

ہوگا کہ پیچھے کی طرف وندی منجھری فاسل، اور آگے کی طرف عظم عارضی کے صدغی کنارے اور اوپر کی طرف منجھری ستف کے سایہ، اور نیچے کی طرف وجہ کے بالائی کنارے کے درمیان ایک بہت واضح پس عارضی رقبہ (retromalar area) ہوتا ہے جس میں وسطی اور موخر مصفاتی خلیات موجود ہوتے ہیں اس رقبہ میں سے جبہ عارضی کٹاؤ (fronto-malar notch) کے



شکل ۱۰۔ وہ ساختیں دکھائی گئی ہیں جو کمپری کا لاشعاعوں سے جانبی استیمان کرنے پر صدغی خطہ میں نظر آتی ہیں۔

نیچے سے دو خط پیچھے سے آگے کی طرف کو گزرتے ہیں۔ انیس سے زیریں غرابی صفحہ (cribriform plate) کے لیول کا تناظر ہوتا ہے، اور بالائی مصفاقی کے جانبی تودہ اور جہی ہڈی کے محجری صفحہ کے مقام اتصال کا۔ پس عارضی (retromalar) رقبہ کی زیریں حد پر وتدی فکی (sphenomaxillary) (جنینی متکی: pterygo-palatine) حقہ، وتدی فکی شقاق، وتدی متکی عقدہ، اور زیر محجری (infra-orbital) عصب کا ابتدائی حصہ واقع ہوتے ہیں۔

صدغی دریچہ (temporal fenestra) کے زیرین کنارے کے ساتھ ساتھ اہم ترین ساختیں دکھائی دیتی ہیں۔ اوپر سے نیچے کی طرف شمار کرنے میں یہ حسبِ ذیل ترتیب سے پائی جاتی

- 37 ہیں۔ وندی کا جناح صغیر۔ حفرة نخامیہ (pituitary fossa) [زیر بالی حفصرہ fossa hypophyseos] جو آگے کی طرف مقدم سریری شکل زائده (anterior clinoid process) اور پیچھے کی طرف ظہر السراج (dorsum sellae) اور موخر سریری شکل زوائد سے مکمل ہوتا ہے۔ ظہر السراج (dorsum sellae) کے پیچھے عظم مجری (petrous bone) کا سیاہ سایہ واقع ہوتا ہے جو پچھلی طرف علمی جداری ستون (masto-parietal pillar) پر ختم ہو جاتا ہے۔ حفرة نخامیہ کا فرش وجہ (zygoma) کے بالائی کنارے سے ۱ انچ (۱۲ ملی میٹر) اوپر واقع ہوتا ہے۔ اور اسکی مقدم حد وسطی و منی (midzygomatic) نقطہ کے عین اوپر ہوتی ہے۔ حفرة نخامیہ کا طبعی پیشل پس قطر بالغوں میں ۱۲ ملی میٹر (۱/۲ انچ) ہوتا ہے۔ سورانخ بصری (optic foramen) جبھی عارضی کٹاؤ سے ۱/۲ انچ (۳/۴ ملی میٹر) پیچھے کی طرف کو اور وجہ (zygoma) کے بالائی کنارے سے ۱ انچ (۲۵ ملی میٹر) اوپر واقع ہوتا ہے۔ پیش منغذی (premental) نقطہ (دیکھو شکل ۱۰) قاعدی زائده (basilar process) کی پچھلی جانب کی نشاندہی کرتا ہے۔ منغذ داخلی اس نقطہ سے ۱/۲ انچ پیچھے اور اوپر واقع ہوتا ہے۔ منغذ خارجی اسکے عین پیچھے اور نیچے واقع ہوتا ہے۔ نیز اس سینہ (basion) جو سورانخ کبیر (foramen magnum) کے مقدم کنارے پر واقع ہوتا ہے، اس نقطہ سے ۱/۲ انچ نیچے اور پیچھے ہوتا ہے۔ وندی جوف (sphenoidal sinus) حفرة نخامیہ کے نیچے اور سامنے واقع ہوتا ہے۔

باب سوم

مشمولات مجملہ

38

(THE CRANIAL CONTENTS)

اغشیہ دماغ - ام جافیہ (dura mater) اپنی سختی کی وجہ سے دماغ کے لئے ایک عمدہ محافظ کا کام دیتی ہے۔ کھوپڑی کے تمام قاعہ پر یہ ہڈی سے بہت مضبوطی سے منضم ہوتی ہے۔ اور اس لئے اس جگہ پر اس غشا اور ہڈی کے درمیان وعابدریوں کے واقع ہونے کا بہت کم امکان ہوتا ہے گنبد (vault) پر اسکی چسپیدگیاں متبادلہ ڈھیلی ہوتی ہیں مگر درزوں کے خطوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت مضبوطی سے منضم ہوتی ہے۔ اس ڈھیلی ڈھالی چسپیدگی کی وجہ سے بڑی بڑی زنی اور قحی وعابدریاں ام جافیہ اور ہڈی کے درمیان جمع ہو جاتی ہیں۔ ایسی وعابدریوں سے عام طور پر ضغط دماغ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس امر پر بھی غور کرنا چاہئے کہ ضغط کے تمام مریضوں میں ضاغط قوت ام جافیہ سے باہر واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ غیر پیچیدہ حالتوں میں جب وقوع حادثہ کے ساتھ ہی ضغط کے علامات نمودار ہو جاتے ہیں تو انکی پیدائش کا سبب غالباً متغضض ہڈی ہوتا ہے۔ اور جب یہ علامات کچھ عرصہ بعد ظاہر ہوتے ہیں تو انکا سبب غالباً وعابدریوں ہوتا ہے جو غشائے مذکور اور ہڈی کے درمیان جمع ہو جاتا ہے۔ اور جب حادثہ کے بعد ایک طویل عرصہ (کچھ دن یا ہفتے) گزر جائے تو ان علامات کے پیدا ہونے کا سبب اسی مقام پر غالباً پیپ کا اجتماع یا کسی دویہ کا نکلنا ہوتا ہے۔

سرسہ سیل (Sir C. Bell) نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گنبد کی ام جافیہ چوٹ کے ارتعاش ہی سے بعض اوقات علحدہ ہو جاتی ہے۔ ”کسی موضوع کی کھوپری پر بجاری سہولت سے ضرب لگاؤ قطع کرنے پر یہ ظاہر ہوگا کہ جس مقام پر ضرب لگی ہے وہاں سے ام جافیہ کھوپری سے پرے ہٹ گئی ہے۔ اس تجربہ کو کسی اور موضوع پر دہراؤ اور سر میں سریش (size) کی ایک قلیل مقدار کا شراب کر دو۔ جس مقام پر ضرب لگا ئی گئی ہے اسپر کھوپری اور ام جافیہ کے درمیان شریہ کا ایک تھک پیا جائے گا۔ اور وہ بعینہ اسی رو بہ کے مشابہ ہوگا جو سر پر شدید ضرب لگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔“ ٹلو (Tillaux) نے یہ ثابت کر کے دکھا یا ہے کہ ام جافیہ اور ہڈی کے درمیان انضمامات خاص کر صدغی حفرہ پر کمزور ہوتے ہیں، جو سمائی نرف کا عام ترین محل ہے۔ جب کسر کی حالت میں ام جافیہ اور ہڈی کے درمیان خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت وسطی سمائی عروق ہی منقطع ہوتے ہیں، اور انیس سے شریان کی نسبت زیادہ تر رفیق وریدیں منقطع ہوتی ہیں۔ ان وریدوں سے شریان کے ارد گرد ایک جوف بنتا ہے (وڈ جونز : Wood-Jones)۔ وسطی سمائی شریان شو کی سوراخ (foramen spinosum) سے گزرنے کے بعد دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ مقدم شاخ جو بڑی ہوتی ہے عظم جداری کے پیش نیرین زاویہ کو کاٹتی ہوئی اوپر کو چلی جاتی ہے۔ اور اکیلی درز کی پھیلی جانب سے اس سے تھوڑے سے فاصلہ پر گنبد پر چڑھ جاتی ہے۔ موخر شاخ عظم فلسفانی کو کاٹتی ہوئی افقی رخ میں پیچھے کو نکل جاتی ہے، اور دوسری صدغی تلفیف کا مراختیار کر لیتی ہے (دیکھو شکل ۶۳)۔

جس مقام پر یہ عروق عظم جداری کے مقدم زاویہ کو کاٹتے ہوئے گذرتے ہیں وہاں پر یہ اکثر دریدہ ہو جاتے ہیں، اور اسکے بہت سے وجوہ ہیں:- ہڈی میں جہاں ان عروق کے لئے میزب موجود ہوتا ہے وہاں یہ بہت باریک ہوتی ہے، اور عروق بذات خود ہڈی میں اکثر اس طرح گرے ہوتے ہیں کہ انکی دریدگی کے بغیر کسر کا واقع ہونا مشکل ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور آخری سبب یہ ہے کہ شریان کا یہ مخصوص خطہ کھوپری کا وہی حصہ ہے جس میں کسر واقع ہونے کا امکان خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ جیمسن (Jacobson) نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ عروق ایسی قوت سے بھی منقطع ہو سکتے ہیں جس سے کھوپری میں کسر واقع نہ ہو (عام طور پر صرف وریدیں ہی منقطع ہوتی ہیں) بلکہ ام جافیہ علحدہ ہو گئی ہو۔ وسطی سمائی عروق کے علاوہ خارج السمائی نرف کا ماخذ جانبی جوف (lateral sinus) بھی نہایت کثرت سے ہوتا ہے، اور اسکے وجوہ ظاہر ہیں۔

ام جافیہ کے اعصاب۔ ام جافیہ میں اعصاب کی رسد موجود ہے۔ اسکا عظیم ترین مبدأ پانچواں عصب ہے۔ مگر دسویں اور بارہویں مجبی اعصاب سے بھی کسی قدر رسد پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترخان کے علیہ میں جب ام جافیہ کاٹی یا کھرچی جاتی ہے تو خون کے دباؤ میں ایک نمایاں تخفیف واقع ہو جاتی ہے (ایچ ٹیرل گرے اور ایل پارنس: H. Tyrrell Gray and L. Parsons)۔ در دوسرے بہت سے اقسام ان در آئندہ تہجیات سے پیدا ہوتے ہیں جو تائیٹی (vagal) یا توامی ثلاثی (trigeminal) کسی نواتا تک پہنچتے ہیں۔ جہاں یہ عصبی انقسام کی وجہ سے ام جافیہ سے منسوب ہو جاتے ہیں (کشننگ: Cushing)۔

وریدی اجواف۔ دماغی وریدیں جیکی دیوار میں نرم اور کمزور ہوتی ہیں اور جو دماغ کے ہر نصفان کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہیں وریدی اجواف میں گھسکتی ہیں۔ یہ اجواف استوا دیواروں کی قتالیں ہیں جو ام جافیہ کی بیرونی یا گرد عظمیٰ اور اندرونی یا سہارا دینے والی تہوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں۔ جن مقامات پر فوقانی دماغی وریدیں (superior cerebral veins) فوقانی طولی جوف (superior longitudinal sinus) میں داخل ہوتی ہیں اور جہاں صدغی وتدی اور قذالی وریدیں جانبی جوف (lateral sinus) سے ملتی ہیں وہاں منکوتیہ (arachnoid) ام جافیہ سے مضبوطی سے منضم ہوتا ہے، مگر دوسرے تمام مقامات پر یہ اس سے آزاد ہوتا ہے۔

جانبی جوف (lateral sinus) جراحی نقطہ نگاہ سے بہت اہم ہے۔ جو نہی یہ حللی زائدہ کے نیچے سے پیچھے کی طرف خم کھاتا ہے، حللیہ کے مغارہ اور خلیات سے یہ بہت قریبی علاقہ پیدا کر لیتا ہے جنہیں سے عفونی حالت اس تک تھیل سکتی ہے اور حقیقت و نما ہو سکتی ہے (دیکھو شکل ۲۵ صفحہ 104)۔ جانبی جوف کی نشاندہی مندرجہ ذیل تین نقاط کی تعیین سے کیا جاسکتی ہے (دیکھو شکل ۲ صفحہ 15 اور شکل ۶ صفحہ 25)۔ (۱) قفائینہ (inion)۔ (۲) نجمینہ (asterion)۔ (۳) منقذہ کے نیرین کنارے سے ۱/۲ انچ نیچے ایک نقطہ لیا جائے۔ جب یہ تینوں نقاط ملا دئے جاتے ہیں تو جانبی جوف دو حصوں سے بنا ہوا دکھائی دیتا ہے ایک

افنی حصہ جو قفائینہ (inion) سے لیکر نجمینہ (asterion) تک بتدریج اوپر کو چڑھتا چلا جاتا ہے اور دوسرا انتہائی جو نجمینہ سے دفعتاً نیچے کو پس منحنی نقطہ تک چلا جاتا ہے۔ یہ جوف اہلی میڑ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ داخلی و داہمی (internal jugular) ورید کی شکل میں کھوپری سے باہر نکل آتا ہے جو علی زائدہ کے مقدم کنارہ کی سیدھ میں جاتی ہے، مگر غدہ کلیفہ (parotid gland) کے نیچے گہری واقع ہوتی ہے (شکل ۳)۔

فوقانی طولی جوف (superior longitudinal sinus) کی نشاندہی

کھوپری کی محراب کے اوپر سے الفینہ (nasion) سے لیکر قفائینہ (inion) تک خط کھینچنے سے کیما جاتی ہے۔ اس جوف کے ساتھ ساتھ حفریزات (lacunae) (نزد جوفیہ جا: parasinoids) کے جانبی پھیلاؤ واقع ہوتے ہیں جنہیں بہت سی فوقانی دماغی (superior cerebral) وریدیں 41 کھلتی ہیں۔ یہ جانبی پھیلاؤ فوقانی طولی جوف کے تمام حصوں کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں مگر انہیں سے سب سے لمبے اور اہم ترین جداری (parietal) پھیلاؤ ہیں، جو مرکزی تلافیف کے بالائی حصوں کو ڈھانکتے ہیں (پرسی سارجنٹ: Percy Sargent) فوقانی طولی جوف بعض اوقات علقہ نبھانے سے مسدود ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں خون کو تعمی مجاری میں سے دورہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ فوقانی دماغی وریدوں سے تحتانی دماغی وریدوں اور بالخصوص سلوئیس (Sylvius) کی سطحی وریدیں جو کہنکی جوف (cavernous sinus) میں جا کر ختم ہوتی ہے چلا جاتا ہے۔ فوقانی طولی جوف اکثر حالتوں میں دائیں جانبی جوف میں ختم ہوتا ہے، اور یہ اسلئے بائیں جوف سے بڑا ہوتا ہے۔

کہنکی جوف (cavernous sinus) جسکے اندر داخلی سباتی شریان

(internal carotid artery) اور چٹا بجمی عصب معصور ہوتے ہیں اور جسکی دیوار میں تیسرا اور چوتھا عصب اور پانچویں عصب کا بیشتر حصہ دبا ہوتا ہے، عظم وتدی کے جسم پر واقع ہوتا ہے۔ یہ وتدی ہوائی جوف کے عین اوپر ہوتا ہے، جس میں سے عفونتی حالتیں کہنہ تک پھیل سکتی ہیں جن سے علقت پیدا ہو جاتی ہے ایسی حالتوں میں عینی وریدوں (ophthalmic veins) کے متمدد ہو جانے کی وجہ سے آنکھیں ابھر آتی ہیں، کیونکہ وریدی خون مجہر میں سے

بہ کر جانبی جوف (lateral sinus) اور وڈاجی وریڈ (jugular vein) تک فوقانی اور تحتانی ججری اجواف کے ذریعہ سے پہنچتا ہے۔ نغاسیہ کے سلعات کھٹکی جوف کو لازمی طور پر مضبوط کر دیتے ہیں۔ واخلی سبباتی شریان (internal carotid artery) اور کھٹکی جوف (cavernous sinus) کے درمیان فی تعلقات اتنے قریبی ہیں کہ ان حصوں کو ضرر پہنچنے سے شریان فی وریڈی انورسما واقع ہو چکا ہے۔ مزید برآں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ جوف مجھر میں التهاب موجود ہونے کی حالت میں اپنے بڑے بڑے معاونوں یعنی دونوں عینی وریڈوں (ophthalmic veins) کے ذریعہ سے عمل التهاب کے منتشر ہو جانے سے کس آسانی سے علقت زدہ ہو سکتا ہے۔

تحت جانی فضا (subdural space) ام جافیہ اور عنکبوتیہ کے

درمیان واقع ہوتی ہے، اور پلورائی کھف کی طرح یہ بھی صرف ایک امکانی فضا ہوتی ہے کیونکہ صحت کی حالت میں عنکبوتیہ ام جافیہ کی اندرونی صاف سطح کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ یہ فضا صرف اسی حالت میں بنتی ہے جبکہ سیال یا خون یا پیپ ان دونوں غشاؤں کے درمیان جمع ہو جائے (شکل ۱ صفحہ ۳)۔ تحت جانی فضا میں کی قدر سیال موجود ہوتا ہے جو دماغ کے حرکات نبضان میں رگڑ کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے، اسلئے اس کا فعل پلورائی اور باریطونی تاجوں کے فعل کا سا ہے۔


42

زیر عنکبوتی فضا (subarachnoid space) کی معتد بہ جراحی اہمیت

ہے۔ جو فضا جل شو کی کے ارد گرد موجود ہوتی ہے اسکا دماغ کی زیر عنکبوتی فضاؤں سے بلا واسطہ تسلس قائم ہوتا ہے۔ لہذا جب اس فضا کا بزل جل شو کی کے قطعی حصہ پر کیا جاتا ہے تو دماغ کی زیر عنکبوتی فضاؤں کی سیلیت بھی ساتھ ہی ہو جاتی ہے (شکل ۱۱)۔ اسی لئے درون مجھی دباؤ کے زیادہ ہو جانے کی حالت میں قطعی کوچے (lumbar puncture) کا علاج ہے۔ التهاب سحائیہ (meningitis) میں دماغی نغاسی سیال مکدر ہو جاتا ہے اور زیر عنکبوتی فضا میں یا اسکے بعض حصوں میں کبھی کبھی پیپ بھی موجود ہوتی ہے۔

جل شو کی میں عنکبوتیہ اور ام خونہ کے درمیان بہت سا فاصلہ ہوتا ہے، اس لئے

زیر عنکبوتی فضا وسیع ہوتی ہے۔ جو نہی یہ فضا کھوپری میں داخل ہوتی ہے، دماغ اور بطین چہارم کی چھت کے درمیان یہ پھیل جاتی ہے۔ اس پھیلاؤ کا نام بمرکبہ کبیر (cisterna magna) ہے (شکل ۱۱) بطین چہارم کی چھت میں ایک فتحہ [میجنڈی (Magendie) کا سوراخ] ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے دماغ کے بطینوں کا دماغی نخاعی سیال بمرکبہ کبیر (cisterna magna) کے سیال سے مل جاتا ہے (شکل ۱۱) کھوپری کے قاعدہ پر نخاع مستطیل (medulla) اور جسر (pons) کے سامنے شوکی زیر عنکبوتی فضا بمرکبہ جسری (cisterna pontis) کی شکل



شکل ۱۱۔ اس میں وہ مجموعی فضائیں دکھائی گئی ہیں جن میں دماغی نخاعی سیال ہوتا ہے۔

میں پھیل جاتی ہے۔ اور اس برکہ کا تسلسل ایک بڑی فضا سے ہوتا ہے جو قاعدہ دماغ پر صدفی لختوں کے درمیان اور درون ساچی فضا (interpeduncular space) کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ برکہ قاعدی (cisterna basalis)۔ اس برکہ میں دائرہ ولس (circle of Willis) تیسرا اور چوتھا عصب اور پانچویں عصب کی جڑ بصری صلیب (optic chiasma) و خطہ جات اور جسم نخاعیہ کا قع (infundibulum) موجود ہوتے ہیں۔ قاعدی الہتاب سناں اور basal meningitis میں یہ بعض اوقات پیپ سے متسع ہو جاتا ہے۔ تھمائی نخاعی قعہ (inferior medullary velum) میں جو الہتابی انضمامات واقع ہوتے ہیں ان سے اس غشا کے فتحات کے بند ہونے سے بعض اوقات استسقاء دماغ کی حالت (hydrocephaly)

پیدا ہو جاتی ہے۔

43

دماغ کے تلافیف کے اوپر عنکبوتیہ (arachnoid) کو احم حنونہ (pia mater) محدود کرتی ہے اور یہاں یہ ڈھیلی ڈھالی زیر عنکبوتی بافت کا کام لیتی ہے۔ دائرہ ولس (circle of Willis) سے جو شریانیں نکلتی ہیں انکے ساتھ ساتھ ہر جگہ قاعدی برکہ (basilar cistern) کے پیلاؤ تجاویف دماغ کی ام حنونہ میں آجاتے ہیں۔ دماغ کے قاعدہ کامیان باقی (interpeduncular) حصہ جس (pons) اور خنخ مستطیل (medulla) اگرچہ ان قاعدی برکہ جات پر واقع ہوتے ہیں مگر صدغی اور جہی لختہ جات کھوپری کے قاعدہ پر بلا واسطہ ملن ہوتے ہیں اور قذالی لختہ دینی خیمہ (tentorium cerebelli) پر واقع ہوتا ہے۔ دماغ کے تینوں قطب یعنی جہی، قذالی اور صدغی، اسخیمہ اور کھوپری سے بلا واسطہ ملے ہوتے ہیں اور اسلئے یہ دماغ کے وہ حصے ہیں جنکے سر پر ضرب آجانے کی حالت میں دریدہ ہو جانے کا سبب زیادہ احتمال ہوتا ہے۔

دماغی نخاعی سیال بطور حائل کے کام کرتا ہے اور یہ ان مضر اثرات کو جو

44

دوران خون کی بے قاعدگیوں سے دماغ پر (جو کہ نہ دبنے والے کہف میں واقع ہے) ہو سکتے ہیں زائل کر دیتا ہے۔ اگر جانبی بطینوں کے قریب کے بڑے بڑے عصبی مراکز امتلا سے متورم ہو جائیں تو ان مراکز کو کسی نہ دبنے والی دیوار کا مقابلہ نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ تھوٹے سے دماغی نخاعی سیال کو میجنڈی (Magendie) کے سوراخ کے راستہ سے باہر دھکیل دیتے ہیں، اور یہ حالت اسوقت تک رہتی ہے جب تک کہ دوران خون دوبارہ طبعی نہیں ہو جاتا۔

جب تندرست دماغ ترخان کے سوراخ کے ذریعہ سے معر کیا جاتا ہے تو اس میں نبضان دکھائی دیتا ہے جو قلب کی ہر ضرب کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر یہ نبضان موجود نہ ہو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھوپری کے اندر کا دباؤ شریانی دباؤ سے زیادہ ہے (۱۰۰-۱۳۰ مم پارہ)۔ طبعی طور پر جیسا کہ ہل (Hill) نے ثابت کر کے دکھایا ہے درون جمجی دباؤ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ وریدوں میں خون کا دباؤ ہوتا ہے۔ قلب کے ہر ضربان پر کھوپری میں (۵ مکعب سنٹی میٹر) خون داخل ہوتا ہے۔ اور اسلئے اتنا ہی وریدی خون و داجی ورید کے ذریعہ سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ سیال جانبی بطین سے تیسرے بطین میں سوراخ منزو (Monro) کے ذریعہ سے


اور تیسرے سے چوتھے بطین میں مصیف سلوئیس (aqueduct of Sylvius) کے راستہ سے اور چوتھے بطین سے برکہ کبیر (cisterna magna) میں مچھندی (Magendie) کے سوراخ میں سے ہو کر گزر سکتا ہے (شکل ۱۱)۔ بہت سے ابھی تک ہلٹن (Hilton) کی رائے ہی سے متفق ہیں کہ مصیف مذکور کے مسدود ہوجانے یا مچھندی (Magendie) کے سوراخ یا دوسرے دو فتحات کے جو بطین چہارم کے جانبی زادیوں پر ہوتے ہیں [کے (Key) اور ریٹر ٹیسس (Retzius) کے سوراخ] بند ہوجانے سے بطینوں سے سیال کے باہر آنے کا راستہ رک جاتا ہے اور اس طرح استقائے دماغ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔

خون کی سیلیت اور دہ جالینوس (veins of Galen) سے بھی ہوتی ہے۔ لہذا ان پر دباؤ پڑنے سے اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ استقائے دماغ کی حالتوں میں جانبی بطینوں کے اندر کا دباؤ دماغی نخاعی سیال کی سیلیت تحت جانی فضا میں کرنے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ یہ سیال کسی ایسے دباؤ کے زیر اثر جو دماغی وریدوں کے اندر کے دباؤ کی نسبت زیادہ ہو جذب ہو جاتا ہے (ہل : Hill)۔

اگر دماغ بھی استلا سے کلانی یافتہ ہو جائے تو اسے نہ دبنے والی ہڈی کی بجائے ترتیب پذیر آبی بستر سے مابقت پڑتا ہے، اور اپنی کلانی کے زمانہ میں یہ اس سیال کے کچھ حصہ کو جو اسکے ارد گرد موجود ہوتا ہے زیر غلبہ بقی فضا کے شوکی حصہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ ہلٹن (Hilton) نے قاعدہ کے کسر کے ایک مریض کے متعلق جسکے کان سے دماغی نخاعی سیال بہ رہا تھا، اطلاع دی تھی، جس سے یہ متبادل اثر بخوبی واضح ہوتا ہے۔ جب اسکی ناک اور اسکا منہ بند کر دئے جاتے تھے اور گردن کی وریدیں مضبوط کر دی جاتی تھیں تو زفر کے لئے کوشش کرنے کے ساتھ ہی اخراج سیال میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔

بالغ کے دماغی نخاعی نظام میں سیال کی کل مقدار کا اندازہ ۱۳۰-۱۵۰ مکعب انچ (تقریباً ۴ اونس) کیا گیا ہے۔ اسکا افراز (۱) جانبی بطینوں میں، (۲) تیسرے بطین کی چھت میں، اور (۳) چوتھے بطین کی چھت میں ضغیر و جات شمیمہ (choroid plexuses) سے ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ برٹلیفی (ependymal) سرحد ہی جسکی پوش ان ضغیر و جات پر موجود ہوتی ہے حقیقت میں افراز کے فعل کو سرانجام دیتا ہے۔ یہ سیال مندرجہ ذیل ساختوں کے ذریعہ سے جذب ہوتا ہے۔ (۱) لمفی فضاؤں سے جو عصبی جڑوں کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔

(۲) وریدوں اور وریدی فضاؤں میں گزرنے سے۔ نیز (۳) اجسام پیکونی (Pacchionian bodies) کے ذریعہ سے بھی یہ وریدی نظام میں پہنچ جاتا ہے۔ جب میتھیلین بلو (methylene blue) کا اشراب شوکی زیر معنکوتی فضا میں کیا جاتا ہے تو یہ فوراً دماغ کے بلیٹوں میں ظاہر ہو جاتی ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انتشار جلد ہی واقع ہو جاتا ہے۔ مزید برآں دوران خون میں بھی یہ فوراً ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اسکا اخراج گردوں سے ہوتا ہے۔ عروق لمف سے یہ بہت آہستہ جذب ہوتی ہے، کیونکہ گردن کے غدود کچھ عرصہ گزرنے سے پہلے لون نہیں ہوتے۔



شکل ۱۲۔ پندرہ ماہ کے بچے کے جسم خنامیہ، تیسرے بلیٹ اور اساس الودی، انفی بلووم کی تراش۔ نخامی برون بالید کی ڈنڈی کا بقیہ حصہ انفی بلووم کی چھت میں ظاہر کیا گیا ہے۔


جسم نخا میہ (pituitary body)۔ زمانہ حال میں جسم خنامیہ کو جو ام جانیہ

کے ایک مخصوص خانہ میں بند ہوتا ہے اور اساس الودی (basi-sphenoid) کی بالائی سطح پر واقع ہوتا ہے بہت سی جراحی اہمیت حاصل ہو گئی ہے شکل ۱۲ میں اسکی شکل اور اس کے تعلقات ظاہر کئے گئے ہیں جیسا کہ یہ کم عمر بچہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسکی ڈنڈی تیسرے بلیٹ کے فرش سے نیچے کی طرف کو آتی ہے اور موخریا معصبی (neural) لختہ میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ مقدم یا غدی لختہ معصبی لختہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اسکو ہر طرف سے محیط کرتا ہے۔ غدی لختہ جو فم الاصلی (stomodæum) یعنی جنین کے ذہنی نشیب سے بطور ایک برون بالید کے پیدا ہوتا ہے، دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ ایک گردھبی (perineural) یا دریا (intermediate)

حصہ (ہیرنگ: Herring) 'بوعصبی' لختہ کے ساتھ قریبی طور پر ملا ہوتا ہے اور دوسرا مقدم (anterior) یا پیش عصبی (preneural) حصہ۔ گرد عصبی (perineural) اور پیش عصبی حصہ ایک مرکزی کہفہ کے ذریعہ سے علحدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہفہ سن پوٹو پر منطس ہو جاتا ہے (شکل ۱۲)۔ پیش عصبی غدی حصہ بعض اوقات بیش پروردہ ہو جاتا ہے اور اس سے ایک غدی سلعہ طیار ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے مریضوں میں جسم کے مختلف حصے (خاص کر چہرہ، ہاتھ اور پاؤں) بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت بڑے ہو جاتے ہیں جس سے ایک تاج بولہ الجوارح (acromegaly) کے نام سے موسوم ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بیش پرورش جوانی کے زمانہ میں واقع ہو تو خیرگی تمام ہڈیاں جلد بڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور غریبتیت (gigantism) کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نخامیہ کا گرد عصبی غدی حصہ جسم کے مختلف حصوں کی بالیدگی کو اندرونی افزائے ذریعہ سے منظم رکھتا ہے اور اگر یہ افزائے ضرورت سے زیادہ ہو تو اس سے بیش پرورش پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے مریضوں کو علمیہ جس میں غدی لختہ کا کچھ حصہ کھرچ دیا جاتا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ بالوں میں نخامیہ تک وندی جوف میں سے جس کی چھت پر یہ جسم واقع ہوتا ہے، رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس جوف تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کے غضروفی حصہ کو الٹ کر انفی فاصل (septum nasi) کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف کو جاتے ہیں حتیٰ کہ وندی جوف آجاتا ہے۔ ایک اور راستہ بھی ہے جو شاید مذکورہ راستہ سے بہتر ہے اور یہ صدغی حفرہ میں سے ہے۔ دماغ کے صدغی لختہ کو اوپر اٹھانے کے لئے تاکہ جسم نخامیہ معروض ہو جائے صدغی حفرہ میں وسیع تر فافان کرنا ضروری ہوتا ہے جب نخامی سلعات پھیلنے میں تو کھنکھائی جواف کو مضبوط کر دیتے ہیں اور بصری اعصاب (optic nerves) کے ساتھ قریبی علاقہ رکھنے کی وجہ سے جنوی بصری ذبول اور کوری اور نیز میدان نظر میں تخفیف بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسا سلعہ بعض اوقات وندی جوف کی چھت کو منقوض کر دیتا ہے۔

شکل ۱۲ میں بڑھتے ہوئے نخامیہ کی وندی کانفیہ حصہ انفی بلعوم کی چھت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ارڈہائیم (Erdheim) نے جن جسموں کا (جو ۵ سے اوپر ہیں) امتحان کیا ہے ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جنینی نخامیہ کا یہ بقیہ حصہ (انفی بلعومی نخامیہ) جسم میں موجود ہوتا ہے۔ نخامیہ متجا کے ایک خانہ میں واقع ہوتا ہے جس کی چھت اسکے جسم کی ڈنڈی سے منقبت ہوتی ہے۔ (دلاشاعوں کی مدد سے نخامی حفرہ کا جو شکل ظاہر ہوتی ہے وہ شکل ۱۰ میں ظاہر کی گئی ہے۔ نخامیہ کو رسد خون کثیر التعداد عروق سے پہنچتی ہے جو دائرہ ولس (circle of Willis) سے نکلتے ہیں

اور نیچے اتر کر نخاعینہ کی ڈنڈی تک پہنچ جاتے ہیں۔
دماغ کے سطحی تعلقات - (شکل ۱۳ و ۱۶) دماغ کا طولی شقاق



شکل ۱۳ دماغ اور سی حرکی رقبہ جات کے تعلق کو کھوپری سے ظاہر کرتی ہے۔ کوآین: Quian سے ترمیم کی گئی ہے)۔ سی حرکی رقبہ تا ناریکہ کو ڈسے گئے ہیں۔ ہنگامہ در دھڑکے رقبہ جات میں عمودی خطوط کھینچے گئے ہیں۔ اور بازو اور ہاتھ کے رقبہ جات کے خطوط ان کے کی طرف کو اوپر اور ہاتھ کے رقبہ جات کے خطوط ان کے کی طرف کو مائل ہیں۔ زبان، بلعوم اور جھروکے رقبہ جات پر نقطہ ڈالے گئے ہیں۔ سمودی، تھیف، سب میں وہ رقبہ جات شامل ہوتے ہیں جو ضل میں صرف حرکی ہوتے ہیں، سرخ خطوط ظاہر کی گئی ہے، تھیف، بروکا (Broca) پر تلگم کام کر افقی خطوط سے تاریک کیا گیا ہے۔ الفاظ سننے کام کر فونانی صدی تھیف پر اور الفاظ دیکھنے کام کر زاوی تھیف پر ظاہر کیا گیا ہے۔ سطحی اور تھیف تھیف تھیف کے موڑھوں پر جو رقبہ افقی خطوط سے تاریک کیا گیا ہے، وہ سر اور آنکھوں کی مشرک حرکتوں کے لئے ہے۔

(longitudinal fissure) قتمہ الراس پر سے مقطب (glabella) سے لیکر خارجی قذالی ابھار تک خط کھینچنے سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یہ سامنے سے تنگ ہوتا ہے مگر چونکہ اس میں طولی جوف موجود ہوتا ہے جو پیچھے جاکر فوراً چوڑا ہو جاتا ہے، اسلئے کھیل طرف اس کا عرض معتد بہ ہو جاتا ہے، اور بائیں دماغی نصف کرہ کے غلبہ کی وجہ سے یہ بالعموم خط وسطی سے کسی قدر دائیں طرف کو واقع ہوتا ہے۔ خارجی قذالی ابھار اور کان کے درمیان

جانبی جوف دماغ کے زیریں لیول کی اور دمیخ کے اوپر کے لیول کی حد بندی کرتا ہے (شکل ۶ اور ۱۳)۔ کان آگے وجہ (zygoma) کے بالائی کنارہ کی موثر ترین یو تقاضی سدھی نختہ کے زیریں کنارہ کو ظاہر کرتی ہے۔ سدھی نختہ کا قطب مجری کی بیرونی کور سے $\frac{3}{4}$ انچ پیچھے ہوتا ہے (دیکھو شکل ۶)۔ پیشانی پر دماغ کی زیریں حد کا اندازہ مقطب (glabella) سے لے کر نقطہ سٹیویس (Sylvius) تک مجری بالائی کور سے $\frac{1}{4}$ انچ اور خط کھینچنے سے کیا جاسکتا ہے۔ بصلہ بات شمیمہ (olfactory bulbs) انفینہ (nasion) کے لیول پر واقع ہوتے ہیں (شکل ۱۳)۔

دمیخ کا استقصاء خارجی منفذ کے نقطہ وسطی کے لیول سے $\frac{1}{4}$ انچ نیچے اور $\frac{1}{4}$ انچ پیچھے بہترین طور پر کیا جاسکتا ہے (دیکھو شکل ۱۳)۔ یہ گہرا واقع ہوتا ہے کیونکہ غذائی عضلات (occipital muscles) کے منہاؤں سے ڈھکا ہوتا ہے۔

رولینڈو (Rolando) کے شقاق کی نشاندہی کے جوہیت سے طریقے


پیش کئے گئے ہیں ان میں وہ طریقہ جس کا ذکر صفحہ 26 پر کیا گیا ہے نہایت سادہ اور صحیح ہے۔ جو خط وہاں کھینچا گیا ہے وہ بعض اوقات شقاق کے عین اوپر واقع نہیں ہوتا، کیونکہ سر کی شکل کے لحاظ سے اس کا محل بھی کسی قدر اختلاف پذیر ہوتا ہے۔ دماغ کے حسی حرکی رقبہ جات معودی جبھی اور جداری تلافیت میں، جو رولینڈو کے شقاق کی حد بندی کرتے ہیں، بہت بڑی حد تک واقع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک تلفیف کا اوسط عرض $\frac{3}{4}$ انچ ہوتا ہے۔ اکللیل درز (coronal suture) کا بالائی حصہ رولینڈو کے شقاق سے $\frac{2}{3}$ انچ آگے، اور نیچے کا حصہ اس سے $\frac{1}{4}$ انچ آگے ہوتا ہے۔

سٹیویس (Sylvius) کے شقاق کی نشاندہی مندرجہ ذیل طریقہ سے

کیا جاسکتی ہے۔ جبھی عارضی (fronto-malar) اتصال سے جو ایک نمایاں کٹاؤ سے مرین ہوتا ہے، $\frac{1}{4}$ انچ اوپر اور $\frac{1}{4}$ انچ پیچھے ایک نقطہ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ کنٹیٹی میں عظم جداری کے پیش زیریں زاویہ کے عین اوپر واقع ہوتا ہے (پرینہ: pterion)۔ پرینہ سٹیویس کے شقاق کے تینوں جوارح اور اس کے تنے کے مقام اتصال کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک خط پرینہ سے پیچھے اور اوپر کی طرف کو جداری فراز سے $\frac{3}{4}$ انچ پیچھے تک کھینچا جائے تو

یہ موخر افقی جارحہ (posterior horizontal limb) یا فرع (ramus) کے محل وقوع کو ظاہر کریگا (شکل ۱۳)۔ اگر جداری فراز بخوبی نمایاں نہ ہو تو شقاق مذکور کی نشاندہی یہی عارضی گناؤ کو پریمہ (pterion) سے ملانے اور اس خط کو پیچھے کی طرف سیدھا بڑھا کر

50



شکل ۱۳۔ وہ خطوط دکھائے گئے ہیں جو دماغ کے بڑے بڑے شقاق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ریڈ (Reid) کا قاعدی خط مجر کے زیرین مائشہ سے پیچھے کی طرف کو منفذی نقطہ میں گزرتا ہوا کہنیا گیا ہے۔

جداری فراز تک پہنچانے سے، جیسا کہ شکل ۶ میں ظاہر کیا گیا ہے، کی جا سکتی ہے (آر۔ جے۔ بری R.J. Berry)۔ اس فرع (ramus) کی حدیچے کی طرف فوقانی صدی تغلیف سے بنتی ہے جیسے ٹمٹ وسطی میں "ساعت الفاظ" مرکز ہوتا ہے (شکل ۱۳)۔ اوپر کی طرف اسکی حد بندی آگے سے لیکر پیچھے کی طرف کو تحتانی جہمی تغلیف کے قاعدی حصہ، صدوی جہمی اور جداری تغلیف کے زیرین سروں، اور فوق حاشی ترمید (supramarginal gyrus) سے ہوتی ہے۔ بل لکڑ

51

تین حصوں میں زبان، جگر، بلعوم اور منہ کی حرکتوں کے مرکز واقع ہوتے ہیں۔ اگر خط سلوئس کے اختتام کے ساتھ ملا کر ایک پینی (penny) رکھ دیا جائے تو وہ زاویہ بی تلفیف کو جس میں "بصارت الفاظ" کا مرکز موجود ہوتا ہے دھک لگایا (شکل ۱۳)۔ جداری فراز فوق حاشیہ تلفیف کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ شقاق سلوئس کا صعودی جارحہ پرینہ (pterion) سے اوپر کی اور کسی قدر آگے کی طرف کو ایک $\frac{3}{4}$ انچ لمبا خط کھینچنے سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور چھوٹے مقدم افقی جارحہ کی نشاندہی اسی نقطہ سے آگے کی طرف کو ایک $\frac{1}{4}$ انچ لمبا خط کھینچنے سے کیا جاسکتی ہے۔ صعودی اور مقدم جوارح کے درمیان تختانی جبہ بی تلفیف کا جزو منسلک (pars triangularis) واقع ہوتا ہے جس میں "حرکی تلم" (motor speech) کا مرکز موجود ہوتا ہے۔ بروکا (Broca) کا یہ خیال تھا کہ بائیں تختانی جبہ بی تلفیف (جو اکثر تلفیف برکا کہلاتی ہے) لفظ سے ایک خاص تعلق رکھتی ہے۔ مگر حال ہی میں پیرے میرے (Pierre Marie) اور دوسروں نے اس حصہ کے مرض کے کئی ایک واقعات کا بیان شائع کیا ہے جن میں لفظ غیر متاثر رہا تھا۔ شقاق سلوئس کا تنہا $\frac{1}{4}$ انچ لمبا ہوتا ہے اور عظم وندی کے جناح کبیر کے بیچے سے بیچے اور آگے کی طرف کو جاتا ہے (شکل ۱۳)۔ صدغی لختہ اسکے نیچے واقع ہوتا ہے۔

عظم جداری کے چاروں زاوے بھیجے سے اہم تعلقات رکھتے ہیں۔

پیش زبرین زاویہ تختانی جبہ بی تلفیف کے موخر حصہ اور شقاق سلوئس کے مقدم افقی اور صعودی جوارح کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ وسطی سمائی بشریان کی مقدم شاخ معد اپنے رفیق جوف کے اسکے بیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے۔ پیش فوقانی زاویہ سیما (bregma) پر فوقانی جبہ بی تلفیف کے انتہائی سرے اور گولے کے حرکات کے مرکز کو پوشیدہ رکھتا ہے پس فوقانی زاویہ تمودہ (lambda) پر تہ الی لختہ کے بالائی حصہ کے اوپر اور جداری تہ ذالی شقاق سے $\frac{1}{4}$ انچ پیچھے واقع ہوتا ہے۔ پس تختانی زاویہ جانبی جوف کے انحداب کو پوشیدہ کرتا ہے اور دماغ کی زیرین حد کو ظاہر کرتا ہے۔ شقاق سلوئس کے موخر جارحہ کا مقدم نصف فلسمانی درز (squamous suture) کے بیچے واقع ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف کو یہ سب کا سب عظم جداری کے نیچے چلا جاتا ہے۔ لہذا اس سے یہ ظاہر ہے کہ عظم جداری تمام جداری لختہ، جبہ اور

52

صدغی لغوئیں کے موخر حصوں، اور قذالی لغوئہ کے بالائی مائشیہ کو ڈھٹکتی ہے۔

ستحمانی صدغی تلفیف (inferior temporal convolution)

وجنہ کے بالائی کنارہ اور خارجی منفذ کے اوپر سے پیچھے کی طرف کو چلی جاتی ہے، اور طبل (tympanum) کی چھت پر ٹٹکن ہوتی ہے۔ اسلئے یہ ان خراجات کا عام ترین محل ہے جو اذنِ وسطی کے امراض کے بعد پیدا ہوتے ہیں (شکل ۱۴)۔

بھیجے کے قاعدی عقدہ (basal ganglia) (جو منقطہ: corpus striatum)

اور عرشہ بصری (optic thalamus) اپنے بیرونی رخ پر جزیرہ ریل (island of Reil) سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یہ جزیرہ شقاق سلوئیں کے مقدم تین چوتھائی حصہ میں دبا ہوتا ہے، لہذا اس کے اور قاعدی عقدوں کے لئے بھی شقاق مذکور کے سطحی نشانات ہی استعمال کئے جاسکتے ہیں (دیکھو شکل ۶ و ۱۴)۔ اگر پرینسہ (pteron) کے سامنے نصف انچ نصف قطر کا نصف دائرہ کھینچا جائے تو یہ قاعدی عقدوں (basal ganglia) کی مقدم حد کو ظاہر کرے گا، اور انکی موخر حد اس نقطہ کے سامنے کی طرف اس سے کسی قدر فاصلہ پر واقع ہوتی ہے جس پر جانبی بطینات کا بزل کیا جاسکتا ہے (دیکھو شکل ۳ - صفحہ ۱۵)۔ یہ نقطہ مندرجہ ذیل طریقہ سے معلوم کیا جاتا ہے خارجی منفذ سے ایک انتصابی خط ۵ سنٹی میٹر (۲ انچ) لمبا اوپر کی طرف کو کھینچا جاتا ہے۔ جس نقطہ پر جانبی بطین کا بزل کیا جاتا ہے وہ اس خط کے بالائی سرے سے ۲ سنٹی میٹر (۲ انچ) پیچھے واقع ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر مہزل (trocar) بھونک دیا جائے تو وہ جانبی بطین میں اسکے جسم اور نزولی اور موخر قروں کے مقام اتصال پر داخل ہوتا ہے (جنکینس: Jenkins)۔

نیچے کے حسی حرکی رقبہ جات - بعض ضربات دماغ کا مقام معلوم کرنے اور ان عملیہ جات میں رہبری کے لئے بوقشرہ دماغ پر کئے جاتے ہیں، جراح کے لئے ان رقبہ جات کے محل کی واقفیت رکھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ رقبہ جات صعودی جہی (پیش مرکزی: precentral) اور نیز صعودی جداری (پس مرکزی: postcentral) تلفیف میں واقع ہوتے ہیں۔ مگر شرنگٹن (Sherrington) اور گرؤنباوم (Grünbaum) نے بشر آساقرو (anthropoid apes) میں ان تلفیف کے قشرہ کو زیادہ صحیح طور پر پہچان بہنچانے سے یہ دریافت کیا ہے کہ حرکی تعاملات محض صعودی جہی تلفیف ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

53

حرکی رقبہ جات کی ترتیب شکل ۱۵ میں ظاہر کی گئی ہے۔ جوارہ اسفل اور وسط کی حرکتیں صعودی جبھی تلیفیف کے بالائی ایک تہائی حصہ اور بیشتر اسکے اس حصہ سے جو دماغ کے وسطی رخ پر ہوتا ہے متعلق ہوتی ہیں۔ اور بازو کی حرکتیں اس تلیفیف کے وسطی حصہ کے زیر اثر ہوتی ہیں اور چہرہ، منہ اور حنجرو کی اس کی زیریں ایک تہائی کے ماتحت ہوتی ہیں۔ سیمنگٹن (Symington) اور کرمبل (Crymble) نے



شکل ۱۵ پیش مرکزی یا صعودی جبھی تلیفیف میں حرکی رقبہ جات کے اور پس مرکزی یا صعودی جداری تلیفیف میں حسی رقبہ جات کے مقامات کو ظاہر کرتی ہے۔

مرکزی یعنی رولینڈو (Rolando) کے شقاق کی جسامت اور شکل کے متعلق تحقیقات کی ہے اور اس نے شکل ۱۶ کے مطابق یہ معلوم کیا ہے کہ یہ شقاق اکثر دماغوں میں دو مقامات پر بالائی اور زیریں تلیفیفی پشتوں سے پیچھے کی طرف کو دبا ہوتا ہے۔ ان پشتوں کا محل اور حرکی رقبہ جات سے انکا تعلق اور سہمی درز سے انکا فاصلہ شکل ۱۶ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

رولینڈو کے شقاق کے پیچھے صعودی جداری تلیفیف میں حسی رقبہ جات واقع ہوتے ہیں اور یہ صعودی جبھی تلیفیف کے حرکی رقبہ جات کے متناظر ہوتے ہیں۔

جب کوئی سلعہ دماغ کی سطح کو دباتا ہے تو قشرہ میں پہلے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ لہذا

اگر سلعہ حسی رقبہ پر واقع ہو تو یہ اس رقبہ کی زیر اثر حرکتوں میں تحریک پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر یہی رقبہ پر واقع ہو تو جو احساسات اسکے متعلق ہوتے ہیں انہیں تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جان بعد قشرہ میں جلد ہی تباہی نمودار ہو جاتی ہے، اور اسکے وظائف معطل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ابتدائی تحریک کی جگہ فقدان حرکت اور فقدان حس نمودار ہو جاتا ہے۔ دروں مجموعی بالیدوں سے پیدا شدہ علامات کی



شکل ۱۶ پیش مرکزی تیزید کے تلافینی مرمیہ جات اور حسی رقبہ جات کے ساتھ ان کے تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔ (سمٹنگٹن : Symington اور کرمبل : Crymble-)

تخصیص مقام بعض اوقات ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹے سے سلعہ سے بھی جو کھوپری کی استوار دیواروں کے اندر ہونے والے ایسے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں جو وسیع رقبہ جات پر منقسم ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے زوجی حرکات (conjugate movements) وسطی جبہ کی تغلیف کے موخر سرے پر کے قشرہ کے زیر اثر ہوتے ہیں (شکل ۱۵)۔ مزید برآں قشرہ میں بہت سے ابتدائی حسی رقبہ جات بھی ہیں (وہ رقبہ جات جو بصارت اور سماعت اور شامہ سے تعلق رکھتے ہیں) جو دروں مجموعی ضررات سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور ان سے ایسے علامات پیدا ہوتے ہیں جن سے جراح کو مکمل مرض معلوم

کرنے میں مدد ملتی ہے۔ استنبصاری قشرہ (visual cortex) ظہری شقاق (calcarine fissure) کے نزدیک اور قذالی لخنہ کے ارد گرد واقع ہوتا ہے۔ ”بصارت الفاظ“ کا مرکز زاویہ ٹریٹ (angular gyrus) میں واقع ہوتا ہے (شکل ۱۳)۔ سمعی قشرہ (auditory cortex) فوقانی صدغی تلیفیف کے گہرے یا دہے ہوئے حصہ میں پایا جاتا ہے۔ اور ”ساعت الفاظ“ کا مرکز اس تلیفیف کے وسطی ثلث سے منسوب ہے۔ سنی قشرہ (olfactory cortex) خطاف (uncus) میں واقع ہوتا ہے، جو صدغی لخنہ کے اندر کی طرف موجود ہوتا ہے۔ خطاف کے قرب وجوار کئی لغات سنی احساسات میں اختلال پیدا کرنے کے علاوہ ”خوابی حالتیں“ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔

بیجھ کے متعلق عمومی طور پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جراحی نقطہ نگاہ سے

یہ نرم بافت کا صرف ایک بڑا سا تودہ ہے جس کو ہلانے سے اسی طرح نقصان پہنچ سکتا ہے جس طرح کہ جلاٹین کو ڈبہ میں ہلانے سے پہنچتا ہے۔ چونکہ اسکی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ یہ بہت آسانی سے دب سکتا ہے، اور اس سے جمی کھڑے تباہہ پر نہیں ہوتا، اسلئے یہ کھوپری میں ادھر ادھر ہلایا جاسکتا ہے، اور اپنی دیواروں کے ساتھ ٹکرانے سے اسکو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیجھ کی کوئی یا اس کے کچلے جانے کی حالت میں یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جہائیکہ دماغ اور دماغ کا تعلق ہے ضرور دوسرے حصص کی نسبت زیادہ کثرت سے انہی کی زیریں سطح پر واقع ہوتا ہے (دیکھو صفحہ 43)۔ مگر مذکورہ بیان کی ایک نمایاں استثنائی حالت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دماغ کے قاعدہ کے دو حصے جو دماغی تنجائی سیال کے ایک عظیم قاعدی اجتماع پر مشتمل ہوتے ہیں شاذ و نادر ہی کوفتہ ہوتے ہیں۔ یہ حصے شعاع مستطیل، جسر، اور میاں ساپچی فضا پر مشتمل ہوتے ہیں۔

رسد خون عروق خون کی رسد دماغ میں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دونوں

بڑے بڑے شریانی تنوں (فقری: vertebral اور داخلی باقی: internal carotid) میں کھوپری میں داخل ہونے سے قبل خم پیدا ہو جاتے ہیں، جسکا مقصد شاید یہ ہے کہ انقباض قلب کے جوش و خروش دماغ پر ہونے میں ان میں کھینچ ہو جائے۔ داخل ہونے کے ذرا بعد ہی یہ ایک تنجہ دارہ (دائرہ ولس: circle of Willis) کی شکل میں مل جاتے ہیں، جسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ دماغی دوہلن جو میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ریلٹی جاری صرف اسی حالت میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں جسکے ان

شریائوں میں سے جن سے دائرہ آس بنتا ہے کوئی بڑی شریان مسدود ہو جائے۔ اگر زندہ کتنے کی بائیں سباتی (carotid) شریان میں کسی رنگین مصلول کا انشراب کرویا جائے تو توپنی مادہ صرف بائیں نصف کو رنگ ہی محدود رہتا ہے۔ لیکن اگر دائیں سباتی (carotid) شریان پہلے ہی سے باندھ دی گئی ہو تو توجہی مادہ دائیں اور بائیں دونوں نصفوں میں پایا جاتا ہے (Kramer:)

وسطی، دماغی (middle cerebral) شریان کی سداویت سے دماغی قشر کا ایک وسیع رقبہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ عرق تیسرے جہی، بالائی اور وسطی صدغی، زوایہ، فوق جاشی، اور نیز صغودی جہی اور جداری تزارید کی زیرین دوتہائی کو رسد پہنچاتا ہے۔ ایسی حالت میں حسی حرکی رقبہ کے صرف وہی حصے تباہ ہونے سے بچتے ہیں جو حوارج اسفل اور وسط کے لئے ہوتے ہیں۔ ان مرکوزوں کو اور جہی اور جداری لمختوں کی وسطانی طرف کو اور بیرونی جانب پر قشر کے ہم پہلو حصہ کو مقدم دماغی (anterior cerebral) شریان رسد پہنچاتی ہے۔ قذالی لمختہ اور صدغی قذالی ملاقیف کو موخر دماغی (posterior cerebral) شریان سے رسد پہنچتی ہے۔

ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مشترک سباتی (common carotid) شریان کی بندش سے بھیجے پر کوئی اثر نہ ہو، اگرچہ اس علقہ کے بعد موت زیادہ تر دماغی جیسید گیوں ہی سے واقع ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سباتی (carotid) اور دو فقری (vertebral) شریانیں بھیجے کو کافی خون لاسکتی ہیں، مگر بطبی عروق میں کافی کلانی پیدا ہونے سے پیشتر جس سے بھیجے کے تمام حصوں کو خون یکساں طور پر تقسیم ہو سکے، چند ہفتے گزر جاتے ہیں۔ دونوں مشترک سباتی شریانوں کو بند لگایا گیا ہے۔ اور نیز ایک طرف کی سباتی شریان کے مرض کی وجہ سے مسدود ہونے کی حالت میں دوسری طرف کی سباتی شریان باندھی گئی ہے، مگر کوئی نمایاں دماغی اختلالات رونما نہیں ہوئے۔ مگر جب دونوں شریانوں کے بند کرنے میں چند ہفتوں سے کم وقفہ رہا ہے تو مریض کسی حالت میں بھی روبصحت نہیں ہوا۔ فقری شریانیں دماغ کو خون کی ایک کافی مقدار بھیج سکتی ہیں بشرطیکہ ان پر بار تدریج ڈالا جائے اور دماغ کو کچھ وقت دیا جائے تاکہ وہ اس تغیر سے آہستہ بہتہ موافقت پیدا کرے۔ کتے میں چاروں کی چاروں شریانوں کو بند لگانے کے بعد شوکی اور دماغی شریانوں کا قنم جو سوراخ کبیر (foramen magnum) میں ہوتا ہے زندگی قائم رکھنے کیلئے کافی ثابت ہوا ہے (Hill:)۔ چھوٹی دماغی شریانوں میں سے کسی ایک میں سادات (emboli) کی واٹ لگ جانے سے عام طور پر فوراً تباہ کن قنم کچ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی سداویت

علم الجراحت میں مشترک سباتی (common carotid) شریان کے اور سہلے سلسلہ میں پائی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان اور سماؤں کے صرف امتحان ہی کرنے میں تاجہ میں سے تھکے کا ایک ٹھونڈا سا ٹکڑا اعلیٰ ہڈی کے دماغ میں چلا گیا، اور اس سے کسی ایک دماغی عرق میں ڈاٹ لگ گئی۔ چنانچہ سباتی شریان کے اور سہلے کا صرف امتحان ہی کرنے سے ناچ نصفی (hemiplegia) پیدا ہو چکا ہے جیسا کہ لیڈز (Leeds) کے مسٹر ٹیل (Mr. Teale) نے ایک واقعہ میں درج کیا ہے۔ دماغ کے نبضانات ایسے سلعات یا ہتھکڑیاں سیال ہیں بھی متصل ہو جاتے ہیں تو کھوپڑی کے کسی دور میں سے سطح دماغ تک پہنچ جائیں۔ ایسے نبضانات شریانی نبض سے مراد ہوتے ہیں مگر دماغی نبضات کے نبض نگاری ترسیلات (sphygmographic tracings) سے مدد منجھنی منجھنی۔

(respiratory curve) بھی ظاہر ہوتا ہے، جس کا بلا واسطہ ایصال صدر سے وریڈوں کے اندر کے خون کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ وریڈی وریڈ (jugular vein) کے زیرین سرے پر جو مصراع ہوتا ہے وہ خون کی بلا واسطہ بازوی کو جو قلب سے دماغ کی طرف کو ہوتی ہے روکتا ہے، مگر یہ خون کے دباؤ کے انتقال کو نہیں روکتا۔

اگرچہ بھیجے کے زخموں میں سے سیلان خون بکثرت ہوتا ہے، مگر یہ سیلان بغیر کسی دقت کے بند ہو جاتا ہے، کیونکہ عروق میں فوری انقباض کی استعداد موجود ہوتی ہے۔ دماغ کے قشرہ سے بڑے بڑے سلعات کا استیصال نزف سے ضرورت سے زیادہ وقت اٹھائے بغیر کیا جاسکتا ہے۔ دماغی شریانیوں کی انتہائی شاخوں کے درمیان ام خونہ میں بکثرت تقسم پایا جاتا ہے، مگر وہ بہت چھوٹی چھوٹی شریانیوں جو قشرہ کو منقبض کرتی ہیں اور اس کو رسد پہنچاتی ہیں انتہائی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر دماغ کی سطح پر کوئی دباؤ ڈالا جائے تو اس سے قشرہ کے اس حصہ میں عدم دمویت پیدا ہو جائیگی، اور اگر یہ دباؤ اسی طرح رہے گا تو یہ حصہ تباہ ہو جائے گا۔

کسی دماغی وریڈ کو باندھنے سے قشرہ کے اس حصہ میں جس کی سیلیت اس میں ہوتی ہے عام طور پر نزول واقع ہو جاتا ہے (ہارسلے : Horsley)۔ دماغ کی سطح پر ہمیشہ ایک متغیر وریڈ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ وریڈ بالائی دماغی وریڈوں کو زیرین دماغی وریڈوں سے ملاتی ہیں۔ زیرین دماغی وریڈیں تعداد میں چار ہوتی ہیں۔ ان میں تین صدی اور غذائی لختوں میں سے نکل کر باقی جوف میں ختم ہو جاتی ہیں، اور چوتھی سلویس (Sylvius) کی سطحی وریڈ غلیم وندی کے جناح صغیر کے جوف میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ صدی اور غذائی لختوں کو

ان وریدوں کو منشق کئے بغیر جو جانبی جوف سے جا کر ملتی ہیں، خیمہ (tentorium) پر سے اٹھایا نہیں جاسکتا۔

دیمغ (cerebellum) کی تقریباً ساری وریدیں جانبی جوف پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ اسکی شریانیں فقری (vertebral) اور قاعدی (basilar) شریانوں سے نکلتی ہیں۔ دیمغ، جس، اور شخاع مستطیل کو جو مختلف شریانیں رسد پہنچاتی ہیں وہ اپنی تقسیم میں انتہائی ہوتی ہیں اور اس لئے ہر عصبی مرکز اور ہر رقبہ کی عرقی رسد اپنی اپنی ہوتی ہے (سٹاپ فورڈ: Stopford)۔ دیمغ کے سلعات سے عضلی ضعف اور بے آہنگی (inco-ordination)، دوران سر، اور عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ دودہ (vermis) یا دیمغ کے وسطی حصہ کا تعلق دھڑ کو تمبیدہ کرنے کی حرکات کے ساتھ زیادہ بلا واسطہ ہے۔ جانبی لیختے ہم آہنگی اور جسم کو پھیرنے کے حرکات (وہ حرکات جو دھڑ کے انقباضی محور پر کئے جاتے ہیں) سے تعلق رکھتے ہیں (ہارسلی: Horsley)۔ یہیں ایسے ثبوتوں کی بنا پر جن کی تعداد میں تند ریج اضافہ ہوتا جاتا ہے یقین ہو گیا ہے کہ دیمغ کا نقشہ فعلی اور خطی رقبہ بات میں منقسم ہے۔

باب چہارم

محجر اور آنکھ منجبر

(ORBIT)

محجر (orbit) کے قطر مندرجہ ذیل ہیں۔ پیش پشی تقریباً $\frac{1}{4}$ انچ (۴۳ ملی میٹر)؛
 انتصابی قاعدہ پر $\frac{1}{4}$ انچ (۳۱ ملی میٹر) سے ذرا زیادہ؛ افقی قاعدہ پر تقریباً $\frac{1}{4}$ انچ (۲۵ ملی میٹر)۔
 گلوب کے قطر یہ ہیں۔ مستعرض ۲۴ ملی میٹر؛ پیش پشی ۲۴، ۵ ملی میٹر؛ انتصابی ۲۲ ملی میٹر (بریلی: Brailey)۔
 اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقفلہ (eyeball) محجر کے اطراف کی نسبت اس کے
 بالائی اور زیریں حواشی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور گلوب اور دیوار محجر میں سب سے زیادہ
 فاصلہ بیرونی جانب پر ہوتا ہے۔ لہذا گلوب سے باہر کی جانب پر شکاف دینے سے محجر کے اندر
 تک نہایت آسانی سے رسائی ہو جاتی ہے۔ اور مقفلہ کا استیصال کرنے میں عام طور پر باہر کی طرف
 ہی سے قیچی ڈال کر بصری عصب (optic nerve) کو کاٹا جاتا ہے۔ مگر بائیں آنکھ کو کھاتے
 وقت بصری عصب کو اندر کی طرف ہی سے کاٹنا زیادہ سہل ہوتا ہے۔

محجر کی عظمی دیواروں میں سے اس کا فرش، چھت، اور بالخصوص اسکی اندرونی دیوار،

یہ تینوں بہت پتلے ہوتے ہیں، اس لئے جو اجسام غریبہ مجریہ میں بھونکنے جائیں وہ نجی کہنے یا ناک۔ یا عظم مصفااتی کے غلیات میں آسانی داخل ہو جاتے ہیں اور جب انکارخ اوپر کی طرف سے ہو تو یہ منارہ میں چلے جاتے ہیں (دیکھو شکل ۲، صفحہ ۱۱۶)۔ بہت سی مثالوں میں نیز نوک والے کسی آلہ، مثلاً جیمزی یا نکلر کا سر، مجریہ میں سے دماغ میں بھونک دیا گیا ہے اور اس خطرناک ضرر کے کوئی خارجی نشانات باقی نہیں رہتے۔ نیلیٹن (Nélaton) نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں داخلی سبانی (internal corotid) شریان مجریہ میں سے زخمی ہو گئی تھی۔

مجری کی بیرونی دیوار کا مقدم ایک تہائی حصہ صدغی حفزہ (temporal fossa)

سے عظم عارضی (عظم جنبی: os zygomaticum) کے ذریعہ سے (شکل ۱، ا) اور اس کا موخر دو تہائی حصہ کھوپری کے وسطی حفزہ سے جس میں صدغی لختہ موجود ہوتا ہے، و تدی کے جناح کبیر کے ذریعہ سے علحدہ ہوتا ہے۔ میاں مجری سلعات کے دور کرنے کے لئے ایک سہل راستہ کروٹلین (Kronlein) نے دریافت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجری کی بیرونی دیوار صدغی حفزہ میں سے کھول دی جاتی ہے۔ خود کشی کرنے اور جنگ کے دوران میں جو زخم آتے ہیں ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی صدغی حفزہ میں سے داخل ہو کر مجری کی بیرونی دیوار میں سوراخ کرنے کے بعد مقلبا بصری عصب کو تباہ کر سکتی ہے گرد دماغ کو چھوئے بغیر بھی چھوڑ دیتی ہے۔ صدغی لختہ کا قطب مجری کے بیرونی حاشیہ کے پیچھے اس سے ۲ سے لیکر ۵، ۲ سنٹی میٹر کے فاصلہ پر واقع ہوتا ہے (دیکھو شکل ۶ صفحہ ۲۵، اور شکل ۱۰ صفحہ ۳۶)۔

مجری کی دیواروں کے تعلقات جراحی نقطہ نگاہ سے دلچسپ ہیں، کیونکہ خون کے انقباض اور سلعات کی بروں بالیدیں قرب و جوار کے حفزہ جات سے اس تک پھیل سکتی ہیں، نیز مخاط یا بیپ کے اجتماعات بھی مجری اور ام کی شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا ہے کہ صدغ پر شدید چوٹ لگنے سے خون تحتانی مجری (inferior orbital) (فندی کی-spheno-maxillary) شقاق میں سے گذر کر مجری میں پہنچ گیا ہے اور اس سے زیر طبعی کم (subconjunctival ecchymosis) پیدا ہو گیا ہے، جبھی جوف کے متعدد ہونے سے خواہ یہ مخاط یا (مقلیہ خالیہ: mucocoele) یا بیپ سے مجری کے بالائی اور اندرونی حاشیہ پر اندرونی (وسطانی) جفتی رباط کے لیول سے اوپر بعض اوقات ایک نمایاں سلسلہ نمودار ہو جاتا ہے جو گلوب کو نیچے کی

باہر کی اور آگے کی طرف کو دیکھیں دیتا ہے۔

مجری بصلی روا (fascia bulbi) (حس کا ذکر آئندہ آئیگا) سے پیچھے شحم کے عضلات

عروق اور اعصاب کے علاوہ بہت سے پس مجری نابستہ شحم (retro-orbital loose

(۱۱) سے ملو ہوتا ہے۔ اس جری کے انجذاب سے ہزال کی حالتوں میں آنکھیں دس جاتی ہیں۔ اس بافت کی وجہ سے مجری خراج آسانی پھیل جاتا ہے۔ یہ خراج ضربات، بعض ششی التهابات، اور گزشتہ التهاب وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے یا منسلک عضلات سے بھی پھیل کر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب سے بعض اوقات تمام کفہ پر ہو جاتا ہے جس سے منقلہ آگے کی طرف کو نکل آتا ہے اور اس کے حرکات محدود ہو جاتے ہیں اور دوران کو میں نکل آنے کی وجہ سے لقمہ میں بہت سی سرخی پیدا ہو جاتی ہے، اور پوٹوں میں دم آ جاتا ہے۔ مزید برآں پس مجری شحم میں تیراگیر جسامت اور عجیب غریب شکل کے اجسام غریبہ بھی غالباً ایک طویل عرصہ تک پڑے رہتے ہیں اور ان سے کوئی نمایاں علامات نمودار نہیں ہوتے چنانچہ لوسن (Lawson) نے ایک واقعہ کی اطلاع دی ہے جس میں ٹوپی ٹانگنے کی ایک آہنی کھوئی کا سا پنج لبا لکڑا مریض کو معلوم ہونے کے بغیر ہی اسکی آنکھ میں کئی دن تک رہا۔ اور فورنوجارڈن (Fourniaux Jordon) نے ایک نرمن کو ب کا واقعہ درج کیا ہے جس میں شدید رمد (ophthalmia) پیدا ہو گیا تھا اور صرف چند ہفتہ بعد جبکہ وہ اپنے زیرین پوٹوں کو انگلی سے دبا رہا تھا تو ”گرم ہیپ کے ایک آرام دہ مہا پر سے گندم کا ایک دانہ دفعۃً باہر نکل آیا جس سے ایک مضبوط سبز لہی ٹیوٹ آیا تھا“ مزید برآں پس مجری شحم میں امجر کی اندرونی دیوار کے کسور کے بعد جن سے انفی حفرہ جات اور اجواف بھی ماؤف ہو جاتے ہیں ایک وسیع انفاخ (emphysema) بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ داخل شدہ ہوا سے بعض اوقات گلوب بروز کر آتا ہے اور بعض اوقات اسکی حرکتیں محدود ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ پوٹوں تک بھی پھیل جاتی ہے تاکہ صاف کرنے پر یہ بہر حالت میں زیادہ ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں مجری شحم بڑھتے ہوئے سلطات کے لئے ایک عمدہ گوارہ ہے۔ سلحہ مندرجہ ذیل مقامات میں سے پھیل کر مجری پر آسانی حمل آور ہو سکتا ہے۔ (۱) کلبوری کے قاعدہ سے (۲) انفی حفرہ جات سے (۳) نکی منارہ سے یا (۴) صدغی یا زیر صدغی (وجنی) حفرہ جات سے۔ پس ان مثالوں میں سے کسی ایک میں بھی بالید ہڈی کی ان پتلی تھوں کو جو درمیان میں داخل ہوتی ہیں، تباہ کر کے مجری میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور نکی منارہ کے سلطات کے مجری میں داخل ہو کر عام طریقہ

یہی ہے۔ علاوہ ازیں سلعہ نمبر ۱۱ میں سے سوراخ بصری (optic foramen) یا فوقانی بصری (superior orbital) (ونڈی: sphenoidal) شقاق میں سے گذر کر اور ناک میں سے نفی ذمی قنات (nasolacrimal duct) میں سے گذر کر اور مذکورہ بالا دونوں حفرہ جات میں سے تحتانی بصری (inferior orbital) (ونڈی: فکی: sphenomaxillary) شقاق میں سے گذر کر مجریہ میں زیادہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ مزید برآں سلعات کی ابتداء جی نیچ العظم (ivory exostosis) کی شکل میں مجریہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ مجر کی ہڈیاں کا سہسر (calvarium) اور خارجی سمی منفذ (سماخ) کی ہڈیوں کے ساتھ اس قسم کے عظمی سلعات کی تکیوں کی طرف ایک خاص میلان رکھنے میں شریک ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس سلعہ سے مجریہ کہنے بالکل پر ہو جاتا ہے۔

بصلی ردا (fascia bulbi) (ٹینن: Tenon) کا کیسہ)۔ اس ساخت کو

62


بہترین طور پر لاک وڈ (Lockwood) نے بیان کیا ہے جس کی تحقیقات میں سے پروفیسر لنگھم (Prof. Cunningham) نے مندرجہ ذیل خلاصہ پیش کیا ہے :-

”یہ کیسہ ایک محکمہ اور ڈھیلی ڈھالی غشا ہے جو گلوب کے مونخر ۱/۲ حصہ پر پھیلی ہوتی ہے۔ اور اس سے صرف قرنیہ ہی آزاد ہوتا ہے۔ سامنے کی طرف یہ چشمی ملتحمہ کے نیچے واقع ہوتا ہے جس سے یہ مضبوطی سے پوسٹہ ہوتا ہے۔ قرنیہ کے حاشیہ کے نزدیک یہ اسی سے مل کر ختم ہو جاتا ہے (شکل ۱۴)۔ پیچھے کی طرف جہاں عصب بصری صلیبہ میں سے گذرتا ہے وہاں کیسے غلاف سے متحد ہو جاتا ہے۔ اس غشا کی وہ سطح جو گلوب کی طرف ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے اور وہ منقل کے ساتھ تھوڑی سی نرم اور ڈھیلی فضا کی بافت کے ذریعہ سے چسپی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا اس سے گلوب کے لئے ایک قسم کا گنبد یا ایک طرح کا قتب (socket) یا درجک بخاتی ہے جس میں یہ حرکت کرتا ہے۔ کیسہ کی مونخر سطح مجریہ شحم سے مل کر جاتی ہے۔ چشمی عضلات کے اوتار اس کیسہ کو گلوب کے خط استوا کے مقابل منقبت کرتے ہیں (شکل ۱۴)۔ اور ان نخات کے لب جن میں سے چاروں عضلات مستقیم گذرتے ہیں پیچھے کی طرف کو عضلات پرفلاؤں کی شکل میں بہت کچھ اسی طرح بڑھ جاتے ہیں جس طرح کہ داخل منوی ردا داخل منوی حلقہ سے جل منوی پر بڑھ آتی ہے۔“

63

جہاں داخل اور خارجی مستقیم عضلات کیسہ کو منقبت کرتے ہیں وہاں کیسہ کی مضبوطی اطالیتس مجسر کی اندرونی اور بیرونی دیوار تک پھیل جاتی ہیں۔ چونکہ یہ اطالیتس دونوں مستقیم

عضلات کے فعل کو محدود کر دیتی ہیں اسلئے انکو رباطات ضابط (check ligaments) کے نام موسوم کیا گیا ہے (شکل ۱۷)۔ یہ قرنیہ کی ایک جانب سے دوسری جانب کی حرکت کو ۴۵ درجہ تک ہونے دیتے ہیں۔ خارجی رباط ضابط زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ خارجی دیوار سے خارجی جفنی سیون (external palpebral raphi) (جفنی رباط : tarsal ligament) کے سین پیچھے چسپیدہ ہوتا ہے۔ اندرونی رباط کی چسپیدگی دمئی تاجہ کے پیچھے کی طرف اس کے



شکل ۱۷ ٹینن (Tenon) کے کیسہ (بصلی روا : fascia bulbi) اور رباطات ضابط کی ترتیب کو ظاہر کرتی ہے۔


مقلد باہر کی طرف پھرا ہوا ہے اور اسی لئے خارجی رباط ضابط تیندہ ہے اور داخلی ڈھیلا ہے

قریب ہی واقع ہوتی ہے۔ کیسہ کی ایک طالت فوقانی مورب عضلہ (superior oblique) کے

گرد ہو کر بکرہ (trochlea) تک چلی جاتی ہے۔ مقلد کا تعلیقی رباط (suspensory ligament)

مقلد کو سہارے رکھتا ہے۔ یہ حقیقت بصلی روا (fascia bulbi) کا زیر جھری ہوتا ہے جس میں دباز پائی جاتی ہے، اور یہ معجری دیواروں سے داخلی اور خارجی رباطات ضابط سے چسپیدہ ہوتا ہے۔ اوپر کا جبڑا دور کرتے وقت جراح کو چاہئے کہ وہ تعلیقی رباط کی چسپیدگیوں کو محفوظ رکھنے

کے لئے احتیاط سے کام لے۔ اگر چہ سپید گیاں تباہ ہو جائیں گی تو مقلہ نیچے کی طرف کو گر جائیگا۔
 حَوَل (squint) کے لئے علیہ جات سرانجام دیتے وقت بصلی (fascia bulbi) کے اس قریبی تعلق کو جو اسکو مُقلہ، ملتحمہ، مجری عضلات اور دیوار ہائے مجر سے ہوتا ہے یاد رکھنا چاہئے۔



شکل ۱۸ مجری عضلات کے فعل کو ظاہر کرتی ہے (دائیں آنکھ)۔ سیدھے تیر اس سمت کو ظاہر کرتے ہیں جس میں قریب حرکت کرتا ہے یعنی جس طرف آنکھ دیکھتی ہے۔ منحنی تیر اس گردش کے رخ کو ظاہر کرتے ہیں جو پیش پس محور پر واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ فوقانی مورب عضلا آنکھ کو نیچے اور باہر کی طرف کو حرکت دیتا ہے اور ایسے اندر کی طرف کو گھماتا ہے۔ حرکت کا نقطہ ابتدا ۱۲ بجے کا مقام ہے۔

(ڈاکٹر ای۔ ولف: E. Wolff کی عنایت سے۔)

شکل ۱۹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب عضلہ مستقیم کا وتر ٹینن (Tenon) کے کیسہ میں کاٹ دیا جاتا ہے تو اسکے غلاف اور کیسہ میں مسلسل باقی رہنے کی وجہ سے اسکی چسپیدگی مُقلہ اور ملتحمہ سے اور نیز رباطات ضابطہ کے ذریعہ سے دیوار ہائے مجر سے برقرار رہتی ہے۔ لہذا جب کسی عضلہ کا وتر مکمل طور پر کاٹ دیا جاتا ہے تو یہ مُقلہ پر اپنا فعل کر سکتا ہے۔ اور اسکی مکمل باز کشیدگی رباطات ضابطہ سے رک جاتی ہے۔

64 مجری عضلات (orbital muscles) چاروں مستقیم عضلات باریک اور

چیلے غنائی اوتار پر ختم ہوتے ہیں۔ حوال الحین (strabismus) کے علاج کے لئے خارجی یا داخلی مستقیم عضلہ کا ویز اکثر کاٹ دیا جاتا ہے۔ ان اوتار کا عرض ۷ ملی میٹر سے لیکر ۹ ملی میٹر تک ہوتا ہے اور یہ قریب کے نزدیک صلیب پر ختم ہوتے ہیں۔ داخلی مستقیم عضلہ قریب کے حاشیہ سے ۵ و ۶ ملی میٹر اور خارجی مستقیم عضلہ ۸ و ۹ ملی میٹر اور تحتانی ۲ و ۳ ملی میٹر اور فوقانی ۸ ملی میٹر کے فاصلہ پر ختم ہوتا ہے۔

داخلی اور خارجی مستقیم عضلات مقلہ کو خالصہ اندر اور باہر کی طرف کو گردش دینے والے عضلات ہیں اور ان کے مقابلہ میں فوقانی اور تحتانی مستقیم عضلات اپنے خطوط کشش کی وجہ سے مقلہ کو اندر کی طرف اور اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف کو گردش دینے والے عضلات ہیں۔ ان کے اندر کی طرف کو گردش دینے کے رجحان کا مقابلہ دو عضلات موربہ (oblique muscles) کرتے ہیں جو مقلہ کو باہر کی طرف اور نیز اوپر کی اور نیچے کی طرف کو گھمانے کا کام دیتے ہیں۔

65

شکل ۱۸ سے مجری عضلات کے افعال کی وضاحت میں مدد ملے گی۔ مزدوج افقی حرکات جو دائیں اور بائیں جانب کو ہوتے ہیں داخلی اور خارجی مستقیم عضلات سے عمل میں آتے ہیں۔ جب قریب اوپر کی طرف کو اٹھتا ہے تو اس وقت تحتانی موربہ اور فوقانی مستقیم عضلہ فعل کرتے ہیں۔ انیس سے پہلا عضلہ قریب کو صدغی سمت میں حرکت دینے کی اور دوسرا انفری سمت میں حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے قریب کو نیچے کی طرف لانے میں دو عضلات کام کرتے ہیں، عضلہ مستقیمہ تحتانیہ (inferior rectus) اور عضلہ موربہ فوقانیہ (superior oblique)۔ انیس سے پہلا حرکات کو انفری سمت میں منصرف کرتا ہے اور دوسرا عارضی سمت میں پھیل دائیں اور بائیں طرفوں کے ان عضلات کو بھی ظاہر کرتی ہے، جو مزدوج حرکات میں ہم آہنگ ہوتے ہیں چنانچہ آنکھوں کو نیچے کی اور دائیں طرف کو پھیرنے میں دائیں طرف کا موربہ فوقانیہ (superior oblique) بائیں طرف کے عضلہ مستقیمہ تحتانیہ (inferior rectus) کے ساتھ فعل کرتا ہے۔ اگر انیس سے ایک عضلہ مشلول ہو جائے تو یہ حرکت سرانجام دینے پر دو نظری یعنی ازدواج البصر (diplopia) پیدا ہو جاتا ہے۔ مزید برآں یہ ضروری یاد رکھنا چاہئے کہ ان تمام حرکتوں کے دوران میں وہ عضلہ جس سے مثبت فعل صادر ہوتا ہے اپنے عضلہ مفاد سے جتنی فعل سرانجام دیتا ہے

منضبٹ رہتا ہے۔ اگر عضلہ مضبوطی ہو جائے تو فعال عضلہ متقلہ کو اس حد تک کھینچ لیتا ہے کہ رابطہ اضافی اسکی حرکت کو مانع آتا ہے۔ دوران حیات میں تمام مجری عضلات ایک تنش کی حالت میں ہوتے ہیں اور متقلہ پر ایک خاص دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔

مجری عروق خون (orbital blood vessels) - دوران مرض میں

ان عروق میں مداخلت ہونے سے ایسے اماریات پیدا ہو سکتے ہیں جو تشنجی نقطہ نگاہ سے اہم ہوتے ہیں۔ مجری شریانیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور گلوب کا استیصال کرتے وقت انکو کاٹنے سے شاذ و نادر ہی کوئی تکلیف پیدا ہوتی ہے کیونکہ مجرکی دیواروں پر انکو باسانی مضبوط کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ کے نابض سلعات یا تو کسی مجری شریان کے ضربی انورسماٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور یا کسی ایسے شریانی وریدی انورسماٹ پر منحصر ہوتے ہیں جو داخلی باقی (internal carotid) شریان اور کہنگلی جوف (cavernous sinus) کے درمیان بگلیا ہو۔ مزید برآں داخلی باقی (internal carotid) عرق کے کسی انورسماٹ کا دباؤ یعنی ورید (ophthalmic vein) پر اس مقام پر پڑنے سے جہاں یہ جوف میں داخل ہوتی ہے ویسے ہی سب علامات پیدا ہو سکتے ہیں جو نابض مجری سلعات میں پائے جاتے ہیں۔ کہنگلی جوف (cavernous sinus) کی علیقت عینی وریدوں (ophthalmic veins) میں اتساع اور مجموعہ (proptosis) پیدا کر دیتی ہے۔

66

مجری اعصاب (orbital nerves) کو مجری زخم آسنے یا مجر اور نر

کھوپری کے قاعدہ میں کسور واقع ہونے کی حالت میں نقصان پہنچ جاتا ہے اور مختلف حصوں کے سلعات، انورسماٹ، نرنی اور الہتہابی انصبابات بھی بعض اوقات انپر دباؤ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ لوکسن (Lawson) نے ایک واقعہ کا اندراج کیا ہے جس میں اوپر کے پونے پر سے ایک ہول بگنے سے عصب بصری (optic nerve) گلوب کے مجروح ہونے اور کسی ہڈی میں کسور واقع ہونے کے بغیر ہی کٹ گیا تھا۔ نیز یہی عصب مجر کے کسور میں بھی عموماً مکمل طور پر دریدہ ہو چکا ہے، اور جو کسور عظم و تدی کے جملہ صغیر پر اثر انداز ہوتے ہیں انہیں اسپر دباؤ بھی پڑ چکا ہے۔ سی سی چو آس کے مشاہدہ میں ایک مریض آیا ہے جس میں کھوپری کے قاعدہ میں کسور واقع ہونے کی صرف یہی ایک علامت تھی کہ مدقہ میں قہقہہ اتساع پایا جاتا تھا۔ امتحان کرنے سے ثابت ہوا کہ

مرغیں اب ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ اور اس امر کا اسے علم نہیں تھا۔ اور اس کے بعد بصری بول (optic atrophy) شروع ہو گیا۔ جس مقام پر تیسرے چوتھے اور چھٹے عصب اور پانچویں عصب کی پہلی قسمت کا علاقہ کہفتی جوف (cavernous sinus) سے ہوتا ہے وہاں پر یہ عصب اعصاب ایسے انورسما سے جو داخلی سباتی (internal carotid) شریان کے سلسلہ میں ہوا، مانوف ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کسی ایسی بالید سے بھی جو تختانی مجری شقاق (inferior orbital fissure) کے سلسلہ میں ہو (مثلاً شقاق مذکور کے حاشیہ سے پیدائندہ گرد عظمی کریب) دب جاتے ہیں۔ اور چھٹا عصب کھوپری کے قاعدہ سے بہت قریبی تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کے کسر میں بلا واسطہ طور پر عرضاً پھٹ چکا ہے (پریسکاٹ ہیوٹ: Prescott Hewett)۔

تیسرے عصب کے شلل میں اوپر کا ہونٹا گر پڑتا ہے۔ (سقوط الجفن:

(ptosis)۔ آنکھ تقریباً ساکن ہوتی ہے اور عضلہ مستقیمہ خارجہ (external rectus) کے غیر متخالف فعل کی وجہ سے اس میں منفرج کول پایا جاتا ہے۔ اور نہ یہ اندر اور اوپر کی طرف ہٹا جاسکتی ہے اور نہ براہ راست نیچے کی طرف۔ مگر عضلہ موربہ فوقانیہ (superior oblique) اور عضلہ مستقیمہ خارجہ (outer rectus) سے نیچے اور باہر کے رخ میں گردش کی جاسکتی ہے۔ حد قسح اور ثبت ہوتا ہے اور قوت توفیق میں بہت نقص آ جاتا ہے۔ ازدواج البصر (diplopia) موجو ہوتا ہے اور بعض اوقات عضلات متقیم کے ڈھیلے ہو جانے سے گلوب کا کسب تقدیر بروہمی پایا جاتا ہے۔ یہ علامات عصب مذکور کے مکمل شلل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جزوی شلل کی حالت میں مذکورہ علامات میں سے صرف ایک دو علامات ہی موجود ہوتے ہیں۔

چوتھے عصب کے شلل میں اکثر کوئی تغیر دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ عضلہ

موربہ فوقانیہ (superior oblique) (جبکہ اس عصب سے رسد پہنچتی ہی ہے فعل کی اس نفاذی کسی حد تک بدیلی طور پر بھی عمل میں آ جاتی ہے۔) آنکھ کی حرکت پذیری میں عام طور پر بہت خفیف سا نقص واقع ہوتا ہے اور یہ جتنا بھی موجود ہوتا ہے زیادہ تر زمین نظر کے اندرونی اور زیرین زاویہ میں ہوتا ہے۔ معروض کو نیچا کرنے سے آنکھ اندر اور اوپر کی طرف کو منحرف ہو جاتی ہے اور جب معروض کو تندرست جانب کی طرف دو تک لے جائیں تو یہ صرف اوپر کی طرف کو ہی منحرف ہوتی ہے

(ازب: Erb)۔ بہر حال گلوب کی بعض وضعوں میں ازدواج البصر خاص طور پر نمودار ہوگا۔

چھٹے عصب کے شلل میں مستحق حوالہ عین موجود ہوتا ہے اور اسلئے

ازدواج البصر (diplopia) بھی پایا جاتا ہے اور نیز آنکھ کو براہ راست باہر کی طرف گردش بھی نہیں دیا جاسکتی۔ چھٹے عصب کے شلل کے ساتھ بعض اوقات طرف مقابل کے داخلی عضلہ مستقیمہ کے عصب کا شلل بھی موجود ہوتا ہے اور اس سے آنکھوں کا مزدوج انحراف (conjugate deviation) پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت چھٹے عصب کے نوات کے ضرر پر دلالت کرتی ہے کیونکہ داخلی عضلہ مستقیمہ کے لئے جو عضبی ریشے نکلتے ہیں، وہ اگرچہ تیسرے عصب کے ہمراہ باہر آتے ہیں مگر انکی ابتدا چھٹے عصب کی ابتدا کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔

بعض اوقات آنکھ کے تمام محرک العین (oculo-motor) اعصاب

مشلول ہو جاتے ہیں اور ایسی حالتوں میں ضرر غالباً آنکھ کے مبداء کے نواتات میں یا کہفکی جوف (cavernous sinus) میں جبکی دیواروں میں یہ اعصاب قریب قریب پڑے ہوتے ہیں واقع ہوتا ہے۔

پانچویں عصب کی قسمت اول کے شلل میں تمام ملتحمہ کی ص

سوائے اس حصہ کے جس سوئیچ کا پوٹا ڈھکا ہوتا ہے (جسکو تحتانی مجری عصب کی جفنی شاخ سے رسد پہنچتی ہے) اور گلوب کی اور اس جلد کی جس کو فوق بکری (supratrochlear) یا فوق مجری (supraorbital) عصب سے رسد پہنچتی ہے اور نیز مخاطی اور جلدی سطحوں کی جس جگہ کو انفی (nasal) (انفی ہدیٰ: naso-ciliary) عصب رسد پہنچاتا ہے مفقود ہو جاتی ہے۔ عدم حیثیت کا رقبہ عصب کے تشریحی تفرع سے بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ کچھ حصہ پر جلدی اعصاب کا تراکب بھی موجود ہوتا ہے۔ ملتحمہ کو خراش پہنچانے پر کوئی معکوس حرکت (مثلاً آنکھ جھپکنے کی) واقع نہیں ہوتی۔ مگر آنکھ پر نیز روشنی ڈالنے سے مریض آنکھ جھپک لیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں عصب بصری اس اثر کو عصب وجہی کے نوات تک منتقل کر دیتا ہے۔ ناک کے مقدم حصہ کی غنائے مخاطی کو خراش پہنچانے سے چھینک بھی نہیں لائی جاسکتی۔ اس شلل سے بعد

بعض اوقات قریب میں ایک تباہ کن تفریح رونما ہو جاتا ہے، جو کسی حد تک عصب مشلول کی ان پرورشی شاخوں کو ضرر پہنچنے سے پیدا ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور کسی حد تک عدم حیست کے واقع ہو جانے سے بھی پیدا ہوتا ہے جس سے حصص کو آسانی ضرر پہنچ سکتا ہے، اور نیز یہ کسی حد تک حسی اعصاب کے اس معکوس اثر کے غائب ہو جانے سے بھی ظاہر ہوتا ہے جو یہ عروق خون کے قطر یہ پر رکھتے ہیں، اور جس سے التهاب بے روک بڑھتا چلا جاتا ہے، مثیل شب:

-(Nettleship)

عنقی مشار کی اعصاب کے شلل میں جنفی شقاق (palpebral fissure)

(fissure) اوپر کے پوٹے کے کسی حد تک گر جانے سے تنگ ہو جاتا ہے اور گلوب مجری میں واضح طور پر پیچھے کی طرف کو ہٹ جاتا ہے اور نیز قزحیہ کے موسع عضلہ کے شلل سے جس کو مشار کی اعصاب سے رسد پہنچتی ہے حد تک کسی قدر تنگ ہو جاتا ہے۔ اوپر کے پوٹے کے گرنے کی توجیہ اس امر سے کی جاسکتی ہے کہ ہر ایک پوٹے میں غیر مخطط عضلی ریشہ کی ایک تہ موجود ہوتی ہے۔ اوپر کے پوٹے کی یہ تہ رافع الجفن (levator palpebrae) کی اندر کی سطح سے پیدا ہوتی ہے اور جنفی غصروف سے اس کے بالائی حاشیہ کے قریب پیوستہ ہوتی ہے (شکل ۲۱ صفحہ ۸۶)۔ عضلہ کی یہ تہ جو اپنے فعل کے دوران میں پوٹے کو اوپر اٹھائے رکھتی ہے عنقی مشار کی کے زیر اثر ہوتی ہے۔ گلوب کے پیچھے کی طرف ہٹنے کے متعلق بعض کا یہ خیال ہے کہ اس کا باعث عضلہ مجریہ (orbitalis muscle) کا شلل ہوتا ہے۔ یہ عضلہ جو تحتانی مجری شقاق (inferior

orbital fissure) کے اوپر کی طرح واقع ہوتا ہے غیر مخطط ریشہ جات سے مرکب ہوتا ہے۔

اور اس کی عصبی رسد مشار کی سے آتی ہے۔ اس عضلہ کے انقباض سے (جیسا کہ یہ حیوانات

میں عنقی مشار کی کے ہیجان سے پیدا کیا جاتا ہے) گلوب کا بروز واقع ہو جاتا ہے۔ اور گردن میں

مشار کی کو کاٹ دینے سے مقل باز کشیدہ ہو جاتا ہے (کلاڈ برنڈ: Claude Bernard)۔ گلوب

کے عروق خون کے قطر یہ میں کوئی تغیر دیکھنے میں نہیں آتا۔ غیر مخطط عضلہ درون مجری دباؤ


کو برقرار رکھتا ہے اور اس لئے عینی وریدوں میں سے خون کو واپس جانے میں مدد دیتا ہے۔

حیوانات مثلاً بیل میں جن میں مجر کی وریدیں سر نیچے رکھنے میں جیسا کہ چرنے میں رہتا ہے تسع

ہو جاتی ہیں، عضلی نظام بہت نمایاں ہوتا ہے۔

مقلہ (EYEBALL) (شکل ۱۹)

قرنیہ (cornea) قرنیہ کی دبازت ۹ و ۱۰ ملی میٹر (جو مرکز پر ہوتی ہے) سے لیکر ۱۵ ملی میٹر تک (جو محیط پر ہوتی ہے) ہوتی ہے۔ اسکی دبازت کے متعلق ذرا سا دھوکہ ہونے کا



شکل ۱۹ مقلہ کی افقی تراش جو عدسہ کے تعلیتی رباط، مانی اور زجاجی کو شکوں، عصب بصری کے مقام دخول اور نقرہ مرکزی کو ظاہر کرتی ہے۔

(کشیف: Schaffer کے مطابق)۔

احتمال ہوتا ہے اور قرنیہ میں چاقو داخل کرتے وقت اسے مناسب زاویہ پر نہ رکھا جائے تو بعض اوقات تھوڑے فاصلہ تک اسکے درقوں میں چلا جاتا ہے۔

70

قرنیہ کی ترکیب۔ سامنے کی طرف میطبق سرحد سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اور

اس ترکے دور ہو جانے اور دوران اندمال میں اسکے اپنی جگہ پر پھر قائم ہو جانے سے فضل و تقا ایک بد نما ندب پیدا ہو جاتا ہے جو بصارت میں بھی خلل انداز ہوتا ہے جب کوکین (cocaine) کے زیر اثر کوئی جسم غریب نکالا جائے تو غیر حواس سطح کو ایسے ضرر کے اثر سے بچانے کے لئے جو

گرو پرانے یا نئے سے پیدا ہو جاتا ہے ضروری تدابیر اختیار کرنا چاہئیں۔ کیونکہ اس قسم کی احتیاط کے عمل میں نہ لانے سے وسیع قرنیہ بنی خراشیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں، جن سے بعد میں بیاضی (leucomatous) قطعات بگٹتے ہیں۔ مزید برآں جب یہ تہ خراشیدگی سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جبکہ سیدہ کے لوشنوں کا استعمال جاری ہو معرہ قرنیہ بافت پر سیدہ کے الملاح فراہم ہو جاتے ہیں۔

قرنیہ کا بیشتر حصہ کثیر التعداد لینی درقچوں سے مرکب ہوتا ہے اور ان درقچوں کے درمیان متنظم خلوی فضاں ہوتی ہیں جنہیں قرنیہ جسیمہ جات موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی تہی ہی پکچری کا سرا قرنیہ بافت میں داخل کر دیا جائے تو لینی فضاؤں کے جال کو اشراب سے پر کیا جاسکتا ہے جب قرنیہ کی اصلی بافت میں تفتیح واقع ہو جاتا ہے تو پیپ غالباً انہی فتالوں کے ذریعہ پھیلتی ہے جو التهاب کیوجہ سے متغیر حالت میں ہوتی ہیں اور اس طرح ظفر (onyx) پیدا ہو جاتا ہے۔

قرنیہ میں سوائے اسکے محیط کے جہاں صلبیہ اور ملتحمہ کے عروق شعریہ جنہوں کی شکل میں ختم ہو جاتے ہیں عروق خون کا شائبہ تک بھی موجود نہیں ہوتا۔ مگر خون کی بلا واسطہ رسد کی عدم موجودگی کے باوجود قرنیہ کے زخم بخوبی مندمل ہو جاتے ہیں۔ حالت التهاب میں قرنیہ کی

بافت ہمیشہ غیر شفاف ہو جاتی ہے۔ رخنکی التهاب قرنیہ (interstitial keratitis)

(keratitis) میں عروق خون قرنیہ کے حاشیہ سے اسکے جسم میں کچھ فاصلہ تک گذر جاتے ہیں۔ چونکہ یہ عروق سطح سے کچھ نیچے واقع ہوتے ہیں اور دھندلی قرنیہ بافت سے جو مرض کا نتیجہ ہوتی ہے ڈھکے ہوتے ہیں اسلئے انکا قرمزی رنگ ایک بڑی حد تک ماند پڑ جاتا ہے اور اس قسم کے عروق کا ڈورا سامنی قطعہ (Salmon patch) کہلاتا ہے۔ سب (pannus) میں قرنیہ میں عروق خون پائے جاتے ہیں مگر اس حالت میں مسلسل خراش کی وجہ سے جو عروق گرد و نواح کی ملتحمہ شریاں سے پیدا ہو جاتے ہیں وہ قرنیہ کو اسکی سطحی پوشش کے نیچے سے گذر عبور کرتے ہیں۔ اور اصلی قرنیہ

71

اس حالت میں بھی ویسا ہی بے خون رہ جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ قوس پیری (arcus senilis)

کی اصطلاح کا اطلاق ان دو کم چوڑے سفید ہلالوں پر ہوتا ہے جو بوڑھے اشخاص میں اور مرضیہ انہوں میں قرنیہ کے محیط کے ذرا اندر نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ قرنیہ بافت کے شمعی انحطاط سے پیدا ہوتے ہیں

اور یہ تغیر قرنیہ کی ان تہوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے جو مقدم لچکدار و رتہ کے عین نیچے ہوتی ہیں، یعنی اس حصہ میں جو حاشیہ عروق خون کے سب سے زیادہ زیر اثر ہوتا ہے۔
 قرنیہ میں اعصاب کی رسد بافراط پائی جاتی ہے اور انکی تعداد تخمیناً چالیس اور پچاس کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ اعصاب ہڈی اعصاب (ciliary nerves) سے نکلتے ہیں اور صلبیہ کے اگلے حصہ میں سے گذر کر قرنیہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور منقسم ہو کر اس طبقہ کے ہر ایک حصہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اعصاب لمس، حرارت اور سردی کے لئے حساس نہیں ہوتے بلکہ صرف درد انگیز ہیمنانات کے لئے ہی حساس ہوتے ہیں بصر موتیا (glaucoma) میں جو ایک ایسا مرض ہے جسکے مظاہر کا انحصار بیش ازودہ درون چشمی دباؤ پر ہوتا ہے قرنیہ عظیم الحس ہو جاتا ہے اور اسکی عدم حسیت کا انحصار اس دباؤ پر ہوتا ہے جو ہڈی اعصاب (ciliary nerves) پر انکی شاخوں کے قرنیہ تک پہنچنے سے پہلے ہی پڑتا ہے (نیز دیکھو مقدمہ کی عصبی رسد صفحہ 76)۔

صلیبیہ (sclera) مشیمیہ (choroid) اور قرنیہ (iris) - صلبیہ

(sclera or sclerotic) پیچھے کی طرف زیادہ سے زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ اور قرنیہ سے تقریباً اسی کے فاصلہ پر باریک ترین ہوتا ہے۔ شگوب کے ضرب سے مشتق ہونے کی حالت میں صلبیہ ہی نہایت کثرت سے پھٹتا ہے اور چاک بالعموم قرنیہ سے کچھ فاصلہ پر واقع ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس طبقہ کے باریک ترین حصہ میں ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صلبیہ پھٹ جاتا ہے اور غیر تیندہ ملتحمہ میں انشقاق واقع نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں کبھی کبھی عدسہ صلبیہ کے چاک میں عمل آتا ہے اور ملتحمہ کے نیچے موجود پایا جاتا ہے۔ بصری عصب (optic nerve) کے داخل ہونے کے مقام پر صلبیہ پتلا ہوتا ہے اور عصبی بندلوں کے گذرنے کے لئے اس میں کثیر التعداد سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ سوراخ (lamina cribrosa) بصر موتیا (glaucoma) میں ایک اہم فعل سرانجام دیتا ہے (صفحہ 83) اور بصری حلیمہ (optic papilla) کے نقطہ دار دکھائی دینے کا باعث ہی ہوتا ہے۔ بریلی (Brailly) یہ بیان کرتا ہے کہ صلبیہ کے جانبی حصے اوپر اور نیچے کے حصوں کی نسبت پتلے ہوتے ہیں۔ تحتانی حصہ سب سے زیادہ موٹا ہوتا ہے اور بیرونی دیوار سب سے زیادہ پتلی ہوتی ہے اور اسکی ہی وجہ ہے کہ درون چشمی دباؤ کے اثر سے آنکھ انتصابی رخ کی نسبت جانبین پر زیادہ پھیلتی ہے۔ جن عوارض چشم میں درون چشمی تناؤ

بڑھا ہوتا ہے (سبز موتیا وغیرہ) انہیں شدید درد کے (جو اعصاب پر دباؤ پڑنے سے پیدا ہوتا ہے) محسوس ہونے کی ایک بڑی وجہ لازمی طور پر مصلبیہ کی سختی اور اسکا کڑا پن اور کثافت ہی ہوتی ہے۔

مشیمیہ (choroid) گلوب کا عرق طبقہ ہے۔ اور اسکی بڑے بڑے عروق خون کا حامل ہیں۔ مشیمیہ اور مصلبیہ کے درمیان دو باریک غشائیں فوق مشیمیہ (lamina suprachoroidea) اور ورقہ اسمر (lamina fusca) ہوتی ہیں۔ یہ ڈیجیلی ڈھالی فضائی بافت کی تھیں ہوتی ہیں جنکا استر درمل سے بنا ہوتا ہے۔ شوالب (Schwalbe) کی فوق مشیمیہ لغی فضا (suprachoroid lymphatic space) انہی کٹے رہنے ہوتی ہے۔ لہذا انفصالت گلوب کی حالت میں ان دونوں طبقات کے درمیان زف بکثرت واقع ہو سکتا ہے اور ایسا زف حقیقتہً چشمی تناؤ کی فوری تخفیف کا مہم جو قزحیہ برآری (iridectomy) یا موتیا بند نکالنے (cataract extraction) کے سہ عملیات سے عمل میں آجاتی ہے نتیجہ ہو سکتا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے زف کے ظاہر ہونے کا زیادہ تر احتمال زجاجیہ (vitreous) میں ہی ہوتا ہے۔ آنکھ کے اگلے حصہ پر ضرب لگنے سے صرف مشیمیہ مہمی (زیادہ تر مفرح حصہ پر) نشق ہو چکا ہے۔ چونکہ مشیمیہ میں لون بکثرت موجود ہوتا ہے، اس لئے یہ جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جنہیں ملانی (melanotic) بالیدیں ابتدائی طور پر واقع ہو سکتی ہیں۔ مشیمیہ کی یہ بالیدیں غالباً لحم سلمی ہوتی ہیں، اور ان سے جگر میں انتقالی بالیدوں کے پیدا ہو جانے کا ایک خاص احتمال ہوتا ہے۔ مگر جلد میں پیدا شدہ ملانی (melanotic) مسلمان کی طرح یہ ثانوی طور پر لغی غد کو ماؤف نہیں کرتیں۔

قزحیہ (iris) بہت عروق دار ہوتا ہے۔ اور اس میں التهاب واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے (التهاب قزحیہ: iritis)۔ قزحیہ اور مصلبیہ کے ساتھ اسکی تعلقات موجود ہونے کی وجہ سے انکا التهاب اس تک آسانی پھیل سکتا ہے۔ بخلاف اسکی قزحیہ اور مشیمیہ عروق میں استدر قزحیہ تعلق موجود ہوتا ہے کہ جو التهابات قزحیہ میں نمودار ہوتے ہیں انکو مشیمیہ طبقہ تک پھیلنے کے لئے ہر ایک ذریعہ حاصل ہوتا ہے جب قزحیہ ملتب ہو جاتا ہے تو اس کے اظہار اور نیز اس کے جرم میں لف اور مصل کا انصباب ظاہر ہو جانے کی وجہ سے اسکی رنگت بدلتی ہے۔ اور قزحیہ میں سے دیکھنے پر اسکی نازک اور مشتبک ساخت اس کے ورم اور انصباب کی وجہ سے دھندلی دکھائی دیتی ہے۔ مزید برآں اس جھوٹی مٹی غشا کے متورم ہو جانے سے حد قد کے

حدود میں مداخلت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ منقبض دکھائی دیتا ہے۔ اور اس غشا کی حرکتیں لازمی طور پر بہت سست ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ امر ملحوظ رکھا جائے کہ قرحیہ کی موخر سطح کا ایک حصہ عدسی کیسے کو فی الحقیقت مس کرتا ہے تو یہ معلوم ہو جائیگا کہ ان دونوں ساختوں کے درمیان الٹہابی انضمامات باسانی واقع ہو سکتے ہیں (شکل ۱۹)۔ لہذا التهاب قرحیہ (iritis) کے بعد قرحیہ کی موخر سطح تمام کی تمام، ایک یا ایک سے زائد مقامات پر لطف کے بندوں کے ذریعہ سے عدسی کیسے سے بالعموم منضم پائی جاتی ہے (اکثر حدیثی جانشیہ منضم پایا جاتا ہے)۔ ایسے انضمامات موخر انضمامات قرحیہ (posterior synechiæ) پر مشتمل ہوتے ہیں اور مقدم انضمامات قرحیہ (anterior synechiæ) کی اصطلاح کا اطلاق قرحیہ اور قرنیہ کے باہمی انضمامات پر کیا جاتا ہے مزید برآں التهاب قرحیہ (iritis) میں بعض اوقات عدسہ بھی ماؤف ہو جاتا ہے اور ثانوی یا الٹہابی موتیابہ (cataract) کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔

قرحیہ کی خلقی عدم موجودگی کا اندراج بھی کیا جا چکا ہے۔ بعض اوقات اس میں ایک خلقی رخنہ موجود ہوتا ہے جو حدقہ سے لیکر نیچے کی اور کبھی قدر اندر کی طرف کو جاتا ہے۔ اس حالت کا نام شقاق القرحیہ (coloboma iridis) ہے اور مشیمیہ در (choroidal cleft) کے برقرار رہنے سے جو قدر بصری (optic cup) کے نمو کے دوران میں بنتا ہے پیدا ہوتا ہے بعض حالتوں میں حدقی غشا (pupillary membrane) کے ریشے حدقہ کے سامنے تنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ غشا جو بعض حیوانات میں پیدائش کے چند دن بعد تک بھی دکھائی دیتی ہے نوع انسان میں پیدائش سے بہت عرصہ پہلے جذب ہو جاتی ہے۔

قرحیہ اپنی انتہا پر مضبوطی سے نہیں چپکا ہوتا (شکل ۲۰)۔ چنانچہ آنکھ کو ضرر پہنچنے کی حالت میں بعض اوقات اپنی چسپیدگیوں سے ہی کم و بیش حد تک علحدہ ہو جاتا ہے اور دوسرے طبقہ جات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بعض اوقات قرحیہ دریدہ ہو کر مکمل طور پر علحدہ ہو گیا ہے اور گلوب کے زخم میں سے باہر بھی نکل آیا ہے جس سے ہدنی زائد سے معرا ہو گئے ہیں۔ قرنیہ میں نافذ (penetrating) زخم آنے کی صورت میں قرحیہ باسانی مسقوط ہو جاتا ہے۔ غشا استقدر نازک اور نرم ہوتی ہے کہ قرحیہ برآری (iredectomy) کے دوران میں اسکا مطلوبہ قطعہ قریب ہی شکاف میں سے مزاحمت محسوس کئے بغیر ہی پکڑ کر باہر کھینچا جاسکتا ہے۔ مزید برآں اس غشا کو عدسہ کیساتھ مس کرنے سے بھی بہت سا سہارا ملتا ہے، کیونکہ جب کبھی عدسہ اپنی جگہ سے ٹل کر زجاجیہ میں چلا جاتا

یا اسے علیہ سے دور کر دیا جاتا ہے تو قزحیہ گلوب کو حرکت دینے پر لرزتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
اگر قزحیہ کثیر العروق ہوتا ہے مگر کاٹنے پر خون کا جریان اس سے شاذ و نادر ہی ہوتا ہے
اور اسکی وجہ شاید ان عضلی ریشوں کا انقباض ہے جو اسمیں بافراط موجود ہوتے ہیں۔

مقلہ کی رسد خون - ۱۔ چھوٹی چھوٹی ہدبی (ciliary) شریانیں

(ophthalmic) شریان سے نکل کر عصب بصری کے نزدیک ہی صلبیہ میں داخل ہوتی ہیں اور
مشمیہ کے بیرونی طبقہ میں کچھ فاصلہ تک جا کر شعری ضغیرہ میں منتسم ہو جاتی ہیں جس سے اندرونی
مشمیہ میں طبقہ کا زیادہ تر حصہ بنا ہوتا ہے۔ سامنے کی طرف اس ضغیرہ سے ہدبی زوائد کو بعض شاخیں
جاتی ہیں۔ ان عروق سے جو وریڈیں پیدا ہوتی ہیں وہ محوں کی شکل میں مرتب ہوتی ہیں کیونکہ انکے
استدقاق سے چار یا پانچ بڑے بڑے تنے بنتے ہیں (گردابی وریڈیں: venæ vorticosæ) جو
صلبیہ میں سے قزحیہ اور عصب بصری کے درمیان کے وسطی نقطہ پر سے گزر جاتے ہیں۔ مشمیہ میں
یہ شریانوں سے باہر کی طرف واقع ہوتے ہیں۔

۲۔ دونوں طویل ہدبی شریانیں (long ciliary arteries)

[جو عینی شریان (ophthalmic artery) سے نکلتی ہیں] صلبیہ کو عصب بصری (optic nerve)
کے باہر کی طرف منتصب کرتی ہیں۔ انیس سے ایک شریان ایک طرف ہوتی ہو اور دوسری دوسری طرف او
یہ آگے کی طرف کو بڑھتی جاتی ہیں حتیٰ کہ ہدبی خطہ تک پہنچ جاتی ہیں اور یہاں یہ شاخوں میں منتسم
ہو جاتی ہیں، جیسے قزحیہ سے قزحیہ کے محیط کے قریب ایک عرقی دائرہ (دائرہ کبیر: circulus
major) بن جاتا ہے۔ اس دائرہ سے بعض شاخیں نکل کر ہدبی عضلہ میں چلی جاتی ہیں اور باقی ماندہ
قزحیہ میں سے استدقاق طور پر گزر کر حد قزحیہ کو چلی جاتی ہیں جن کے کاشانیہ پر ایک دوسرا دائرہ
(دائرہ صغیر: circulus minor) بن جاتا ہے۔

۳۔ مقدم ہدبی شریانیں (anterior ciliary arteries)

[جو عینی (ophthalmic) شریان کی عضلی اور دمی شاخوں سے نکلتی ہیں] صلبیہ کو قزحیہ سے
تقریباً ۲-۳ ملی میٹر پیچھے منتصب کرتی ہیں (ناقشانیہ) اور دائرہ کبیر (circulus major)

سے اگر لمبا جاتی ہیں۔ ان سے ہدی زوائد کو شاخیں جاتی ہیں جہاں کثیر التعداد می جنبہ بنجاتے ہیں۔ یہ شاخیں برقی بافت میں واقع ہوتی ہیں۔ انکی برقی (episcleral) یا غیر ثاقب شاخیں بہت چھوٹی چھوٹی اور کثیر التعداد ہوتی ہیں، اور آکٹھ کی طبعی حالت میں غیر مرنی ہوتی ہیں۔ مگر قزحیہ اور اسکے ہم پہلو حصوں کے التهاب میں یہ عروق قرنیہ کے حاشیہ کے ارد گرد باریک عروق کے ایک تنگ گلابی منطقہ کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ عروق ایک دوسرے کے تقریباً متوازی ہوتے ہیں۔ اور بہت نزدیک نزدیک واقع ہوتے ہیں، اور ملتحمہ کے ساتھ حرکت نہیں کرتے۔ یہ منطقہ منطقہ املاک ہدی (zone of ciliary congestion) یا گرد قرینی منطقہ (circumcorneal zone) کے نام سے موسوم ہے۔

۴۔ ملتحمہ کے عروق دمعی (lacrymal) اور دونوں مہنی

(palpebral) شریانوں سے نکلنے ہیں۔ یہ عروق التهاب کی حالتوں میں متذکرۃ الصدر عروق سے باسانی شناخت کئے جاسکتے ہیں۔ انکی جامت نسبتاً بڑی ہوتی ہے، اور یہ جمید ہوتے ہیں۔ نیز انکی رنگت اینٹ کی سی سرخ اور چمکیلی ہوتی ہے۔ اور ملتحمہ کے ساتھ ہی انکو بھی باسانی حرکت دیجا سکتی ہے اور دبائے سے یہ باسانی خون سے خالی بھی کئے جاسکتے ہیں۔ عروق کے ان دونوں گروہوں میں جو فرق ہے اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ملتحمہ کا التهاب عمیق تر حصص کے التهاب سے تمیز کیا جاسکتا ہے۔ ملتحمی عروق سے بھی قرنیہ کے حاشیہ کے بہت قریب مستقیم عروق شعریہ کے جنبروں کا ایک ضعیفہ بنجاتا ہے جو قرنیہ کے شدید سطحی التهاب میں متسل ہو جاتا ہے۔ قرنیہ کے حاشیہ کے ارد گرد بعض اوقات ایک منطقہ بنجاتا ہے جو ہدی منطقہ (ciliary zone) سے مذکورہ بالا عمومی خواص سے تمیز کیا جاسکتا ہے۔

شبکیہ کی عرق رسد (vascular supply of retina) اسی کے لئے

مخصوص ہے۔ اور یہ شریان مرکزی شبکیہ (arteria centralis retinae) کے ذریعہ پہنچتی ہے جو صرف اس مقام کے علاوہ جہاں عصب بصری داخل ہوتا ہے اور کسی جگہ بھی شبکیہ عروق سے کوئی بلا واسطہ ربط نہیں رکھتی۔ شبکیہ کی بیرونی تہیں جو شبکیہ طبقہ سے علاوہ رکھتی ہیں عروق سے فی الحقیقت مبرا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب کبھی شبکیہ کی مرکزی شریان بند ہو جاتی ہے

تو کوری فوراً پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ قلیل مجانب دوران خون جو عصب بصری کے داخل ہونیکے منہام کے ارد گرد کے باریک باریک نغمات سے وجود میں آتا ہے بالکل ناکافی ہوتا ہے، اور شبکیہ جلد ہی متہیج ہو جاتا ہے۔ لہذا مرکزی شریان کے مستقل طور پر سدود ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شبکیہ کا عرق نظام تقریباً معدوم ہو جاتا ہے۔ سداویت کی بعض حالتوں میں شبکیہ کی شریان کی صرف ایک شاخ ہی مسدود ہوتی ہے اور مریض کی بصارت سوائے اس حصہ کی بصارت کے جسے اس شاخ سے رسد پہنچتی ہے قائم رہتی ہے۔ نقرہ مرکزی (fovea centralis) کو جو تیزی بصارت کا مرکز ہے شبکیہ کی شریان مرکزی (arteria centralis retinae) کی فوقانی اور تحتانی صدغی دونوں شاخوں سے باریک باریک شاخیں پہنچتی ہیں۔

مشیمیہ (choroid) اور شبکیہ (retina) کے درمیان نرف واقع ہونے کی صورت میں خون کا شیمیائی عروق سے آنا لازمی ہوتا ہے اور جب نرف جو اکثر تفسر کا نتیجہ ہوتا ہے رجا جیہ (vitrious) میں واقع ہوتا ہے تو خون یا تو شبکیہ کی عروق سے آتا ہے کیونکہ یہ اس غشا کی اندرونی تہوں میں واقع ہوتے ہیں اور یا بدی خطہ کے عروق سے آتا ہے۔

مقلہ کی عصبی رسد (nerve supply of the eyeball) - ا- ہدیہ

اعصاب (ciliary nerves) جو ہدیہ (ciliary) (عدسی: lenticular) عقدہ اور انفی (nasal) (انفی ہدیہ: naso-ciliary) عصب سے نکلتے ہیں صلبیہ کو عصب بصری کے قریب منتقب کرتے ہیں اور صلبیہ اور مشیمیہ کے درمیان سے انکو رسد پہنچاتے ہوئے آگے کو نکل جاتے ہیں۔ اسکے بعد یہ ہدیہ عضلہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور قزحیہ کے محیط کے قریب ان سے ایک ضفیہ بجاتا ہے جس سے قزحیہ کو شاخیں جاتی ہیں ان شاخوں سے ایک نازک ضفیہ طیار ہوتا ہے۔ جو حد تک پھیلا ہوتا ہے۔ یہ اعصاب صلبیہ کے مقدم حصہ میں سے قزحیہ کو شاخیں بھیجتے ہیں۔ اس طرح ان اعصاب کے ذریعہ سے مقلہ کو حسی ریشے پانچویں عصب کی پہلی قسمت کی انفی یا انفی ہدیہ شاخ سے اور ہدیہ عضلہ اور عاصقہ (sphinctor iridis) کو حسی ریشے تیسرے عصب سے پہنچ جاتے ہیں اور نیز بہت سے مشار کی ریشے بھی حاصل ہو جاتے ہیں جن میں وہ ریشے بھی موجود ہوتے ہیں جو قزحیہ کے موسع عضلہ کو رسد پہنچاتے ہیں۔

جس منہام پر ہدیہ اعصاب مشیمیہ اور صلبیہ کے درمیان سے آگے کی طرف کو گذرتے ہیں

77 دہاں بڑھے ہوئے درون چشمی دباؤ کی حالت میں صلیبیہ کے سخت اور کڑا ہونے کی وجہ سے ان پر مضر دباؤ باسانی پڑ سکتا ہے۔

۲۔ ملتحمہ کی عصبی رسد (nerve supply of the conjunctiva)

چار ذرائع سے پہنچتی ہے۔ فوق کبری (supratrochlear) اوپر کی طرف۔ تحت کبری (infratrochlear) اندر کی طرف۔ اور دمی (lacrimal) باہر کی طرف۔ یہ تمام کے تمام اعصاب پانچویں عصب کی پہلی قسمت کی شاخیں ہیں۔ نیچے کی طرف پانچویں عصب کی دوسری قسمت کی جنبی شاخیں موجود ہوتی ہیں۔

گلوب کی اپنی حس (sensation of the globe itself)

پانچویں عصب کی پہلی قسمت سے آتی ہے۔ اسکے التهابی عوارض مثلاً التهاب قرنہ (corneitis) یا التهاب قزحیہ (irits) میں اس درد کے علاوہ جو حقیقتہً آنکھ میں محسوس ہوتا ہے پانچویں عصب کی پہلی قسمت کی دوسری شاخوں کے ساتھ بھی درد بعید پایا جاتا ہے۔ اس امر کی توجیہ اس طرح کیجا سکتی ہے کہ عینی قسمت (ophthalmic division) کی ابتدا پانچویں عصب کے بالائی حسی نوات (upper sensory nucleus) سے جو چوتھے طین کے فرش میں واقع ہوتا ہے مشترک طور پر ہوتی ہے، مثلاً سے جو عصبی خلیات متعلق ہوتے ہیں صرف انہی میں خلل نہیں آتا بلکہ قرب وجوار کے خلیات بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور نفسی غلطی سے درد ان اعصاب کے ذریعہ بھی معکوس ہو جاتا ہے جو ان خلیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ چشمانی پر فوق کبری (supratrochlear) عصب اور فوق مجری (supraorbital) عصب کے ساتھ ساتھ درد ہوتا ہے۔ نیز دمی شاخوں کے ساتھ ساتھ بھی درد ہوتا ہے (گرد مجری درد) اور انفی عصب کی گذرگاہ پر ناک کی جانب بھی درد ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ درد پانچویں عصب کی دوسری قسمت میں پھیل جاتا ہے اور مدغی خط میں بے آرامی محسوس ہوتی ہے (دوسری قسمت کی مجری شاخ) یا یہ اوپر کے جبڑے اور دانتوں سے منسوب ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا عوارض میں بہت سادہ مع بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ دمی غده کی رسد بھی پانچویں عصب کی پہلی قسمت سے آتی ہے۔

نور ترسی (photophobia) یا عدم تحمل نور آنکھ کے التهابی عوارض میں اور مکر

قرنیہ کے سطحی التهابات میں عام طور پر پایاجائنا ہے۔ عضلہ محیطہ الجفنیہ (orbicular muscle) میں تشنج واقع ہو جاتا ہے، اور یہ آنکھ کو بند رکھتا ہے، اور خراش کے خفیف سے خفیف تک تشنج بھی اس کو بند کر دیتا ہے۔ اگرچہ عضلہ محیطہ الجفنیہ (orbicular muscle) کو عصبی رسد جہی (facial) عصب سے پہنچتی ہے لیکن اسکے عصبی ریشے ساتویں عصب کے نوات سے نہیں آتے، بلکہ یعنی حرکی (oculo-motor) نوات سے آتے ہیں جو پانچویں عصب کے حسی نوات کے نزدیک واقع ہوتا ہے اور اسکے ساتھ معکوس راستوں کے ذریعہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ التهاب قرنیہ (iritis) اور بزموتیا (glaucoma) میں پیش حسیت (hyperæsthesia) بھی موجود ہوتی ہے۔ اور بیرونی جہی اور مقدم صدنی رقبہ جات پر بعید و رد بھی محسوس ہوتا ہے (ہیڈ: Head)۔ اس خط کی جلد اور مقلد کے عصبی مراکز کے درمیان قریبی تعلق موجود ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے امرض خیم میں کنیٹیوٹس پر خراش مقابل کا استعمال کرنے کی توجیہ ہوتی ہے (ہیڈ: Head)۔ افلاط العظام میں ہدنی عضلہ پر جو زور پڑتا ہے وہ دوسرے عام ترین اسباب میں سے ہے، اور اس سے پیشانی کے وسط مجھری حلقہ پر درد و بعید محسوس ہوتا ہے، اور اس پر پیش حسیت کے رقبہ جات رد و ما ہو جاتے ہیں۔

انفی (nasal) (انفی ہدنی: naso-ciliary) عصب اور مجھری مشمولات کے درمیان جو تعلق ہے اسکی مثالیں مزاولت طب میں کئی تہہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ چنانچہ اگر ناک کے اگلے حصہ پر ضرب لگائی جائے، یا اسکے زیرین حصہ کی جلد کو خراش پہنچائی جائے، مبیہ کہ درخیز دل کو دبائے سے پہنچتی ہے تو کثیر تدبیر ظہور پذیر ہوگا۔ ہلاس سے عینی (ophthalmic) عصب کی انفی شاخ کو ہیجان پہنچنے سے ایسے شخص کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے جس کو اسکی عادت نہ ہو۔ یہ ایک مشہور و معروف امر ہے کہ ناک اور انفی حضرة جات کے بہت سے اختلالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ”آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے۔“ انفی عصب اور آنکھ کے درمیان کے قریبی تعلق کی ایک عجیب و غریب مثل اکثر منطقی (herpes zoster) سے ملتی ہے۔ اس عارضہ میں جب پہلی قسم کی صرفہ فوق مجھری (supraorbital) اور فوق کبری (supratrochlear) شاخوں کے خطہ جات ہی ماؤف ہوتے ہیں تو آنکھ بالعموم غیر متاثر رہتی ہے، لیکن جب ثوران اس حصہ تک بھی پھیل جاتا ہے جس کو رسد انفی عصب سے آتی ہے، یعنی ناک کی ایک طرف پر نیچے تک آ جاتا ہے تو مقلد میں اکثر کچھ التهاب پایا جاتا ہے۔

آنکھ کا خطرناک رقبہ۔ صرف قرنیہ یا صرف صلبیہ کے نافذ زخم جو ہدی حصہ سے

بیچھے واقع ہوں کبھی خطرناک نہیں ہوتے، مگر ایسے زخموں کے جن سے جسم ہدی یا اسکا بالکل قریبی حصہ ماؤف ہو گیا ہو نہایت ہی خطرناک ثابت ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ ہدی خطہ کا التهاب اہم عرقی اور عصبی تفتات کی وجہ سے جو اس حصہ میں موجود ہوتے ہیں خاص طور پر خطرناک ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہانتک خونی اور عصبی رسد کا تعلق ہے منقلہ کے اندر اس سے زیادہ اہم اور کوئی خطہ نہیں ہے۔ مزید برآں جسم ہدی سے التهابات کم و بیش بلا واسطہ طور پر قرنیہ، قرحیہ، مشیمیہ، زجاجیہ اور شبکیہ تک پھیل سکتے ہیں۔ جسم ہدی کا کوئی یا قریبی التهاب جو منقلہ کے بعد پیدا ہو جاتا ہے عام طور پر

رمد مشارکی (sympathetic ophthalmia) کے لئے نقطہ ابتدا ہوتا ہے۔ اس

مولناک عارضہ میں دوسری طرف کی صحیح و سالم آنکھ میں تباہ کن التهاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ آنکھ پہلی آنکھ کے ضرر کو دو یا تین ماہ گزرنے کے بعد ماؤف ہو جاتی ہے۔ آج کل عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صحیح و سالم آنکھ مرض زدہ آنکھ سے براہ راست متاثر ہو جاتی ہے۔ ان زیر غلبہ قوتی فضاؤں میں جو اعصاب بصری کے ارد گرد پائی جاتی ہیں تصالب (chiasma) پر تسلسل موجود ہوتا ہے، اور یہ فضائیں ایسے راستے کا کام دیتی ہیں جس میں سے سرائت ایک آنکھ سے دوسری آنکھ تک پھیل سکتی ہے۔

عدسہ (lens) کی پائش ایک طرف سے دوسری طرف تک $\frac{1}{16}$ انچ ہوتی ہے اور آگے سے پیچھے تک بھی $\frac{1}{16}$ انچ ہی ہوتی ہے۔ تمام زندگی میں عدسہ کی جسامت آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے۔ عدسہ معہ کیہ کے تمام کا تمام بالکل شفاف اور بالکل عظیم العروق ہوتا ہے جس طریقہ سے عدسہ اپنی وضع پر قائم رہتا ہے، وہ شکل ۱۹ صفحہ 69 ور شکل ۲۰ صفحہ 82 میں ظاہر کیا گیا ہے۔ عدسہ کا محیط ہدی زاؤند سے باریک اور شفاف منشوریوں کے ایک نظام کے ذریعہ سے پورے ہوتا ہے (عدسہ کا تعلیقی رباط: suspensory ligament of the lens)۔

ان میں سے بعض ریشے عدسہ کے آگے سے اور بعض اسکے پیچھے سے گزرتے ہیں اور اس طرح ان سے عدسہ کے لئے ایک تاجہ یا کیسہ بن جاتا ہے۔ ہدی زاؤند پر تعلیقی رباط کے شعاعی ریشے رطوبت زجاجیہ (vitreous humour) کے شفاف کیسہ سے تسلسل قائم کر لیتے ہیں۔ غنائے شفاف

(hyaloid membrane) عدسہ اپنے تعلیقی رباط کے جزوی انشقاق سے آسانی ڈھیلا ہو سکتا ہے، اور اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، اور مقدم کوشک میں چلا آتا ہے، اور زیادہ پیچھے کی طرف کو زجاجیہ میں جاتا ہے۔ اگر کچھ مداخلت کی جائے تو عدسہ متورم ہو سکتا ہے۔ اس طرح اسکے ارد گرد جو دباؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے یہ ان اہم ساختوں کو جو اس کے آس پاس موجود ہوتی ہیں بہت سا نقصان پہنچا سکتا ہے۔

عدسہ کا کبھی بہت چھوٹا اور پھلکا رہتا ہے، اور جب اسے بھاڑ دیا جاتا ہے تو اس کے کنارے باہر کی طرف کو مڑ جاتے ہیں۔ موتیابند (cataract) کے لئے جو عام عملیہ جات سر انجام دئے جاتے ہیں ان میں یہ بھاڑ دیا جاتا ہے، اور کئی قسم کی ضربوں سے جو منقلہ پر لگ جاتی ہیں یہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ ”موتیابند کے عملیہ کی ایک قسم میں کبھی عدسہ کے ساتھ ہی دو کر دیا جاتا ہے، اور زجاجیہ غشائے شفاف (hyaloid membrane) کی مدد سے جو کبھی عدسہ کے پیچھے واقع ہوتا ہے اپنی وضع پر برقرار رہتا ہے“ (لفٹن کرنل ایچ اسمتھ: Lieut. Colonel H. Smith)۔ جب یہ کبھی زخمی ہو جاتا ہے تو رطوبت مائیہ (aqueous humour) عدسہ میں داخل ہو جاتی ہے اور اسکے ریشے اسے چوس لیتے ہیں۔ اور بعد میں یہ متورم ہو کر غیر شفاف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جرمی موتیابند (traumatic cataract) پیدا ہو جاتا ہے۔ موتیابند کی مختلف قسموں میں تمام عدسہ اور زیادہ تر اس کا کچھ حصہ عتمہ (opacity) کا محل ہوتا ہے۔ یہ اکثر نوات میں شروع ہوتا ہے اور عتمہ دراز تک اسی حصہ تک محدود رہتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ پتھر میں شروع ہوتا ہے۔ اس حالت میں یہ لکڑیوں کے ایک سلسلہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جن کا رخ عدسہ کے محور کی طرف ہوتا ہے، اور ان کا انحصار عدسہ کے ریشہ جات کی ترتیب پر ہوتا ہے۔

تشکیک (retina) کے متعلق صرف اتنا ہی بیان کر دینا کافی ہو گا کہ اس کا تعلق شبیہ سے اتنا خفیف ہوتا ہے کہ یہ اس غشا سے نرف یا دیگر انصبابات کے ذریعہ سے علحدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ گلوب پر سادہ ضرب کے لگنے سے بھی حقیقتہً جدا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ایک وسیع حد تک علحدہ ہونے کے باوجود بھی قرص بصری (optic disc) اور جاشیہ منن (ora serrata) پر چکار رہتا ہے۔

عصب بصری (optic nerve) کی لمبائی محجر کے اندر ۲ تا ۳ ملی میٹر ہوتی ہے۔ یہ عصب مارغ سے نکلتا ہوا اپنا گرد عصبی غلاف ام حنونہ سے لے آتا ہے۔ اسکے علاوہ دو اور غلاف بھی

اس پر ہوتے ہیں جن میں سے بیرونی اہم جانیہ سے ساتھ آتا ہے، اور اندرونی عنکبوتیہ سے یہ غلاف ایک دوسرے سے تیز کئے جاسکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور ان میں جو دو فضاں ہوتی ہیں ان میں سے باہر کی تخت جانی اندر کی تخت عنکبوتی فضا سے سرایت زدہ ہو سکتی ہے چنانچہ دماغی اسجیہ کے التهابی عوارض عصب بصری کے ساتھ ساتھ اس کے غلاف کی فضاؤں میں سے پھیلتے ہوئے قرض بصری تک آسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اور درون تجھی مرض میں، باشتنائے عوارض اسجیہ فضا بھیجے سے قرض تک اس عصب کی رشتہ انصالی بافت میں سے ہونا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ ان تعلقات سے التهاب عصب بصری (optic neuritis) اور درون تجھی مرض کے کثرت کے ساتھ اکٹھا واقع ہونے کی توجیہ کسی حد تک ہوتی ہے۔


جو بھی یہ عصب سورخ بصری سے باہر نکلتا ہے یہ وتدی جوف کی بیرونی دیوار سے مس کئے ہوتا ہے، اور اگر یہ جوف مقابلہ تھیوٹا مو تو یہ موخر مصفاقی حلیات سے ملا ہوتا ہے۔ ان فضاؤں میں تفتیح واقع ہونے کی صورت میں سرایت کے عصب بصری تک پہنچنے کا امکان ہوتا ہے، اور اس طرح التهاب عصب بصری (optic neuritis) شروع ہو جاتا ہے۔

جب کبھی درون تجھی دباؤ کو پری میں کسی سلحہ کے نشوونما پائے، یا زرف واقع ہونے، یا کسی دوسری حالت کے موجود ہونے سے بڑھ جاتا ہے تو یہ تخت عنکبوتی فضا میں سے جو عصب بصری کے ارد گرد موجود ہوتی ہے متعلق ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مرکزی شریان اور ورید اس مقام پر دب جاتی ہیں جہاں یہ اس فضا کو عصب بصری تک پہنچنے کے لئے عبور کرتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ورید مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے چشم بین (ophthalmoscope) میں سے شکستگی وریدوں میں اختقان دکھائی دیتا ہے۔ بعد ازاں دباؤ میں زیادتی واقع ہونے سے قرض میں اور اسکے عین ارد گرد ارتشاح پیدا ہو جاتا ہے، اور اسکے بعد زفات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور شبکیہ شریانوں کی جسامت کم ہو جاتی ہے۔ پہنچ حلیمی (papilloedema) کا وہ نقشہ جو چشم بین سے دکھائی دیتا ہے اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔

مانی اور زجاجی طوبتیں (aqueous and vitreous humours)

مانی رطوبت (aqueous humour) سے مقدم کوشک بُر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ فضا ہے جو عدسہ کے کیسہ اور تعلیقی رباط اور قرنیہ کے درمیان ہوتی ہے۔ قزجید اس فضا کو مقدم اور موخر

دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ چونکہ قزحیہ کا زیادہ حصہ حقیقت عدسہ سے ملا ہوتا ہے اسلئے موخر حصہ ایک زاویہ وقفہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو قزحیہ ہدنی زاوئد اور عدسہ کے تعلیقی رباط کے درمیان ہوتا ہے (شکل ۲۰)۔ مقدم گوشک کا عمق ۳، ۶ ملی میٹر ہوتا ہے۔ قزحیہ کا اندرونی طبقہ صلیبیہ کے ساتھ تسلسل قائم کرتے وقت ریشوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو (۱) صلیبیہ (۲) ہدنی عضلہ اور (۳) ہدنی زوائد کو جاتے ہیں۔ ان ریشوں کے رباط مشطی (ligamentum pectinatum)



شکل ۲۰۔ رباط مشطی۔ فونٹانا کی فضائیں، ہدنی عضلہ اور عدسہ کا کیسہ۔

بقا ہے اور اسکے ریشوں کے درمیان جو وقفے ہوتے ہیں انکو فونٹانا (Fontana) کی فضاؤں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے (قزحیتی قزحیتی فضائیں: iridio-corneal spaces)۔ یہ طبوت مائیہ سے پُر ہوتی ہیں۔ ان فضاؤں کے اندر جو سیال ہوتا ہے وہ جذب ہو کر ایک مدور قنال میں پہنچ جاتا ہے جو صلیبیہ میں ہوتی ہے۔ یہ مدور ویریدی قنال (circular venous canal) یا قنال شلم (canal of Schlemm) کہلاتی ہے (دیکھو شکل ۲۰)۔ یہ قنال صلیبیہ کے مقدم حصہ ہدنی زوائد اور قزحیہ کی ویریدوں سے رابطہ و راہ رکھتی ہے۔ طبوت مائیہ ہدنی زوائد میں سے جو قزحیہ کے پیچھے ہونے میں مسلسل خارج ہوتی رہتی ہو اور اس طرح قنال شلم (canal of Schlemm)

میں جذب ہوتی رہتی ہے، جہاں سے یہ وریدی دوران میں چلی جاتی ہے۔ مقلد کا تئو رقتار افزا اور رقتار انجذاب کے درمیان صحیح صحیح مساوات قائم رہنے سے برقرار رہتا ہے۔ لہذا اگر یہ مقدم کو شک میں چلی آئے (کوشکی ریم: hypopycn) تو یہ بالعموم آسانی جذب ہو جاتی ہے۔ متوسط درجہ کی وعابداریوں پر بھی جو اس کو شک میں واقع ہوں یہی صادق آتا ہے۔ اور جو مشکل زجاجی کو شک سے خون کے مغذب ہونے میں پیش آتی ہے، اس کے مقابل میں مذکورہ انصبابات کا منزع دفعیہ بالکل ایک مختلف حیثیت رکھتا ہے۔

پروفیسر آرتھر تھامسن (Arthur Thomson) نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ صلیبیہ کی اندرونی طرف، قزحیہ کے مقدم قاعدہ پر یا تو متخفص ہوتی ہے، اور یا میز اب دار ہوتی ہے۔ جب حد قزح متسع ہو جاتا ہے تو قزحیہ کے سکڑے ہوئے قاعدہ کا رجحان اس میز اب کو بڑھانے کی طرف ہوتا ہے، اور اس طرح رطوبت مائیکہ کا نکل کر فونٹانا (Fontana) کی فضاؤں میں چلا جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔

زجاجیہ (vitreous) فسادات چشم میں فعال حصہ نہیں لیتا۔ بعض اوقات ہم پہلو حصص کے التهاب میں یہ نانوئی طور پر ماؤف ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں نزفات بھی واقع ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر مختلف اقسام کے غیر شفاف اجسام کا محل ہوتا ہے۔ اجسام غریبہ زجاجیہ میں بغیر کسی علامت کے معتدبہ عرصہ تک پڑے رہتے ہیں۔ (سمادیر: muscae volitantes) جو کو ناہ نظر (myopic) کو اکثر تکلیف دیتے ہیں زجاجیہ میں چھوٹے چھوٹے غیر شفاف ذرات کی موجودگی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انکی شکل بسا اوقات بعینہ ویسی ہی ہوتی ہے جیسی زجاجیہ کے حیموں کی، جبکہ ان کو خوردبین سے دیکھا جائے۔

وہ نازک اور شفاف جھلی جو رطوبت زجاجیہ کے گرد بطور کیسہ کے موجود ہوتی ہے غشائے شفاف (hyaloid membrane) کے نام سے موسوم ہے۔ زجاجیہ شبکیہ سے سوائے اس مقام کے جو پچھلی طرف قرص کے مقابل واقع ہوتا ہے، اور جہاں جنین میں عرصہ کی شریان داخل ہو کر قنالی شفاف (hyaloid canal) میں سے آگے کی طرف کو جنینی حد قزح (foetal pupillary membrane) کو رسد پہنچانے کے لئے بڑھ جاتی ہے، آسانی طعمہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ عرق شبکیہ کی مرکزی شریان کی ایک شاخ ہے جو بعض اوقات سن بلوغ میں بھی ایک جمل لیفی کی شکل میں برقرار رہتی ہے۔ بعض شاذ و نادر مثالوں میں اس کا دوران خون جاری رہتا ہے، اور

اس کا بنضان چشم میں سے دکھائی دے سکتا ہے۔

سبز موتیا (glaucoma) ایک ایسا مرض ہے جسکے علامات کا کلی انحصار گلوب کے دروں چشمی تناؤ کی افزائش پر ہوتا ہے۔ جب منقلہ کے اندر کا دباؤ بنگلیہ اور مشیمہ کی شریا کوں کے خون کے دباؤ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آنکھ کا تغذیہ منقطع ہو جاتا ہے۔ طبعی طور پر دروں چشمی دباؤ دروں چشمی وریدوں کے خون کے دباؤ کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر رطوبت مائیمہ صلبیہ کی مدور وریدی قنال میں متعجب نہ ہو سکے تو یہ دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حالت ویسی ہی ہے جیسی کہ دماغ میں ہوتی ہے۔ آنکھ کی رطوبت مائیمہ بھیجے کے دماغی تناعی سیال کی قائم مقام ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سبز موتیا (glaucoma) کے تقریباً سب مریضوں میں محیط قزحیہ اور قرنیمہ کے درمیانی زاویہ کے، جس میں طبعی حالت میں رباط مشطی (ligamentum pectinatum) واقع ہوتا ہے، مکمل طور پر مدور ہو جانے سے فونٹانا (Fontana) کی مضمف میں بند ہو جاتی ہیں۔


جہاں تک آنکھ سے سیال کے خارجی بہاؤ کا تعلق ہے مقدمہ کو شک کے محیط حصہ کی اہمیت بہت طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ حصہ قرنیمہ کے اختفاب میں قزحیہ سے باعدہ کے ٹل جانے سے عذرہ ہی سے مدور ہو جائے تو گلوب کے دباؤ کی زیادتی اس کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ سبز موتیا (glaucoma) میں قزحیہ برآری (iridectomy) سے جو آرام حاصل ہو جاتا ہے، اس کا انحصار اس امر پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ علیہ رباط وراہ کے ان مجاری کو جو مائیمہ سے شریع ہوتے ہیں علی طور پر کھول دیتا ہے۔ لہذا اس طریقہ عمل کو کامیاب بنانے کے لئے شکاف صلبیہ پر اتنا پیچھے واقع ہونا چاہئے کہ یہ تمام کا تمام زاویہ محولہ بالا میں سے گزرے۔ مزید برآں یہ بھی ضروری ہے کہ قزحیہ کو عین اس کی پیچیدگی تک دور کر دیا جائے اور اس کا معتد بہ حصہ کاٹا جائے۔ قزحیہ برآری (iridectomy) سے بھی رطوبت مائیمہ کے لئے قزحیہ کی ایک جدید شعری سطح پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کے لئے ایک نئے نئے نخرج کا کام دیتی ہے۔ کم عمر اشخاص میں رباط مشطی (ligamentum pectinatum) خلیہ دار اور کھلی ساخت کا ہوتا ہے، اور زیادہ عمر کے اشخاص میں یہ لیفی اور متعقبض ہو جاتا ہے۔ لہذا معمر اشخاص میں سبز موتیا (glaucoma) کے پیدا ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے (لی۔ ہینڈرسن: T. Henderson)۔

سبز موتیا (glaucoma) کے تمام علامات کی توجیہ غیہ طبعی تناؤ کے اثرات سے

ہو جاتی ہے چنانچہ ہر بی اعصاب سخت اور کڑے صلیبیہ پر مضبوط ہو جاتے ہیں جس سے شدید دروید ہوتا ہے۔ نیز مثبت اور تسع حدقہ اور ندیم انکس قرنیہ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے افعال میں اختلال آگیا ہے۔ مضطرب سے جو حصص غالباً پہلے متاثر ہوتے ہیں وہ شبکیہ عروق خون ہیں اور شبکیہ کے محیط یعنی شبکیہ دوران خون کی انتہائی حد پر مضطرب کا اثر ان میں نمایاں ترین ہوتا ہے۔ لہذا امید ان نظر آہستہ آہستہ تنگ ہو جاتا ہے اور یہ علامت سبز موتیا میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اور عصب بصری پر دباؤ پڑنے سے روشنی کے چمکارے اور دوسرے طبعیت پیدا ہو جاتے ہیں جو اس مرض میں پائے جاتے ہیں۔ صلیبیہ کا کمزور ترین حصہ قرص میں ورقہ غریب (lamina cribrosa) پر ہوتا ہے۔ یہ حصہ دباؤ سے جلد ب جاتا ہے اور اس سے سبز موتیا (glaucomatous cup) پیدا ہو جاتا ہے۔ سمت مخالف کا دباؤ عددہ کو آگے کی طرف پھیل دیتا ہے اور اس طرح مقدم کو شک تنگ ہو جاتا ہے۔ اور شبکیہ دوران خون میں جو خلل پیدا ہو جاتا ہے وہ ان متسع عروق سے ظاہر ہوتا ہے جو گلوب پر نمودار ہو جاتے ہیں۔

اجفان (eyelids) (شکل ۲۱)۔ ہر ایک پوٹے میں مندرجہ ذیل تہیں اس

ترتیب سے پائی جاتی ہیں:۔ (۱) جلد (۲) زیر جلدی بافت (۳) عضلہ محیطہ العینیہ (orbicularis oculi) (۴) عضلہ الجفنی صحفہ (عضلہ الجفن فوقانی superior tarsus) اور اس کا تسلسلہ مجر کے حاشیہ یعنی مجری فاسل (غشاء غبی palpebral membrane) تک (۵) عضلہ الجفنی (میبومی: Meibomian) غد کی تہ جو صحفہ مذکور میں مدفون ہوتی ہے اور (۶) لمغہ۔ اوپر کے پوٹے میں عضلہ رافع الجفن (levator palpebrae) عضلہ الجفنی صحفہ کی طرف گزرتا ہوا پایا جاتا ہے۔ پوٹوں کے اوپر کی جلد بہت باریک اور نازک ہوتی ہے اور خون کی جو رگدیریاں اسکے نیچے پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس میں سے باسانی دکھائی دیتی ہیں۔ اس جلد کی ملامت اور زیر جلدی بافت کا ذیلیان اس حصہ کو اچھی طرح سے ترقیبی علیہ بات کے قابل بنادیتا ہے مگر ان خواص کی وجہ سے جرح کا بھی ایک قوی اثر ہوتا ہے چنانچہ زیرین پوٹے کے نیچے کے مندل شدہ مذاب کے انقباض سے پوٹے کے گلوب سے پیچھے ہٹ آنے سے شترہ خارجیہ (ectropion) یا برکڑی (eversion) پیدا ہونے کا بہت احتمال ہوتا ہے بخلاف اسکے التهاب یا تباہ کن عوامل کے اثرات کے بعد دوران اندمال میں لمغہ کے انقباض سے ہر ایک جیوٹا اندر کی جانب گلوب کی طرف مڑ جاتا ہے



اور اس طرح شترو و غلبہ (entropion) پیدا ہو جاتا ہے۔

پیوٹوں پر بہت سے متنوع شکن ہوتے ہیں اور ہر ایک کے پیوٹے میں ایک شکن ہوتا ہے جو دوسروں کی نسبت زیادہ نمایاں اور زیادہ گہرا ہوتا ہے اور یہ اس کو وجہ میں تقسیم کرتا ہے جن میں سے نیچے کا گلوب کو پوشیدہ کرتا ہے اور اوپر کا گلوب کی نرم ساختوں سے علافہ رکھتا ہے۔ لاغری میں پیوٹا اس شکن پر اندر کی طرف کو بہت گھس جاتا ہے۔ شکافات اس شکن کے رخ میں لگاتے جاہیں۔

زیر جلدی یافت بہت دھیلی ٹھہری
ہوتی ہے اسلئے پوٹے التھاب کا تھج یا زرف افع
ہونے پر بہت متورم ہو جائے میں۔ لہذا ان پر خونکیں
لگانا قرین مصلحت نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے آنکھ متورم
اور سیاہ ہو جاتی ہے (آنکھ پر کالیں: black eye)۔

اس بافت کے متعلق ایک عجیب امر یہ ہے کہ اس میں نہ ہڈی نہ تار
ہیڈروں کی کوروں پر بلکیں (tarsal glands) اور بعض ترمیم شدہ عرقی
اور دھنی غدود پائے جاتے ہیں۔ ان غدود کا افراز مچوٹوں
کی کوروں کو چھیننے سے روکتا ہے۔ ان کوروں میں خراش اور
عوارض کے پیدا ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے۔

مزید برآں چونکہ یہ آزادکنار ہے میں اس لئے دورانِ خون بھی انتہائی ہے اور خون کی رو میں رگ و بھیجی آسانی سے پیدا

ہے جس سے شہری جراب اور پیوٹے کی کور کے بعض غدود ماؤف ہو جاتے ہیں کثیر الوقوع مرض ہے۔ گو بائجنی (sty) پیوٹے کے حاشیہ پر انصالی بافت یا معد میں نتیج واقع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ پیوٹے کو الٹے سے ملٹھیں سے غرقوف البغنی غدد دکھائی دے سکتے ہیں۔ یہ زردی مائل دانوں کی لکیروں کی شکل کے ہوتے ہیں مشترک غرض البغنی (common tarsal) یا میومبی (Meibomian)

دویرہ ایک اعتباری دویرہ ہے جو ان غدوں سے کسی ایک میں پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ کسی ایک جھنجھٹے کی قنات کے انداد سے پیدا شدہ اعتباری سے بنتا ہے۔

عروقِ خون پیوٹوں میں بافراط پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک پیوٹے کو دو شریانیں

رسد پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے یعنی (ophthalmic) شریان کی ایک جھنجھٹا ہوتی ہے جو ہر ایک پیوٹے کے اندرونی حصہ میں سے گزرتی ہے، اور ایک دمی (lacrymal) کی شاخ ہوتی ہے جو ہر ایک پیوٹے کے بیرونی حصہ میں سے گزرتی ہے۔ شاملہ جات (naevi) اور دوسری عرقی بائیدیں اس محل پر بکثرت پائی جاتی ہیں۔

چار اعصاب اوپر کے پیوٹے کو رسد پہنچاتے ہیں یعنی فوق مجری (supraorbital) فوق بکری (supratrochlear) اور تحت بکری (infratrochlear) اور دمی (lacrymal)۔ نیچے کے پیوٹے کو ایک عصب (زیر مجری: infraorbital) رسد پہنچاتا ہے۔

پیوٹوں کے بعض عروقِ لمف پیش اذینی (preauricular) غدوں داخل

ہوتے ہیں۔ لہذا یہ پیوٹوں کے عوارض میں بعض اوقات کلانی یافتہ ہو جاتے ہیں۔

لمتھ (conjunctiva)۔ اس غشا کا پشیمی حصہ پتلا ہوتا ہے، اور ملحق مرحلہ سے جبکی پسیدگی بہت ڈھیلی ہوتی ہے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جھنجھٹا زیادہ موٹا ہوتا ہے، اور عمودی مرحلہ سے ڈھکا ہوتا ہے جو زیادہ مضبوطی سے منقسم اور نسبتاً زیادہ عروق دار ہوتا ہے۔ قرنیہ کی کور پر لمتھ اس مرحلہ سے مسلسل ہوتا ہے جو اس پردہ (قرنیہ) کی پوشش ہوتا ہے۔ چشمی لمتھ کو اس کے ڈھیلے پن کی وجہ سے ادھر ادھر آواز ادا طور پر حرکت دیا جاسکتی ہے، اور بعض عملیہ جات میں اس سے بہت استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً ٹیل (Teale) کے عملیہ میں جو انصاف الجھن (symblepharon) کے لئے کیا جاتا ہے گلوب سے قرنیہ کے اوپر سے لمتھ کا ایک پل بذریعہ تقطیع علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور اس خام سطح کو پوشیدہ کرنے کیلئے جو نیچے کے پیوٹے سے مس کرتی ہے قرنیہ پر سے نیچے کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ ڈھیلی بانٹ پیچ لمتھ (chemosis) کے پیدا ہونے میں مدد دیتی ہے جو انتہائی حالتوں میں اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ مریض اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتا۔

علاوہ ازیں اسکے عروق کا سہارا چونکہ کمزور ہوتا ہے اس لئے ان میں تھوڑے سے اشتعال سے بھی پھٹ جانے کا رجحان موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ زیرِ لمتحمہ نرفات بعض اوقات شدید تھے یا سال دہائی کے دورہ میں بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں کھوپڑی کے قاعدہ میں کسور واقع ہو جانے کی حالت میں بھی خون اس غشا کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس غشا کے نیچے جو نرفات واقع ہوتے ہیں ان میں اور دوسری وعائداریوں (کوفٹیکوں) میں بہ فرق ہوتا ہے کہ قبل الذکر میں قرمز رنگت برقرار رہتی ہے، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ لمتحمہ کے پتلے پن کی وجہ سے آکسیجن خون تک پہنچتی رہتی ہے، اور اسکو شریانی خاصہ بخش دیتی ہے۔

لمتحمہ کے التهاب سے معتدبہ ندبی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں جسکا کہ دوسرے اغشیہ مخاطیہ میں اور شاید مجری بول میں خاص طور پر پائے جاتے ہیں۔ تباہ کن اعمال کے بعد لمتحمہ کے انقباض سے ششروہ داخلیہ (entropion) کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر لمتحمہ کا چشمی حصہ اور اس کا منظر جسنی حصہ دونوں تباہ ہو جائیں تو اس طرح خود دو خام سطعیں باقی رہ جاتی ہیں وہ آسانی سے متحد ہو جاتی ہیں، اور پھر ناگلوب سے منضم ہو جاتا ہے، اور القناق (symblepharon) کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالت نیچے کے پپوٹے سے تعلق رکھتی ہے، اور عام طور پر چونے یا دیگر کاوی اشیا کے نیچے کے پپوٹے اور گلوب کے درمیان اتفاقیہ داخل ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہے۔

اس غشا کے التهاب کی ایک عام قسم میں جننی لمتحمہ پر چھوٹے چھوٹے اریکوں (granulations) کی ایک تعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اریکی بافت نہیں ہوتی کیونکہ اس حصہ میں صادق نتیجہ واقع نہیں ہوتا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان اریکوں میں سے کچھ خدی بافت کے کریبجوں سے بنے ہیں، اور کچھ کلائی یافتہ مخاطی جرابوں اور بیش پروردہ حلیموں پر مشتمل ہیں، اور یہ تمام ساختیں اس غشا میں طبعی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس عارضہ کا نام

رمدِ جیبی (trachoma) یا لکڑے (grancular lids) ہے۔ اس عارضہ میں

غشائے مذکور کے زیادہ عمیق حصوں میں بہت سی جدید بافت طیار ہو جاتی ہے۔ اس جدید بافت اور ان اریکوں (granulations) کے انجذاب سے انقباض پذیر ندبہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس غشا میں بہت سے شکن پڑ جاتے ہیں، اور اکثر ششروہ داخلیہ (entropion) بھی پیدا ہو جاتا، اور پلکس اندر کی طرف کو مڑ جاتی ہیں۔

آلہ دمعیہ (lacrymal apparatus)۔ دمعی غدد (lacrymal gland)


(gland) جو مجر کے بالائی اور بیرونی ربع میں واقع ہوتا ہے (شکل ۲۲) (levator palpebræ) کے وتر کے جانبی پھیلاؤ سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا فوقانی حصہ جو مذکورہ پھیلاؤ اور مجر کی چھت کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا تحتانی حصہ جو اس پھیلاؤ اور اس مقام کے درمیان واقع ہوتا ہے جہاں لمعہ منقلہ سے معکوس ہو کر بالائی عضن پر چلا جاتا ہے۔ اسکی قناتیں جو حسامت میں چھوٹی اور تعداد میں تقریباً بارہ ہوتی ہیں لمعہ انوکاس کے بیرونی حصہ میں کھلتی ہیں۔ اس غدہ کے استیصال میں کوئی فنی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ یہ اپنے قرب و جوار کی ساختوں سے ڈھیلے طور پر پسیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ غدہ ملتہب ہو جاتا ہے، اور اتنا کثانی یافتہ ہو جاتا ہے کہ یہ سلعہ کی مانند دکھائی دیتا ہے، اور گلوب کو نیچے اور اندر کی طرف ہٹا دیتا ہے، اور لمعہ کے چنبی جنبی غلن کو دبا کر آگے کی طرف کو دھکیل دیتا ہے۔ اگر خراج پیدا ہو جائے تو یہ اکثر اوپر کے پیولے کی جلد میں سے پھٹتا ہے۔ اس غدہ کے دویرے (دویرہ دمعیہ: dacryops) اس کی قناتوں کے انداد اور اتساع سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسکا طبی افراز آنکھ کی کھلی سطح کو تر رکھتا ہے، مگر اس کا استیصال خراب اثرات پیدا ہونے کے بغیر کیا جاسکتا ہے۔ آنسو منقلہ پر سے گزرتے ہیں اور اسے تر رکھتے ہیں، اور پھر یہ ہر دو نقاط دمعیہ (puncta lacrimalia) میں سے جن میں سے ایک، بالائی پیولے کے حاشیہ کے اندر کی طرف اسکے اندر کے سرے پر ہوتا ہے، اور دوسرا نیچے کے پیولے پر پہلے کے مناظر مقام پر واقع ہوتا ہے، گزرتے ہیں، اور یہاں سے قنات لچوں (canaliculi) کے ذریعہ سے دمعی تاج (lacrymal sac) میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں سے ہو کر انفی قنات (nasal duct) کے راستہ سے تحتانی انفی منقلہ (inferior nasal meatus) میں پہنچ جاتے ہیں۔ معمولی حالتوں میں اس افراز کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ناک میں سے اسکی تخلیر کی ضرورت ہو، لیکن جذبہ کے وقت افراز بکثرت ہوتا ہے، اور اسکی زائد مقدار لچوں اور عورتوں میں آنسوؤں کی شکل میں بہ جاتی ہے۔ مردوں میں چونکہ انفی قناتیں نسبتاً وسیع ہوتی ہیں اسلئے زائد مقدار ان قناتوں میں سے گزر جاتی ہے۔ لہذا ان میں جذبہ کا اظہار رونے کی بجائے زور سے ناک صاف کرنے اور ناک میں بولنے سے ہوتا ہے۔

دُمعی تاجہ (lacrymal sac) ناک کی ایک طرف اندرونی گوشہ چشم (وسطانی جفنی ملتقہ: medial palpebral commissure) کے قریب واقع ہوتا ہے، اور دُمی اور فوقانی فکی ہڈیوں میں جو میزب ہوتا ہے اس میں بڑا ہوتا ہے (شکل ۲۲) اس کی بیرونی جانب پر ذرا آگے کی طرف کو دونوں دُمی تمنا لچے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تاجہ کے سامنے اندرونی جفنی رباط (internal palpebral ligament) یا وتر لعین (tendo oculi) واقع ہوتا ہے۔ اگر دونوں پیوٹوں کو زور سے باہر کی طرف کو کھینچا جائے تو یہ رباط آسانی محسوس کیا جاسکتا ہے اور نظر بھی آسکتا ہے۔ یہ تاجہ کی طرف رہنمائی کرنے کا کام بھی دیتا ہے۔ جب پیوٹوں کو زور سے بند کر لیا جاتا ہے تو یہ تنیدہ ہو جاتا ہے۔ اسلئے اس حالت میں بھی یہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ دُمی تاجہ کو یہ اس کے بالائی ایک تہائی حصہ اور زیرین دو تہائی حصہ کے مقام اتصال پر زاویہ قائمہ پر کاٹا ہوا گذرتا ہے۔ اگر اس رباط کے عین نیچے جانو داخل کیا جائے تو یہ تاجہ کو تقریباً وسط پر سے کھول دے گا، اور اس امر کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ جب دُمی خراج پھٹنے کو ہوتا ہے تو اس کا منہ ہمیشہ اس رباط کے نیچے بنتا ہے۔

چونکہ دُمی تاجوں (lacrymal sacs) کے عوارض اکثر بہت درد خیز ہوتے ہیں اسلئے یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس تاجہ کی عصبی رسد انفی عصب (nasal nerve) کی زیرکروی (infratrochlear) شاخ سے حاصل ہوتی ہے۔

دُماع (epiphora) یا آنسوؤں کا غیر طبعی بیش بہا و زیادہ تر دو اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱) نقطہ (puncta) سے لیکر انفی یا انفی دُمی قناتوں کے فتح تک جو ناک میں واقع ہوتا ہے دُمی گذر گاہوں کے کسی مقام پر مسدود ہو جانے سے (۲) کسی ایسے سبب سے جو زیرین نقطہ کو گلوب کے ساتھ مس نہ کرنے دے جیسا کہ شترہ خارجیہ (ectropion)، شترہ داخلہ (entropion)، اور نیچے کے پیوٹوں کے ورم وغیرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ عضلہ مجبوطۃ العینیہ (orbicularis oculi) کا پیش جفنی (pretarsal) حصہ ہی ہے (یعنی وہ ریشے جو پیوٹوں میں سے انکے آزاد حواشی کے قریب سے گذرتے ہیں) جو پیوٹوں کو مقلہ کے ساتھ ملا رکھتا ہے۔ یہ ریشے دُمی تاجہ کے پیچھے موخر دُمی عرف (posterior lacrymal crest) پر ختم ہو جاتے ہیں، اور ان سے ایک عضلہ نیار ہو جاتا ہے جو کسی زمانہ میں نامشرہ کھن (tensor tarsi)

یا عضلہ ہارنر (Horner's muscle) کے نام سے موسوم تھا (وٹنل: Whitnall)۔ یہی شریان سے دُماع (epiphora) پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ عضلہ محیطیہ کے ڈھبلا ہو جانے کی وجہ سے نقطہ (punctum) گلوب سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مزید برآں آنکھ جھپکنے کے دوران میں عضلہ مذکور کے انقباضی فعل سے آنسوؤں کے گزرنے میں جو مدد ملتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دُماع (epiphora) کے علاج میں انفی قنات کو بعض اوقات سلائنیوں سے متسع کرنا ضروری ہوتا ہے



شکل ۲۲۔ دُمی آلہ کی تصویر۔

تیرہلی ڈاڑھ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انفی قنات کے رخ کو ظاہر کرتی ہے۔

اور بعض حالتوں میں قناطروں کو بھی کھولنا پڑتا ہے، اور شگاف مباری نوک والے چاقو (probe-pointed knife) (ویبر کے چاقو: Weber's knife) سے ایسے مقام پر دیا جاتا ہے کہ دُمی تاج کا اندھا مدخل گلوب سے ملتا رہے۔

91

انفی قنات (nasal duct) (انفی دُمی: naso-lacrymal) طول میں

انچ سے ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں سے جو سلائی گذری جاتی ہے اسے نیچے کی اور ذرا نیچے کی اور باہر کی طرف پہلی ڈاڑھ کی سمت میں یعنی ناک اور زخار کے درمیانی میزب کے متوازی گزرنا چاہیے

(شکل ۲۲)۔ انفی قنات ناک کی غشائے مخاطی کو تحتانی مقنول زائدہ (inferior turbinate

process) کے نیچے بہت ترچھے رخ میں مشقوب کرتی ہے، اسلئے انکی اندرونی دیوار ایک مصراع کا کام دیتی ہے۔ اگر یہ تقریح سے تباہ ہو جائے جیسا کہ بعض اوقات آتشک میں ہوتا ہے تو دومی تاجہ ناک صاف کرنے پر منتفخ ہو جاتا ہے۔ غلی انفی قنات کا قطر یہ مختلف ہوتا ہے، اور اسکا قطر ۵، ۲ ملی میٹر سے لیکر ۵، ۷ ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ انکی مونی غشائے مخاطی کی جو اسکا استرہ موتی ہے، زیر مخاطی تہ میں ایک کثیر العروق و ریدی ضغیرہ پایا جاتا ہے جو اس قنات کے ملتهب ہو جانے پر باسانی متورم ہو جاتا ہے اور آنسوؤں کو گزرنے نہیں دیتا۔ طبعی قنات میں ۵، ۳ ملی میٹر قطر کی سلانی سما سکتی ہے۔ یہ ضرور مادر کھنچا جائے کہ طبعی طور پر اس قنات کا درونہ بند ہوتا ہے، اور انکی استری غشا میں بہت مستعرض شغلن ہوتے ہیں جن میں سلانی کا سر بعض اوقات اک جاتا ہے۔ التہابی عوارض انفی کبفہ میں سے دومی تاجہ ناک انفی قنات کے راستہ سے باسانی صعود کر جاتے ہیں۔

پانچم

کان

93

صیوان الاذن (pinna) بعض اوقات خلقی طور پر غائب ہوتا ہے، اور بعض وقتاً رخسار یا گردن کی کسی جانب پر زائد اذین (auricles) موجود ہوتے ہیں۔ موخر الذکر مقام پر نام نہاد زائد یا مستزاد اذین (supernumerary auricle) یعنی غضروف کے ایک بے ڈھنگے درق پر مشتمل ہوتا ہے جو زیرین خیشومی درزوں (branchial cleft) میں سے ایک کے حواشی سے پیدا ہوتا ہے (دیکھو صفحہ 230) گھنڈی کی طرح کے زائد اذین جو رخسار پر صیوان الاذن یا منفذ کے سین سامنے پائے جاتے ہیں ان چھ درنوں میں سے جن سے صیوان الاذن خود نمودار ہوتا ہے ایک یا زائد درنہ کے بیقاعدہ نمو یا عدم اتحاد سے پیدا ہوتے ہیں صیوان الاذن میں بعض اوقات ایک خلقی ناسور یا پایا جاتا ہے جو پہلی خیشومی درز (branchial clefts) کے غیر مکمل طور پر بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ قلمی کان میں اس درز کے مکمل پر یوسٹیکیئن ٹی (Eustachian tube)، طبل (tympanum)، اور منفذ سمعی خارجی (external auditory meatus) پائے جاتے ہیں۔ اور صیوان الاذن اس پوشش سے پیدا ہوتا ہے جو اس درز کے ارد گرد پائی جاتی ہے۔ بعض زیادہ چھوٹے اور زیادہ وسطی ناسور خیشومی درز کے غیر مکمل طور پر بند ہونے سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان درنوں میں سے جن سے صیوان الاذن ابتدائی طور پر بنتا ہے بعض میں مکمل اتحاد قائم نہ ہونے سے

پیدا ہوتے ہیں۔ حادثات سے صیوان الاذن (pinna) کے علیحدہ ہو جانے سے تیز فنی سماعت میں عام طور پر بہت کم فرق آتا ہے۔

اذین (auricle) پر کی جلد باریک اور بہت قریبی طور پر منقسم ہوتی ہے۔ زیر جلدی بافت کی مقدار قلیل ہوتی ہے اور اس میں شحم بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی سطح کے الہابی عوارض مثلاً سرخبادہ (erysipelas) میں صیوان الاذن (pinna) انتہائی درجہ تک متورم ہو جاتا ہے اور حصص کی تنیدگی کی وجہ سے بہت سخت درد پیدا ہوتا ہے۔ صیوان الاذن اور غضروفی منفذ کھوپڑی سے بہت مضبوطی سے پیچیدہ ہوتے ہیں لہذا دونوں کان پکڑ کر جسم کو بشرملیکہ اسکا وزن بہت زیادہ نہ ہوزمین سے اوپر اٹھایا جاسکتا ہے مگر یہ تجربہ ظالمانہ اور خطرناک ہے۔

منفذ سمعی خارجی (external auditory meatus)۔ اس کی

قال تقریباً اانچ لمبی ہوتی ہے اور اسکا رخ آگے کی اور اندر کی طرف کو ہوتا ہے لہذا اذن وسطی تک پہنچنے اور اسکو معر کر نیچے لئے سرجن صماغ کی موخر دیوار کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ خارجی منفذ، المنف (promontory)، طرز و (cochlea) اور داخلی منفذ ایک ہی خط میں واقع ہوتے ہیں۔ قال میں وسط پر ایک انقباضی خم ہوتا ہے جسکا انحداب اوپر کی طرف کو ہوتا ہے۔ قال کو منظر اول یا دوسرے اوزار کے داخل کرنے کی غرض سے سیدھا کرنے کے لئے صیوان الاذن کو اوپر کی طرف کو اور کسی قدر باہر اور پیچھے کی طرف کو کھینچنا چاہئے۔ اس قال کا درونہ اسکے ممر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتا ہے۔ وسط پر تین تگ بین ہوتی ہے اور عظمی حصہ غضروفی حصہ کی نسبت زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ دہنہ خارجی ایلیجی ہوتا ہے اور اسکا طویل ترین قطر اوپر سے نیچے کی سمت میں ہوتا ہے اسلئے منظر اول کی شکل گول ہونگی بجائے ایلیجی ہونا چاہئے۔ بخلاف اس کے نامی کا اندرونی سرا مستعرض رخ میں ذرا سا زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔

اسکی دیواروں کا کچھ حصہ عظمی ہوتا ہے اور کچھ حصہ غضروفی۔ بالغ میں نصف سے

زیادہ قال ہڈی سے گھری ہوتی ہے مگر ایک سال کے شیرخوار بچہ میں اسکا صرف ایک ثلث ہی عظمی ہوتا ہے اور بقیہ حصہ غضروفی ہوتا ہے اور پانچ چھ سال کے بچہ میں عظمی اور غضروفی حصوں کی لمبائی تقریباً ایک ہی ہوتی ہے (سمنگٹن : Symington)۔

خارجی کان کی عظمیٰ دیواریں آگے کی نسبت پیچھے کی طرف بڑی ہوتی ہیں، اور جہاں پر منفذ کے عظمیٰ حلقہ کا مقدم حصہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے وہاں اسکے موخر حصہ پر ایک ڈھلان پایا جاتا ہے جو بتدریج زائدہ حلیہ کے قاعدہ کی بیرونی جانب تک پہنچ جاتا ہے۔ اکثر اوقات موخر عظمیٰ دیوار اور کھوپری کی بیرونی جانب کی درمیانی حد ایک چھوٹے سے شوکہ یا جید سے جو ہینل (Henle) کے فوق منفذی شوکہ (suprameatal spine) کے نام سے موسوم ہے ظاہر ہوتی ہے مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ مرض حلیہ (mastoid disease) کے عمل میں گوج (gouge) کا استعمال فوق منفذی مثلث سے شروع کیا جاتا ہے (دیکھو صفحہ 106) جسکی ایک حد عظمیٰ منفذ کے موخر حاشیہ سے بھی بنتی ہے، اسلئے شوکہ ہینل (spine of Henle) سرجن کے لئے ایک مفید رہنما کا کام دیتا ہے۔

95

غشائے طبلی کے ترچھا ہونے کی وجہ سے منفذ کا فرش چھت کی نسبت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ خارجی عظمیٰ کان میں نہ تو بال ہوتے ہیں اور نہ خدد۔

نالی کے غضروفی قطعہ (cartilaginous segment) میں بہت سے

دہنی غد پائے جاتے ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹے اور بہت دردنیز خراج یا دمل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں ایسے صلاخی غد کی ایک بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے، جسکے افراز کی افراط سے بعض اوقات استقدر میل پیدا ہو جاتا ہے کہ قنال کو بند کر دیتا ہے اور کان بہرا ہو جاتا ہے۔ غضروفی حصہ کے فرش پر سینٹورینی (Santorini) کے شقاقات پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کے وقفے ہوتے ہیں جو غضروف میں پائے جاتے ہیں اور لیسفی بافت سے پُر ہوتے ہیں صیوان الاذن انہی کی وجہ سے زیادہ آزادی سے حرکت کرتا ہے۔ جب خراج کفنیہ (paratoid abscess) کی کپچہ منفذ خارجی میں سے نکلتی ہے تو یہ انہی شقاقات کے راستہ سے آتی ہے۔

التهاب الاذن خارجی (otitis externa) میں بعض اوقات منفذ سے قیمی مواد بکثرت خارج ہوتا ہے اور کبھی کبھی معلق مٹیجے یا سعدانے (polypi) بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھوپری کی دوسری ہڈیوں کے ساتھ ہی بیرونی کان کی عظمیٰ دیواروں میں بھی حاجی سلعات عظمیہ (ivory osteomata) کے پیدا ہونے کا ایک خاص امکان پایا جاتا ہے۔

بیرونی کان میں اکثر اجسام منحصر یہہہ انک جاتے ہیں اور چونکہ انکا مکان اکثر شکل ہوتا ہے اسلئے انکو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لئے غلط کوشش کرنے سے معتد بہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس امر کی احتیاط کرنا چاہیئے کہ اس قسم کے جسم کو آگے کی طرف کو نہ دھکیل دیا جائے اگر یہ کسی ایسے مادہ سے مرکب ہے جو پانی جذب کر سکتا ہے تو پچکاری سے نکالنے کی بقیاعدہ کوششوں سے اسے چھو لئے نہ دیا جائے اگر یہ منظر کی مدد سے اسکے پیچھے آہستہ سے ایک خمیدہ سلائی ڈاکٹر کا لانا نہیں جاسکتا تو بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ کان کے پیچھے ایک ہلالی شکل کا شیخاف دیکر اس کو معمر کر لیا جائے۔ اس سے غضروف عظمیٰ منفذ کی موخر دیوار سے عارضی طور پر علیحدہ ہو جاتا ہے۔

96

منفذی دیواروں کے تعلقات جراحی نقطہ نگاہ سے اہم ہیں۔ اسکی بالائی دیوار صحیحی سے ہڈی کی صرف ایک کثیف تہ کے ذریعہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اسلئے اس حصہ کے خراج یا عظمیٰ مرض سے التهاب سمیہ (meningitis) پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس قبال کی مقدم دیوار صدغی فکی مفصل (temporo-maxillary joint) اور غدہ کنفیہ کے کچھ حصہ سے علاقہ رکھتی ہے۔ اس امر سے منفذ کے ملہب ہونے کی حالت میں جبرٹا ہلانے سے جو درد محسوس ہوتا ہے اسکی بھی ایک طرح سے توجیہ ہوتی ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ فک زیرین کی حرکت کے ساتھ ہی غضروفی منفذ میں بھی حرکت ہوتی ہے اور نیز دیوار ہائے منفذ اور مفصل مذکور دونوں کی رسد ایک ہی عصب سے آتی ہے (اذینی صدغی: auriculo-temporal)۔ جبرٹے کے قبدال سے اسکا جو تعلق ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ منفذ کی اس دیوار میں ٹھڈی کے بل گرنیے کسروافع ہو سکتا ہے۔ یکھنی غدہ کے اندر کا خراج سینٹورینی (Santorini) کے شقاقوں کے استہ سے جو اس گذرگاہ کی مقدم دیواریں واقع ہوتے ہیں منفذ تک پھیل سکتا ہے۔ موخر دیوار منفذ کو علمی خلیات (mastoid cells) سے علیحدہ کرتی ہے۔ موخر دیوار کے عین پیچھے (بیمنی خارجی اذنی منفذ کے وسطی نقطہ سے تقریباً ۳/۴ انچ کے فاصلہ پر) جانی جوف (lateral sinus) ہوتا ہے (شکل ۲۵)۔ عظمیٰ منفذ کی تحتانی دیوار بہت کثیف اور مضبوط ہوتی ہے اور غمدی (vaginal) اور ابری (styloid) زوائد کی متناظر ہوتی ہے۔

رسد خول۔ صیوان الاذن اور منفذ خارجی کو خون کی رسد صدغی اور موخر

اذینی شریانوں سے بخوبی پہنچتی ہے اور منفذ کو خارجی فکی (external maxillary) کی

ایک شاخ بھی جاتی ہے اس رسد کے باوجود صیوان الاذن میں پالا مار جانے سے گنگرین واقع ہو جاتی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ تمام عروق سطحی ہوتے ہیں اور سطح کے نیچے اسکے نزدیک ہی واقع ہوتے ہیں اور نیز یہ حصہ سردی لگنے کے لئے کھلا رہتا ہے اور اسپر جبری کی کوئی پوشش نہیں ہوتی یہی حالات بیرونی سردی سے ناک میں گنگرین واقع ہونے کے محض ہیں۔ غرضی سلعات (سلعاست دمویہ) صیوان الاذن میں اکثر دیکھنے میں آتے ہیں اور گھونٹے بازوں فٹ بال کھیلنے والوں اور دیوانوں میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ چوٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور خون کی عابدری پر مشتمل ہوتے ہیں جو گردکری اور غضروف کے درمیان واقع ہوتی ہے۔

97

عصبی رسد صیوان الاذن کو ازینی صدغی (auriculo-temporal) اور

عظیم ازینی (great auricular) اور صغیر قدالی (small occipital) اعصاب سے رسد پہنچتی ہے (دیکھو شکل ۲ صفحہ ۱۱)۔ منفذ کی رسد زیادہ تر ازینی صدغی (auriculo-temporal) کے ذریعہ سے آتی ہے اور عصب تائیہ (vagus) کی ایک ازینی شاخ اسکی مدد کو آتی ہے [آرنولڈ (Arnold) کا عصب] جو اس قنال کے پیرین اور پچھلے حصہ کو جاتی ہے اور یہ شاخ قنال کی ابتدا سے دوڑ نہیں ہوتی۔ وجہی (facial) سے بھی ایک شاخ نکلتی ہے جو منفذ میں جا کر ختم ہوتی ہے (رمز نے ہنٹ: Ramsay Hunt) عصب تائیہ کی ازینی شاخ کے متعلق کان کے عصبی تعلقات کے سلسلہ میں بہت سائنس دان پوچھا جاتا ہے۔ پرنکلف دعوتوں میں یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب عرق گلاب سامنے رکھا جاتا ہے تو زیادہ تجربہ کار شرکائے دعوت کان کی پچھلی طرف کیے پچھلے حصہ کو ترست مال سے مس کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمل بہت تازگی بخش ہے اور اسے متعلق یہ خیال ہے کہ اس سے آرنولڈ (Arnold) کے عصب میں غیر اختیاری طور پر ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور یہ وہ عصب ہے جسکا تہ معدہ کو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عصب کو مزاحاً "عصب الہیج" (alderman's nerve) کہا جاتا ہے۔

اذنی کھانسی۔ اذنی چھینک۔ اذنی جمائی: تکلیف دہ

خشک کھانسی میں منفذ میں کسی شہایت کا پایا جانا قلیل الوقوع نہیں بعض اوقات منظر کے صرف داخل کرنے ہی سے مریض کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے ایک ایسے واقعہ کی اطلاع دی جا چکی ہے


جس میں اٹھارہ ماہ تک تکلیف دہ کھانسی موجود رہی اور کان سے میل کی ایک ڈاٹ نکالنے سے فوراً بند ہوگئی۔ ایسی حالتوں میں خراش تنفس اور کھانسی کے مراکز تک جو چوتھے طبین کے فرش پر ہوتے ہیں عصب تائید (vagus) کی اذینی شاخ کے ذریعہ سے متصل ہوتی ہے۔ گاسکل (Gaskell) نے یہ ثابت کیا ہے کہ عصب تائید میں پانچویں عصب کے غیر متلف حشائی ریشے بھی موجود ہوتے ہیں لہذا عصب تائید کے نوانات میں پانچویں عصب کی شاخوں مثلاً اذینی صدغی سے اختلالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ منفذ سمعی خارجی کے اعصاب کا جو تعلق عصب تائید کے نوانات سے ہوتا ہے اس سے ایسی جھینکوں اور قیوں کی توجہ بھی ہو جاتی ہے جو خارجی منفذ میں جسم غریب کے موجود ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی عصبی تعلق سے ان جراثیموں کا سبب بھی معلوم ہو جاتا ہے جو کان کی نکیچائیوں میں بار بار آیا کرتی ہیں۔ جو خراش تحتانی سنی (inferior dental) اور لسانی (lingual) اعصاب کے ذریعہ سے پہنچتی ہے وہ اذینی صدغی کے ساتھ ساتھ محمول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کان کے درد میں زبان اور نیچے کے دانتوں کا امتحان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرطان زبان کی حالتوں میں درد اذنی، صدغی اور حلیمی خطوں میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ہیڈ (Head) نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کان، نوزہ زبان یا نیچے کے جبرے کے مرض میں اس جبرے کے ساتھ ساتھ یا اسکے نیچے کی جلد پر الیمیت کا ایک رقبہ پایا جاتا ہے۔

آنکھ کے شدید عوارض کو رفع کرنے کے خیال سے کان میں حلقے ڈالنے کا ایک عام رواج تھا۔ بنا گوش کو عظیم اذینی عصب جو دوسرے اور تیسرے عقی اعصاب سے نکلتا ہے رسد پہنچاتا ہے۔ اور آنکھ کو پانچویں عصب کی عینی (ophthalmic) قسمت سے رسد پہنچتی ہے۔ جن مراکز سے یہ اعصاب ملتے ہیں انہیں ایک معین تعلق پایا جاتا ہے کیونکہ پانچویں عصب کا ریزی جی نوات اس رمادی مادہ کا جس میں سے عقی اعصاب کی موخر جڑیں نکلتی ہیں ایک بلا واسطہ تسلسل ہے جو اوپر کی طرف کو چلا گیا ہے۔

ہلٹن (Hilton) نے کان کے مبہم سے درد کے ایک واقعہ کی اطلاع دی ہے اس میں یہ معلوم ہوا کہ یہ گردن کے ایک کلانی یا فٹہ غدہ سے پیدا ہوا تھا جو عظیم اذینی عصب کے منہ پر دباؤ ڈالتا تھا۔

غشاء طبل (membrana tympani)۔ یہ غشاء بہت ترچھی واقع ہوتی ہے اور افقی سمتی کے ساتھ یہ ۴۵ درجہ کا زاویہ بناتی ہے۔ بوقت پیدائش یہ تقریباً افقی معلوم ہوتی ہے

اگرچہ درحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ منفذ کی عظمی دیوار اپنے اندرونی سرے پر نیچے کی طرف کو ڈھلوان ہوتی ہے اسلئے یہ اس غشائی زریں کو رکے ساتھ ایک قسم کا جوف بنا دیتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے اجسام غریبہ آسانی پڑے رہتے ہیں (شکل ۲۳)۔ ہڈی کا وہ حلقہ جسکے ساتھ یہ غشا چپکی ہوتی ہے اپنے بالائی اور مقدم حصہ پر نامکمل ہوتا ہے۔ اس طرح جو رخندہ رہ جاتا ہے اس کو طبل کی کٹاؤ



شکل ۲۳۔ یہ تراش خارجی منفذ اذن وسطیٰ اور یوسٹیکین ٹی میں سے گزرتی ہے۔ (ٹلو)

۱۔ خارجی سمی منفذ۔ ج۔ کہنہ طبل کا علیہ۔ ج۔ یوسٹیکین ٹی۔ د۔ داخلی سمی منفذ۔

۲۔ حلزوند۔ س۔ استخوانچے۔ ص۔ غشائے طبل۔ ط۔ زائندہ ابریہ۔

(tympanic notch) یا رینی (Rivini) کا کٹاؤ کہتے ہیں۔ اس میں ڈھیلی ڈھالی اتصالی بافت موجود ہوتی ہے جو منفذ کے استر کے ایک تسلسل سے پوشیدہ ہوتی ہے اور پیپ اذن وسطیٰ میں سے اس میں سے گزر کر اس غشا کو منقبض کو بغیر معی قال میں آسکتی ہے۔ جب یہ غشا کسی شدید ارتجاج کے ہو ایسا منتقل ہونے سے بچت جاتی ہے تو دریدگی اس کٹاؤ کے بالمقابل واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں پر اسکی چسپیدگیاں دوسرے مقامات کی نسبت کم مضبوط ہوتی ہیں۔ اس غشا میں بہت کم لمبک موجود ہوتی ہے جیسا کہ اس حصہ کے زخمی ہونے کے بعد لب ہائے زخم کی ذراسی کشادگی سے ظاہر ہوتا ہے۔

دوسرے وجود کے علاوہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ سر جن اس غشائیں جو انتھاب بناتا ہے وہ بہت جلد مندمل ہو جاتا ہے۔ یہ غشا پھینکنے، کھانسی اور قے وغیرہ کے دوروں میں شق ہو چکی ہے۔ یہی ضرر کان پر گھونٹ لگنے اور سادہ ارتحاجات (مثلاً وہ جو کسی بلند آواز سے پیدا ہوتے ہیں) سے بھی پیدا ہو چکا ہے۔

موتی کی طرح کی رمادی غشائے لمبی کو منطاریں سے معکوس روشنی سے دیکھنے پر ایک مثلث نما معکوسہ نور (light reflex) نظر آتا ہے۔ اس کا قاعدہ نیچے کی طرف کو اور کی طرف آگے کی طرف کو ہوتا ہے اور اس کا راس لمبل کے مرکز کے قریب حیدہ (umbo) پر ہوتا ہے۔ اس زاویہ کی چوڑائی مختلف اشخاص میں مختلف ہوتی ہے لیکن جب لمبل اندر کی طرف کو کھپا ہوتا ہے تو یہ زاویہ تنگ ہو جاتا ہے اور جب لمبل باہر کی طرف کو ابھرا ہوتا ہے تو یہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جب التهاب کی وجہ سے لمبل کی چمک غائب ہو جاتی ہے تو یہ مثلث نما معکوسہ نور ماند پڑ جاتا ہے اور اس کا خاکہ دھندلا ہو جاتا ہے۔

حیدہ (umbo) یا نیشب کا عمیق ترین حصہ تمام غشا کے مرکز کے عین نیچے واقع ہوتا ہے اور یہ مطرقہ (malleus) کے دستہ کے سرے کی چسپیدگی کا متناظر ہوتا ہے۔ دستہ کا بقیہ حصہ دوران حیات میں غشائیں سے دیکھا جاسکتا ہے۔ مطرقہ (malleus) کا سر غشائے کوئی تعلق نہیں کرتا کیونکہ یہ غشا کے لیول سے اوپر لمبل کے علیتیہ (attic) میں واقع ہوتا ہے (شکل ۲۳)۔ غشا کا جو قطعہ حیدہ (umbo) سے اوپر ہوتا ہے اس کی عرقی اور عصبی رسد بہت کثیر ہوتی ہے۔ یہ مطرقہ (malleus) کے دستہ اور استخوانچوں کی زنجیر کا متناظر ہوتا ہے اور دونوں نڈوں (fenestra) اور طنف (promontory) کے بالمقابل ہوتا ہے۔ جمل لمبل (chorda tympani) عصب مجا اس فوق نیدی حصہ کو عبور کرتا ہوا گذرتا ہے۔ بخلاف اسکے جو قطعہ حیدہ (umbo) سے نیچے ہوتا ہے وہ کسی اہم حصہ کا متناظر نہیں ہوتا اور کم عروقدار اور کم حساس ہوتا ہے۔ لہذا لمبل فشاںی میں سے لمبل کا بغزل (paracentesis of the tympanum) ہمیشہ فوق حیدہ قطعہ میں سے کرنا چاہئے۔ اگر یہ عمل حیدہ سے اوپر کیا جائے تو ممکن ہے کہ چاقو نندان (incus) کو جا لگے اور اس ہڈی کو اس کی چسپیدگیوں سے علیحدہ کر دے یا جمل لمبل (chorda tympani) کاٹ لے جس سے ریت کا شملی افزا شروع ہو جاتا ہے۔ مطرقہ (malleus) اور رکیب (stapes) اتنی مطلوبی سے چسپیدہ ہوتی ہیں کہ باسانی علیحدہ نہیں کی جاسکتیں۔

اس غشا کو خون کی رسد ابری ملی (stylo-mastoid) شریان اور اندرونی فکی (internal maxillary) کی لمبل (tympanic) شاخ سے آتی ہے اور اس کی عصبی رسد


ازین صدغی (auriculo-temporal) و جہی (facial) اور تائیسہ (vagus) سے حاصل ہوتی ہے۔

طبل کھفہ (tympanic cavity) کی شکل انسان کی ہتھیلی کے گڑھے کی سی ہوتی ہے۔ اسکی بیرونی حد زیادہ تر غشاء طبل سے بنتی ہے۔ مقدم جانب پر یہ یوستیکین (Eustachian) نلی کے ذریعہ سے انفی بلووم (nasopharynx) سے ربط و راہ رکھتی ہے اور موخر جانب پر مدخل (aditus) اسکے علیہ (attic) سے یعنی اس حصہ سے لیکر جو غشاء طبل کے لیول سے اوپر واقع ہوتا ہے پیچھے کی اور ذرا اوپر کی طرف کو عملی مغارہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کھفہ کا عرض اندرونی دیوار سے لیکر بیرونی دیوار تک ۲ تا ۳ ملی میٹر (۱/۴ تا ۱/۲ انچ) ہوتا ہے۔ اسکا تنگ ترین حصہ وہ ہے جو طبل کے حیدہ (umbo) اور طنف (promontory) کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر غشاء طبل کے مرکز میں سے ایک باریک ڈنڈا اندر داخل کر دیا جائے تو وہ اس کھفہ کی اندرونی دیوار کے طنف (promontory) سے ٹکرائے گا۔ انتصابی اور مقدم موخر قطر فرداً تقریباً ۱۲ - ۱۴ ملی میٹر (۱/۴ انچ) ہوتے ہیں۔

اندرونی دیوار پر طنف (promontory) سے اوپر بیضوی نافذہ (fenestra ovalis) (دہلیزی نافذہ: fenestra vestibuli) ہوتا ہے جو ایک غشاء سے بند ہوتا ہے جسکی وسطانی جانب پر اذن اندرونی کی دہلیزی نردبان (scala vestibuli) ہوتی ہے اور اسکے نیچے اور پیچھے کی طرف مدور نافذہ (fenestra rotunda) (حلزونی نافذہ: fenestra cochleæ) (شکل ۲۲) ہوتا ہے جو اس غشاء سے بند ہوتا ہے جو نردبان طبل (scala tympani) کو بند کرتی ہے۔ رکیب (stapes) کا پائمان بیضوی نافذہ (fenestra ovalis) کے غشاء سے اس مضبوطی سے چسپیدہ ہوتا ہے کہ اصولی عملیہ (radical mastoid operation) کرتے وقت جب استخوانچے دور کئے جاتے ہیں تو یہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ طبل (tympanum) کی اندرونی دیوار کے بالائی اور موخر حاشیہ پر جو قنالی (facial canal) یا قناتی مصیف (aqueduct of Fallopius) گذرتا ہے مصیف کی دیوار اتنی پتلی ہوتی ہے کہ البتہانی ضرر اذن وسطی سے و جہی عصب تک باسانی پہنچ سکتا ہے۔ بہت پتلی بالائی دیوار یا چیت (غشاء طبل: tegmen tympani) پر صدغی تندی (temporo-sphenoidal) لختہ متکمن ہوتا ہے۔ اسی دیوار میں ججری فلسمانی درز (petro-squamous suture) واقع ہوتی ہے جو

پہلے سال کے اختتام پر مل جاتی ہے۔ اور اس میں عام طور پر جرجی فلسفانی ورید ہوتی ہے جو ابستہانی و داجی (primitive jugular) کے آثار میں سے ہوتی ہے بشیر خواہ بچہ میں ایک درزی غشا ہڈیوں میں سے گزرتی ہے اور یہ بعض اوقات سرایت کے اذن وسطی سے اسمیہ تک پھیلنے کے لئے سیدھے راستہ کا کام دیتی ہے۔

اس کا فرش بہت تنگ ہوتا ہے۔ اسکا زیر ترین حصہ غشائے طبلی (membrana tympani) اور کیوٹیکین (Eustachian) نلی کے سوراخ ہر دو کے لیول سے نیچے ہوتا ہے



شکل ۲۲۔ طبلی اور مغارہ کی اندرونی دیوار۔

خارجی نیم دائری قنال کا محل اور وہی عصب (ہفتم) کا محور دکھایا گیا ہے۔

اور اسلئے اس مقام پر پیپ باسانی جمع ہو سکتی ہے (شکل ۲۲)۔ یہ فرش ہڈی کا ایک باریک صفحہ ہوتا ہے جسکے نیچے و داجی (jugular) ورید کا بصلہ واقع ہوتا ہے جسکے سامنے داخلی سباتی (internal carotid) شریان پائی جاتی ہے۔ گاہے گاہے مرض یا کسی خلقی نقص کی وجہ سے اسکا کچھ حصہ غائب بھی ہوتا ہے ایسی حالتوں میں اذن وسطی کے مرض میں کان میں خطرناک نرف واقع ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں جسکا علم سی سی چوائس کو ہے طبلی تنگائی (myringotomy) کے بعد شدید وریدی نرف واقع ہوا تھا۔

موضر دیوار کے بالائی حصہ میں طبلی جوف کا فتح یا مدخل (aditus) ہوتا ہے (حلیہ کا مغارہ)۔ ہوائی جوف علیہ (attic) میں کھلتا ہے۔ یہ طبلی کہف کا وہ حصہ ہے جو غشائے طبلی کے

لیول سے اوپر واقع ہوتا ہے (شکل ۲۵)۔

طبلی جوف (tympanic sinus) (حلیہ کا مغارہ: antrum of the

108

mastoid) (شکل ۲۳ و ۲۴)۔ خارجی سمعی منفذ کے اوپر اور پیچھے حلی زائندہ کے قاعدہ میں واقع ہوتا ہے جو مدخل کے انکی شکل قرینق کی سی ہوتی ہے اس فضا اور ان حلی غلیات کا جو اس میں کھلتے ہیں اور اسکے ارد گرد واقع ہوتے ہیں مانوف ہو جانا اذن وسطی کے مرض کی ایک نہایت خطرناک پیچیدگی ہے یہ جوف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سیم کا ایک چھوٹا سا بیج آسکتا ہے۔ یہ پیدائش کے وقت پر موجود ہوتا ہے اور طبلی کہنہ کے ساتھ نمو پاتا ہے۔

اوپر کی طرف اسکی چھت جو غطاء طبلی (tegmen tympani) سے جو ہڈی کا ایک ۲ ملی میٹر موٹا صحفہ ہوتا ہے بنتی ہے، اسکو تیسری صدغی تلفیف سے علحدہ کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی وریدی چھت کو منشقب کہہ کر جری فلسفانی ورید میں جا ملتی ہے! ورید یہی نام کی درز کے بقیہ میں واقع ہوتی ہے۔ شیر خوار بچہ میں یہ ربط اور بھی آزادانہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ درز پہلے سال کے اعتقام تک بند نہیں ہوتی۔ چھت کا لیول فوق منفذی عرف (suprameatal crest)۔ یعنی وجہ (zygoma) کی جڑ کی موخر اطالت سے عین اوپر ہوتا ہے، لہذا اگر سرجن اس عرف سے نیچے رہے تو کھوپری کے اتفاقیہ کھلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

مغارہ (antrum) کے نیچے حلی زائندہ ہوتا ہے جو اکثر خلیہ دار اور بعض اوقات ٹھوس ہوتا ہے۔ مغاری فرش کا لیول عظمی خارجی منفذ کی موخر دیوار کے نقطہ وسطی کے پیچھے ہوتا ہے۔

سامنے کی طرف ہڈی کی ایک دیوار ہوتی ہے جو مغارہ (antrum) کو خارجی سمعی منفذ کے اندرونی حصہ سے علحدہ کرتی ہے اس دیوار کے سب سے اونچے حصہ میں مدخل (aditus) ہوتا ہے جو ایک بیضوی فتح ہے اور یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں معمولی تکیستی سلائی داخل ہو سکتی ہو اور یہ مغارہ (antrum) سے آگے کی اور کیتھری پیچھے کی اور ذرا اوپر کی طرف کو ہو کر علیہ (attic) میں پہنچ جاتی ہے۔

اندرونی دیوار پر ایک قنال ہوتی ہے جو چھی عصب (facial nerve) کے لئے ہوتی ہے۔ یہ قنال اپنے رقبہ (genu) سے جو مدخل (aditus) کی اندرونی دیوار میں ہوتا ہے

نیچے کی طرف کو آتی ہے۔ علاوہ ازیں اس جگہ پر وجہی قنال کے عین پیچھے اور اس سے ذرا اوپر خارجی نیم دائری قنال (external semicircular canal) ہڈی میں مدفون ہوتی ہے (شکل ۲۲)۔ اٹلی جوف (tympanic sinus) کے منہ پر اور بل (tympanum) کے علیہ (attic) میں سندان (incus) اور مطرقہ (malleus) کا سرا اور ان کے ربا لمحات واقع ہوتے ہیں اور یہ وہ ساختیں ہیں جو بعض اوقات مرض زدہ ہوتی ہیں اور انکو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس حالت مرض میں اصولی عملیہ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اس اندرونی دیوار کی ہڈی بعض اوقات




شکل ۲۵ اذن وسطی کے محل اور تعلقات اور مختلف حصوں کو ظاہر کرتی ہے۔
(نیز دیکھو شکل ۲۴ صفحہ ۲۵)

بوسیدہ ہوتی ہے اور وجہی عصب (facial nerve) یا نیم دائری قنال (semicircular canal) کو بے احتیاطی سے باسانی نقصان پہنچ سکتا ہے اور وجہی شل اور دوران سر کے پیدا ہونیکا اندیشہ ہوتا ہے۔ منفذ کے فوقانی اور موخر کنارے عصب وجہی (facial nerve) کے محل کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ عصب (شکل ۲۵) جوف یا منارہ (antrum) کی اندرونی دیوار پر فوق منفذی مثلث (suprameatal triangle) سے ۴ تا ۲۲ ملی میٹر گہرا واقع ہوتا ہے (جوائس)۔ عصب اپنے رکبہ (genu) سے اپنی قنال میں چلا جاتا ہے اور پھر مدخل (aditus) کی اندرونی دیوار میں سے نیچے کی طرف کو جا کر اور ہڈی کے اس پل میں سے جو منارہ (antrum) کو اذن وسطی سے علیحدہ کرتا ہے گزر کر انجام کار ابری حلی (stylo-mastoid) سوراخ میں سے باہر آتا ہے

اسکا نزول بالکل اعتسابی نہیں ہوتا بلکہ یہ ذرا باہر کی طرف کو مائل ہوتا ہے۔ لہذا عملیہ میں اس پل کو چھیننے سے کاٹتے وقت نیچے کی طرف کو ڈھلوان رکھنا چاہئے۔

چھیننے کی طرف یہ جوف (sinus) جانبی جوف اور دیمغ (cerebellum) سے ہڈی کے ایک صفحہ کے ذریعہ سے علاحدہ ہوتا ہے جسکی دباؤ ۳ ملی میٹر سے ۶ ملی میٹر تک ہوتی ہے اس سے یہ باسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ اذن وسطیٰ کے مرض میں صدغی وندی تختہ (temporosphenoidal lobe) جانبی جوف (lateral sinus) اور دیمغ میں ثانوی سرائت عام طور پر کیوں واقع ہوتی ہے

105



شکل ۲۶۔ صدغی ہڈی بوقت پیدائش۔

طبلی جوف یا مغارہ اور علیہ کا محل ظاہر کیا گیا ہے۔ فلسمانی حلی درز حلی ہے اور حلی زائدہ کا نمونہ نہیں ہوا۔

جوف کی بیرونی دیوار بوقت پیدائش فلسمان کے پس منغذی زائدہ سے جو ہڈی کا ۲ ملی میٹر موٹا صفحہ ہوتا ہے بنی ہوتی ہے (شکل ۲۶)۔ بچہ میں مغارہ (antrum) مقابلہ سطحی ہوتا ہے۔ اور پیپ باسانی محل ملکتی ہے اور باسانی نکالی بھی جاسکتی ہے۔ فلسمانی (squamosal) کے پس منغذی حصہ اور جھری حلی (petro-mastoid) کے درمیان کی درز زندگی کے دوسرے سال میں غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ امکانی راستہ جس سے پیپ سطح تک پہنچ سکتی ہے بند ہو جاتا ہے (شکل ۲۶)۔ جوف کی بیرونی دیوار کی دباؤ ۳ سن بلوغ تک بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔

مغارہ (antrum) کی گہرائی بالغ کھوپری میں تقریباً ۱۶ ملی میٹر ہوتی ہے (۱۶ پانچ)۔ مگر

مختلف افراد میں یہ ۱۲ تا ۲۲ ملی میٹر ہوتی ہے۔ جب ہڈی کو لٹیا ٹومائی بالید (cholestea) (tomatous growth) سے متاثر ہو جاتی ہے تو یہ کہنف بعض اوقات گوج (gouge) کی پہلی ہی کاٹ سے معرا ہو جاتا ہے۔ اندرونی کان (اندرونی دیوار) کو پرپی کی جانب سے حلی مغارہ (mastoid antrum) کی نسبت ذرا گہرا واقع ہوتا ہے اور مغارہ (antrum) جانبی جوف کی نسبت ذرا گہرا ہوتا ہے۔ طبعی طور پر بالغ میں خون کا جوف خارجی بھی منفذ کے نقطہ وسطی سے ۳ انچ نیچے ہوتا ہے (موضر حاشیہ سے ۱۶ انچ) مگر بعض اوقات یہ اور آگے نکل جاتا ہے اور مغارہ (antrum) کے موخر حصہ پر متراکب ہو جاتا ہے۔ نا تجربہ کار سرجن خارجی اذن میں کبھی کبھی آہستہ سے سلائی داخل کرنے سے اس امر کا یقین کر سکتا ہے کہ مغارہ (antrum) اسے کس گہرائی پر ملے گا۔ مزید برآں تا وقتیکہ اسے یہ کہنف نہ مل جائے اسے سلائی کے متوازی رخ میں کام کرنا چاہئے۔

مغارہ کی (antrum) کی متناظر ^{سطحی} ترسیم مکیون (Macewen) کی فوق منفذی مثلث ہے (شکل ۲۵)۔ یہ اوپر کی طرف فوق منفذی عرف یا (موخر وحشی چیمت: posterior) zygomatic roof سے اوپر نیچے کی طرف اس عمود سے جو عرف سے عظمیٰ منفذ کے موخر حاشیہ کے وسطی نقطہ تک کھینچا جائے اور مقدم جانب پر اس خط سے جو عظمیٰ منفذ کا ماس ہوا اور دونوں خطوں سے ملتا ہو محدود ہوتی ہے۔ موضع منفذی دیوار کے صحیح محل کی ترسیم اکثر ہینلے (Henle) کے شکوکہ یا حید کی موجودگی سے ہوتی ہے۔ اور مثلث بذات خود ایک اچھے انشیب کی شکل کی ہوتی ہے جو انگلی سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔

رسائی۔ اس رقبہ میں سرجن گوج (gouge) کا استعمال بلا خطر کر سکتا ہے تا وقتیکہ

وہ سطحی حلی خلیات کو توڑ کر مغارہ (antrum) کو نہیں کھول لیتا۔ اسکے بعد وہ اس امر کا یقین کر دے کہ وہ اسی کہنف ہی میں ہے اور وہ کسی بڑے سے خلیہ میں نہیں اسکے مقدم فوقانی زاویہ میں سے مدخل (aditus) میں سلائی داخل کرنے سے کر سکتا ہے۔ مزید برآں مغارہ (antrum) کھلیا جی سعی منفذ کی موضع دیوار اور اسکی چیمت کے مقام اتصال کی متابعت کرنے سے بھی رسائی کی جاسکتی ہے۔ بر ما منفذ سے ۵ ملی میٹر نیچے اور اسکے بالائی حاشیہ کے لیول پر داخل کیا جاتا ہے اسکی چیمت منفذ کے لیول سے ۵ ملی میٹر اوپر ہوتی ہے۔

علمی خلیات (mastoid cells) علمی زائده کی بالیدگی کے ساتھ ساتھ

نمو پاتے ہیں جو دوسرے سال ہی ایک واضح طور پر نمایاں ساخت کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بوقت پیدائش جوف کے علاوہ بعض دوسرے خلیات بھی بیرونی دیوار میں موجود ہوتے ہیں۔ (ینگ: Young) زمانہ نشہ خوارگی میں علمی زائده کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جس میں ہڈی کثیف ہوتی ہے یہ وہ قسم ہے جو ایک فیصدی بالغوں میں برقرار رہتی ہے۔ دوسری وہ جس میں علمی زائده ڈلوئی دار ہوتا ہے۔ یہ قسم ۲۰ فیصدی بالغوں میں موجود رہتی ہے (آچیل: A. Cheatele)۔ بالغوں میں تین قسمیں تسلیم کی گئی ہیں اور یہ سب تقریباً یکساں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ (۱) وہ جنہیں خلیات بڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اور جوف طبل (tympanic sinus) سے ربط رکھتے ہیں۔ (۲) وہ جنہیں مرکزی خلیات بڑے ہوتے ہیں اور جوف سے ربط رکھتے ہیں اور محیطی خلیات چھوٹے اور بند ہوتے ہیں۔ (۳) وہ جنہیں تمام فضائیں چھوٹی اور بند ہوتی ہیں۔ یہ خلیات جوف کو گھیرے ہوتے ہیں اور بعض اوقات پیچھے کی طرف کو علمی قذالی درز (masto-occipital suture) تک آگے کی طرف کو فوق منغذی خط تک اور پر کی طرف کو علمی جداری درز (masto-parietal suture) تک اور نیچے کی طرف کو علمی زائده کے راس تک چلے جاتے ہیں۔ التهابی حالتوں سے بعض اوقات علمی خلیات کی دیواریں موٹی ہو جاتی ہیں۔ اور ہڈی اتنی کثیف ہو جاتی ہے کہ چھینے کی مزاحمت کرتی ہے۔ زیادہ اوپری خلیات کی وریدیں علمی زائده کی گرد علمی وریدوں میں جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ سے التهاب سطح تک پہنچ جاتا ہے جس سے کان کے پیچھے تہج اور ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

یوسٹیکین نلی (Eustachian tube) طبل (tympanum) کی مقدم دیوار

پرکھلتی ہے (شکل ۲۳ و ۲۴)۔ یہ نلی جو ۱۳ انچ لمبی ہوتی ہے بلعوم میں کھلنے سے طبل میں ہوا کی مناسب رسد پہنچاتی ہے، اور غشا کی دونوں طرفوں کے دباؤ کو مساوی کرتی ہے۔ طبل (tympanum) کا فرش یوسٹیکین نلی (Eustachian tube) کے بیرونی فتحہ کے لیول سے نیچے ہوتا ہے۔ اس نلی کا خط سمت کھوپڑی کے قاعدہ کے سمت عرض اور مقدم موخر محوروں کے درمیان تقریباً عین وسط پر واقع ہوتا ہے۔ بالغ میں اسکا میلان نیچے کی طرف کو ہوتا ہے جس سے افقی مستوی کے ساتھ ۴۰ درجہ کا

زاویہ بنتا ہے۔ یکم میں یہ زاویہ صرف ۱۰ درجہ کا ہوتا ہے (سنگٹن: Symington)۔ بالوں میں نلی کا تین چوتھائی حصہ غضروفی اور ایک چوتھائی عظمیٰ ہوتا ہے (سنگٹن: Symington)۔ اسکی باہر کی جانب پر عضلہ نائشرہ حنکیہ (tensor palati) اور پانچویں عصب کی تیسری قسمت اور وسطی سحائی (middle meningeal) شریان واقع ہوتی ہے۔ اندرونی جانب پر پس بلعوی بافت (retropharyngeal tissue) اور (کانی پیچھے) داخلی سباتی (internal carotid) شریان واقع ہوتی ہے۔ نلی کا بلعوی دہن عام طور پر بند رہتا ہے۔ مگر کچھ وقت یہ زیادہ تر نائشرہ حنکیہ (tensor palati) کے فعل سے کھل جاتا ہے۔ اور اگر ناک اور منہ بند کر کے رخسار جھلائیے جائیں تو دونوں کانوں میں دباؤ کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی قوت سماعت بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ تغیر غشاء طبعی کے اس ہوا سے جو طبل (tympanum) میں بھر جاتی ہے، باہر کی طرف ابھر جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اذن وسطی کے متغیر کرنے کا یہ طریقہ **ولتسوا کے طریقہ** (Valsalva's method) کے نام سے موسوم ہے۔

یوشیکین نلی (Eustachian tube) میں ہوا گزرنے کے پولیٹزر کے طریقہ (Politzer's method) میں مریض کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک تنٹھے میں ہوا سے بھری ہوئی ربڑ کی تھیلی کی ٹوٹی داخل کر دی جاتی ہے۔ اور تنٹھے بند کر کے مضبوطی سے پکڑ لئے جاتے ہیں۔ مریض کو پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لئے کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی تھیلی نو زور سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ ہوا جھکے لئے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اس طرح کھلی یوشیکین نلی (Eustachian tube) میں گھس جاتی ہے۔ سر جن ایک نلی کے ذریعہ سے جو مریض کے اور اسکے اپنے منفذ کے درمیان لگی ہوتی ہے اس ذرا سے شور کے سنائی دینے کی طرف خیال رکھتا ہے جو ہوا کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔

یوشیکین نلی (Eustachian tube) کے مدت تک بند رہنے سے خواہ وہ التهابی ورم کے پھیلنے سے یا بلعوم میں سے غدودہ کی بیش پرورش سے بند ہوئی ہو یا بلعومی سلعات یا سعدا (polypus) سے میکانی انسداد واقع ہوا ہو کان کے اندر کی کچھ ہوا جذب ہو جاتی ہے اور اس کے بہاؤ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یوشیکین نلی (Eustachian tube) کے بہاؤ دار راستہ کے ذریعہ سے سر اُمت اذن وسطی تک پھیل سکتی ہے۔ سی جے۔ بونڈ (C. J. Bond) کو یہ معلوم ہوا ہے کہ لبل کے شعب کے ایک واقعہ میں نلی کے ذرات جھکا امتخاخ انفی بلعوم میں کیا گیا تھا بعد میں

اس مواد میں سے نکلے جو خارجی منفذ میں سے بہا تھا۔

نبی کے بلعومی سورخ کی اوپر کی کور قاعدی زائده سے تقریباً $\frac{1}{2}$ انچ نیچے بلعوم کی موخر دیوار سے $\frac{1}{2}$ انچ آگے تھمائی مغتول ہڈی (inferior turbinate bone) کے موخر سرے سے $\frac{1}{2}$ انچ پیچھے اور حنک الرخو (soft palate) سے $\frac{1}{2}$ انچ اوپر واقع ہوتی ہے (ٹلو: Tillaux)۔ جنین میں یہ سورخ حنک الصلب (hard palate) سے نیچے واقع ہوتا ہے اور بوقت پیدائش اسی کے لیول پر ہوتا ہے۔ اس سورخ کی مکمل مثلثی ہوتی ہے۔

109

یونیکین نبی (Eustachian tube) کے سورخ پر جو ارتفاع ہوتا ہے اسکے عین پیچھے بلعوم کی دیوار میں ایک نشیب ہوتا ہے۔ یہ بلعومی گوشہ (pharyngeal recess) یا حفسہ روزنمر (fossa of Rosenmüller) کہلاتا ہے (مثل ۲۸ صفحہ ۱۲۱)۔ اسے بعض اوقات غلطی سے نبی کا سورخ تصور کر لیا جاتا ہے۔ درہیں یونیکین قاسطیر (Eustachian catheter) کا سرا آسانی اٹک جاتا ہے۔ جن واقعات میں بلعومی لوزہ (لوزہ ٹنسیلا: Luschka's tonsil) کلانی یافتہ ہوتا ہے، انہیں یہ حفرہ طرفین پر بعض اوقات بہت گہرا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک تنگ عطفہ بنتا ہے (دیکھو صفحہ ۱۸۴)۔ یونیکین قاسطیر (Eustachian catheter)

گرا ہونے کے لئے اس آلہ کو اسکا انقعا نیچے کی طرف رکھ کر اسے نقصوں کے فرش کے ساتھ ساتھ داخل کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسکا سرا حنک الصلب (hard palate) کی موخر کور کے اوپر سے بلعوم میں گرتا ہوا محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اب اس آلہ کو باہر کی طرف کھینچنا چاہئے حتیٰ کہ اسکا سرا حنک الصلب کی موخر کور کے اوپر سے پھراٹھتا ہوا محسوس ہو۔ اس مقام پر پہنچ کر قاسطیر کو آگے آگے کی طرف کودھکیں دینا چاہئے اور دھکیلتے وقت اسکی نوک کو ربع دائرہ پر سے باہر کی طرف کو گھما دینا چاہئے۔ اس تدبیر سے اسکو نبی کے سورخ میں آ جانا چاہئے۔

طب کی رسد خون۔ جو شرائین طب کی کور سپہنجاتی ہیں وہ داخلی فکی

(internal maxillary) اور داخلی سباتی (internal carotid) کی طبلی (tympanic) شاخیں اور وسطی سحاتی (middle meningeal) کی حجری (petrosal) شاخ اور موخر اذینی (posterior auricular) کی ابری علی (stylo-mastoid) شاخیں

یہ امر کہ بعض لمبلی وریڈیں فوقانی حجری جوف (superior petrosal sinus) اور جانبی جوفوں میں ختم ہوتی ہیں، اذن وسطی کے التہابی عوارض میں ان گذرگاہوں میں علیقت کے اکثر واقع ہونے کی ایک دوسری توجیہ پیش کرتا ہے۔ حجری فلسمانی (petro-squamous) وریڈ جو اذن وسطی کی چھت کو عبور کرتی ہے اور جس میں وہ شاخیں بھی شامل ہوتی ہیں جو لمبلی جوف اور علیتہ (attic) سے آتی ہیں، پیچھے کی طرف جانبی جوف سے ملتی ہیں اور آگے کی طرف سحائی وریڈوں (meningeal veins) سے (چیل: Cheatle)۔

110

اذن وسطی کے عروق لمف دو راستے اختیار کرتے ہیں۔ انیس سے اکثر یوسٹیکین نلی (Eustachian tube) کی دیوار کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور پس بلعوی لمفی غدہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ بعض عروق منفذ کی استری غشا کے نیچے سے نکل کر غدہ کے پس اذینی گروہ میں جو حللی زائندہ پر واقع ہوتا ہے چلے جاتے ہیں۔ وریڈ دوسری گذرگاہیں بھی اختیار کرتے ہیں جو ان وریڈوں کی رفیق ہوتی ہیں جو عظم صدغی کے علی حصہ پر کے سطحی فحات سے نکلتی ہیں۔

چونکہ جبل لمبلی (chorda tympani) عصب کا محل لمبلی میں معرا ہوتا ہے

اسلئے اذن وسطی کے تعیمی مرض میں اسکو نقصان پہنچنے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ اور یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جب یہ عصب مائوف ہوتا ہے تو حسن ذائقہ میں احتمال پایا جاسکتا ہے اور اگر یہ یاد ہو کہ ذائقہ کے بعض اعصاب زبان تک اس راستہ سے پہنچتے ہیں تو یہ امر آسانی سمجھ میں آسکتا ہے۔

عظمی تہ (osseous labrynth) کان کے دوسرے حصوں سے الگ بنتا ہے۔

اس تہ (labrynth) کے حصوں میں تنخر واقع ہو چکا ہے جو شناخت پذیر ٹکڑوں کی شکل میں نکالے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر بار (Dr. Barr) نے ایک واقعہ کا اندراج کیا ہے جس میں تمام عظمی تہ (حلزونہ) دلیز، نیم دائری قنایں (منخر قطعہ کی شکل میں سمعی منفذ میں سے سالم نکال لیا گیا تھا۔ ذن لمبلی کا تھقب اذن اندرونی تک خارجی نیم دائری قنال پر چکر کرنے جو عام ترین راستہ ہے (سکاٹ Scott: اور ویسٹ: West)۔ اور پرنٹ (promontory) کو متاثر کرنے سے، اور

بیضوی نافذہ (fenestra ovalis) کے راستہ سے جس میں رکیب (stapes) کا پاندان مضبوط حلقی غشا سے مثبت ہوتا ہے یا مستدیر نافذہ (fenestra rotunda) کے راستہ سے جو

غشاء ثانی (membrana secundaria) سے بند ہوتی ہے پھیل سکتا ہے۔ جب التهابی سرایتیں اذن اندرونی تک پھیل جاتی ہیں تو علامات کے دو سلسلے نمودار ہوتے ہیں۔ (۱) التهاب اور تکیج کے گرد لمفی نظام (درہیزی نردبان: scala vestibuli) اور طبلی نردبان: (scala tympani) کے راستے سے ملزوتہ (cochlea) تک پھیل جانے سے اختلال سماعت اور بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ (۲) تاجک (saccul) رُحک (utricle) اور نیم دائری قنالوں کے اختلافات کو مندر پہنچنے اور انکے تباہ ہونے سے توازن اور ہم آہنگی میں اختلالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوران سر اور قے اذن اندرونی کا گرد لمفی نظام انتشار التهاب کے لئے ایک نہایت ہی سہل المعمول ذریعہ ہے۔ تقیمی عمل اذن اندرونی سے بعض اوقات محب (auditory nerve) اور منفذ کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف کو پھیل جاتا ہے اور اس طرح دماغ کے قاعدہ پر کی بڑی بڑی زیر معکبوتی فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ مصیف ہلزی (aqueductus vestibuli) یا مصیف ملزونی (aqueductus cochleæ) کے راستے سے یا فوقانی نیم دائری قنال (superior semicircular canal) کے اشتقاق میں سے صحیحی مشمولات میں چلا جاتا ہے۔ اذن دسلی کا مرض خارجی نیم دائری قنال میں ناسوری فتحہ بننے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے واقعات میں سر کے حرکات سے اہتر از مقلد (nystagmus) پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ آنکھ کے معکوس حرکات ان تہیجات سے متاثر ہوتے ہیں جو نیم دائری قنالوں کے لمخوں (maculae) میں پیدا ہونے ہیں (سڈنی سکاٹ: Sydney Scott)۔

بائشتم

ناک اور انفی کہنے

(NOSE AND NASAL CAVITIES)

ناک

ناک کی جڑ اور اسکی پشت کے زیادہ تر حصہ کی جلد پتلی اور ڈھیلی ہوتی ہے۔ مگر جناحین (alæ) پر یہ موٹی اور عمیق حصوں سے مضبوطی سے منضم ہوتی ہے، اور اسیں دہنی اور عرقی غد کی رسد بکثرت موجود ہوتی ہے۔ ناک کے غضروبی حصہ کے اوپر کی پوشش کے التهاب کے بہت درد خیز ہونے اور اسیں بہت ساعرقی احتقان پائے جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ درد کا انحصار اس حصہ کی قیدگی پر ہوتا ہے جو اسے اعصاب پر زیادہ دباؤ پڑنے کے بغیر متورم ہونے سے باز رکھتی ہے اور احتقان کا انحصار اس خطہ کی منفرد عرقی رسد اور اس امر پر ہوتا ہے کہ چونکہ نچھنے کی کور ایک آزاد کینا رہے اسلئے یہاں کا دوران خون اختتامی ہے لہذا اس سے استقامتی مساعت ہونیکا امکان ہوتا ہے۔ چونکہ ناک کے زیرین حصہ پر کثیر التعداد دہنی غد موجود ہوتے ہیں اس لئے کئی

(acne) کے لئے یہ ایک موافق مقام ہے۔ کئی (acne) کی وہ قسم جو پیش پرورشی کئی (acne hypertrophica) کے نام سے موسوم ہے یہیں پر پائی جاتی ہے۔ اس سے وہ منظر پیدا ہوتا ہے جو ”خجور الخمر“ (grog blossoms) کہلاتا ہے۔ ناک پر ذئبہ (lupus) کا طبعی اکثر ہوتا ہے

اور ذئبہ احمراری (lupus erythematosus) ناک کی پشت پر نہایت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ قارض قرعہ (rodent ulcer) کے بھی اس خطہ پر خاص کر جناح الانف اور رخسار کے درمیانی شکن میں واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔

ناک کی جلد میں خون کی رسد بکثرت موجود ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ حصہ بہت ترقیبی عملیہ جات کے لئے جو اسپر کئے جاتے ہیں بہت موزوں ہے۔ اس خطہ کے زخم بغیر تکلیف دینے کے مندمل ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے وسیع زخم کے بعد بھی جو ناک اور رخسار کے درمیانی خطہ پر اوپر کے جبڑے کو علیحدہ کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے بہت کم بدشکل باقی رہتی ہے۔ بہت سے اطفال کو ذہن آفتا میں ناک کے حصے بالکل کٹ گئے ہیں اور فوراً لگا دینے سے چہرہ سے متہمد ہو گئے ہیں۔

113

ناک کی جبر کے اوپر کی جلد کو پانچویں عصب کی پہلی قسمت کی انفی شاخ رسد پہنچاتی ہے۔ اور جناصین (alae) اور نسیمنوں کے خطہ کے اوپر کی جلد کی رسد بھی اسی سے آتی ہے شکل ۲ (صفحہ ۱۱)۔ ناک کی جانب کے زیادہ تر حصہ کو پانچویں حصہ کی دوسری قسمت سے رسد آتی ہے اور اس تنے کے وجع العصب میں یہ بھی درد کا ایک محل ہوتا ہے۔ اس امر سے کہ انفی عصب عینی (ophthalmic) تنے کی ایک شاخ ہے اور آنکھ سے قریبی تعلقات رکھتا ہے اس تدمع کی توجیہ ہوتی ہے جو تھنے کے درد خیز عوارض میں پیدا ہوتا ہے مثلاً جبکہ تھنے کے کور کی چٹکی بھری جاتی ہے۔

ناک کا غضروفی حصہ اکثر ذئبہ (lupus) اور آتشکی تقرح اور دوسرے
متلف عوارض سے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو حصے ضائع ہو جاتے ہیں انکو مختلف طریقوں سے جو ترقیع الانف (rhinoplasty) کے عنوان میں شامل ہیں از سر نو قائم کیا جا چکا ہے۔ موروثی آتشک کے مریعوں میں ناک کا باف اکثر بہت منخفض پایا جاتا ہے۔ اس انخفاض کا انحصار حصوں کے حقیقی نقصان پر نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر مقامی سو تغذیہ سے پیدا شدہ ناقص نوپر ہوتا ہے۔ یہ سو تغذیہ وہ ہے جو غشائے مخاطی کی شدید نازلت سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ بدشکل مرف انہی اشخاص میں پائی جاتی ہے جنکو مشیر خوارگی کے زمانہ میں گنگانے کی شکایت رہی ہو۔ ناک کے غضروفی قطعہ کے حدود کو ذہن نشین رکھنا اور یہ یاد رکھنا مناسب ہے کہ موسع منظر داخل کرتے وقت اس آلہ کو ان حدود سے آگے نہ گزارنا چاہئے۔

انفی ہڈیاں (nasal bones) اکثر بلا واسطہ ضرب سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ کسر

114

ہڈیوں کے زیرین ایک تہائی حصہ میں جہاں یہ نہایت تیلی ہوتی ہیں اور انکا سہارا کمترین ہوتا ہے نہایت کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ بالائی ثلث میں یہ نہایت ہی نادر الوقوع ہے جہاں یہ ہڈیاں موٹی اور مضبوطی سے قائم ہوتی ہیں اور جہاں کسر پیدا کرنے کے لئے حقیقتاً معتد بہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ انفی ہڈیوں پر کوئی عضلات فعل نہیں کرتے اسلئے جو بغیر وضعیت بھی واقع ہوتی ہے اسکا انحصار تمامہ جوٹ کی سمت پر ہوتا ہے۔ ان کسور کے بعد غلطی اتحاد جسم کی کسی دوسری ہڈی کے کسر کے اتحاد کی نسبت بہت سرعت سے واقع ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں جو ہیلٹن (Hamilton) کے مشاہدہ میں آیا تھا ”مکڑے ساتویں دن اچھی خاصی مضبوطی سے متحد ہو گئے تھے“ اگر ناک کی غشائے مخاطی پھٹ جائے تو ان کے کسور کے ساتھ زیر جلدی بافت کا نفاخ (emphysema) پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، جو ناک صاف کرنے سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایسی حالتوں میں ہوا بلاشبہ انفی خفرہ جات سے آتی ہے۔ انفی ہڈیوں (ossa nasi) کے بالائی ثلث کے کسور میں غراباں صفحہ (cribriform plate) بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ امر مختلف فیہ ہے کہ آیا یہ پیچیدگی اس وقت بھی واقع ہو سکتی ہے جبکہ کسر ان ہڈیوں کے زیرین ایک تہائی حصہ تک ہی محدود ہو۔

ناک کی بڑا قیلہ جات سحائیہ (meningoceles) اور قیلہ جات غمغ (encephaloceles) کے لئے ایک موزوں مقام ہے اور بروز انفی او جہی (frontal) ہڈیوں کی درمیانی درز میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کے بروزات جب اس مقام پر رونما ہوتے ہیں تو یہ اکثر ایک باریک اور عرقی خلاف سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور غلطی سے یہ انکو شمار نہا بالیدیں (naevoid growths) تصور کیا جا چکا ہے۔

انفی کہفہ جات

(NASAL CAVITIES)

انفی کوٹنگ ہر ایک طرف مفتول ہڈیوں (turbinate bones) یا شنجوں (conchae) کے ذریعہ سے پچتریں منافذ میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور فوقانی مفتول (superior)

turbinate سے اوپر وتدی مصغاتی گوشہ (sphenothmoidal recess) ہوتا ہے
انہیں سے ہر ایک منفذ میں مندرجہ ذیل جوف اور قناتیں نکلتی ہیں :-

وتدی مصغاتی گوشہ میں - وتدی ہوائی جوف -

فوقانی منفذ میں - موخر مصغاتی خلیات ایک یا زائد فحات سے -

وسلی منفذ میں - (۱) جہی جوف اور مقدم مصغاتی خلیات براستہ قمع

(infundibulum) - (۲) ہائی مور (Highmore) کا فکی مغارہ -

(۳) وسلی مصغاتی خلیات -

تحتانی منفذ میں - انہی قنات ایک فتحہ کے ذریعہ سے مقدم منخرین سے ملانچ چھ
کی طرف -

115

مقدم منخرین (anterior nares) کی شکل کیقدر تاش کے پان سے ملتی ہے
اور انکا وزن مجموعی طور پر معمولی ہے۔ انچ اور عرضاً سب سے چوڑے حصہ پر ملانچ سے ذرا کم
ہوتا ہے۔ منخر کا مستوی منخرین کے فرش کے مستوی سے ذرا نیچے ہوتا ہے۔ لہذا انہی کہفہ جات کا
امتحان کرتے وقت سر کو پیچھے کی طرف گرا دینا چاہئے اور ناک کو اوپر کی طرف اٹھا دینا چاہئے۔
مقدم منخرین اور انہی کہفہ جات کے سامنے کے حصوں کا اتعصا عملیہ روج (Rouge's operation)
سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ کار میں اوپر کے لب کو الٹا لیا جاتا ہے اور ایک شکاف غشائے
مخاطی میں سے ان نرم حصوں میں دیا جاتا ہے جو اوپر کے لب کو اوپر کے جبرے سے ملاتے ہیں۔ یہ
شکاف دونوں طرف کے دوسرے انسان شنیوہ کے درمیان رہتا ہے۔ جو نرم حصے اوپر کے لب
اور ناک کو ہڈی سے ملاتے ہیں انکو جلد کو نقصان پہنچانے کے بغیر کاٹ دیا جاتا ہے اور اس
دامن کو بند یہیہ تقطیع اوپر اٹھا لیا جاتا ہے حتیٰ کہ منخرین کا فی حد تک معرا ہو جاتے ہیں۔

جب مقدم الف بینی (anterior rhinoscopy) ایسی روشنی سے کیا جائے
جو پیشانی کے آئینہ یا لیمپ سے آتی ہو اور انہی کو شک کے مقدم غضروفی حصہ میں داخل کئے جائیں
منظر میں سے جیسا کہ تھوڈیکم (Thudichum) کا ہوتا ہے چمکتی ہو تو مندرجہ ذیل حصے دیکھے
جاسکتے ہیں اور انکا امتحان کیا جاسکتا ہے :- تحتانی منفذ، تحتانی اور وسلی مغتول ہڈیوں کا مقدم
سر اور فاصلہ - فوقانی مغتول ہڈی (superior turbinate) آگے کی طرف کو اتنی بڑھی نہیں
ہوتی کہ دکھائی دے۔

موخر منخرین (posterior nares)۔ ہر ایک دہنہ کمل طور پر نمویافتہ بالغ میں مستعیناً تقریباً $\frac{1}{4}$ انچ اور عموداً تقریباً $\frac{1}{2}$ انچ ہوتا ہے۔ لہذا اگر رعاف (epistaxis) کو بند کرنے کے لئے کوئی ڈاٹ موخر منخرین میں سے داخل کیجائے تو اسکے ابعاد یہی ہونے چاہئیں۔ بہر کیف عملی کن اکثر اس دہنہ کو حنک کے پیچھے سے قیفہ (choana) میں انگلی ڈالنے اور پھر مضمخرین میں اس تک فیتہ ٹانگا زٹھونے سے بند کر دیتا ہے۔

موخر الف بینی (posterior rhinoscopy) ایک چھوٹا سا آئینہ زبان پر اور حنک الرخ کے پیچھے سے آہستہ آہستہ گزار کر بلعوم میں لے جانے سے کیا جاتی ہے۔ روشنی کی شعاع سے جو پہلے پیشانی کے آئینہ سے اور پھر چھوٹی سی الف بینی سے منعکس ہوتی ہے مندرجہ ذیل ساختیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ موخر منخرین، فاصل، وسطی مفتول ہڈی (middle turbinate bone) اور تحتانی اور فوقانی مفتول ہڈیوں کا کچھ حصہ اور تحتانی منفذ کا کچھ حصہ۔ وسطی منفذ بخوبی دکھائی دیتا ہے اور یوسٹیکین ٹی (Eustachian tube) اور جھٹ اور انفی بلعوم کے بالائی حصہ کی غشائے مخاطی بھی نظر آتی ہے۔ فاصل اپنے طول کے نصف پر ایک بصلہ کی شکل پر پھیل جاتا ہے، جسے نا تجربہ کار امتحان کنندہ بعض اوقات غلطی سے کوئی امر انضیاتی کیفیت سمجھ لیتا ہے۔

شکل کا تعلق ہے اسکا فرش ہر ایک سرے کے فرش کی نسبت


مرکز پر زیادہ عریض ہوتا ہے اور اسکا انقباضی قطر مستعرض سے زیادہ ہوتا ہے۔ نیز حفرو کے مرکز پر یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ لہذا ناک میں داخل کی ہوئی چمٹیوں کو انقباضی رخ میں کھولنا نہایت موزوں ہوتا ہے۔ حفرو کا عرض اوپر سے نیچے کی طرف کو کس قدر بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ فوقانی مفتول ہڈی فاصل سے صرف ۲ ملی میٹر دور ہوتی ہے۔ اور تحتانی مفتول ہڈی اور فاصل کے درمیان ۴ تا ۵ ملی میٹر کی فضا حامل ہوتی ہے۔ وسطی مفتول ہڈی سے اوپر انفی کہف اتنا تنگ ہوتا ہے کہ انفی حفرو کی جراحی چھت فی الحقیقت اسی ہڈی ہی سے بنتی ہے۔

کچھ میں انفی کہف کی شکل اور اسکا تناسب عجیب ہوتا ہے۔ بالغ میں تحتانی منفذ

(inferior meatus) بڑا ہوتا ہے (شکل ۲۷) اور اصل تنفسی گزرگاہ یہی ہوتی ہے۔ کم عمر بچہ میں تحتانی منفذ نسبتاً بہت چھوٹا ہوتا ہے اور تنفسی موج زیادہ تر وسطی منفذ کی فضا میں سے

گزرتی ہے (لیک: Lack)۔ انفی کہنے چھٹے مہینہ سے لیکر اٹھارویں مہینہ تک تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اس زمانہ میں مستقل تسن نمودار ہوتا ہے اور یہ تنک کی جسامت اور ناک کے فرش میں لازمی طور پر اضافہ کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی فکی جوف کے نوے ناک کی عمودی بلندی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ زیادتی اس کہنے کے برین فکی حصہ میں مصفاقی یا شمتی حصہ کی نسبت بہت زیادہ واقع ہوتی ہے۔ انفی کہنوں اور چہرہ کی بالیدگی ناک میں سے سانس کے آزادانہ گزرنے میں رکاوٹ پیدا ہونے سے موقوف ہو جاتی ہے یا ناقص رہ جاتی ہے۔ اس رکاوٹ کا عام ترین سبب انفی بلعوم میں

117



شکل ۲۴۔ انفی کہنوں اور معین جوفوں کی متعرض عمودی تراش۔

غدد وہ کا نکلن ہے۔

انفی کہنوں کے تعلقات کو (شکل ۲۴ و ۲۸) دیکھنے سے یہ ظاہر ہو جائیگا کہ استری غشا کا التهاب (زکام) بلعوم تک موخر منخرین کے راستہ سے پہنچ سکتا ہے۔ اور یوسٹیکین ٹی (Eustachian tube) تک پہنچ کر کیفیت رہا این پیدا کر سکتا ہے۔ اور انفی دمسی قنات (nasal-lacrymal duct) میں کوئی تاجہ (lacrymal sac) اور مقعرہ (conjunctiva) تک پہنچ سکتا ہے اور جہی اور فکی جوفوں تک موصول ہو سکتا ہے اور جہی درد اور رخسار کا درد پیدا کر سکتا ہے۔ ان تعلقات کا مظاہرہ زکام کا ایک شدید حملہ ہونے سے اکثر ہوتا ہے۔ انفی حفرہ جات کے جمعی کہنے کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ ناک کے قیچی التهاب سے التهاب بحالیہ

118

(meningitis) پیدا ہو گیا ہے۔ یہ نایاب ہے کہ وہ خود عفویئے جن سے اسمیہ دماغ کا التهاب پیدا ہوتا ہے ناک کے مخاطی استر سے جھمی کہنے کو ان چھوٹے چھوٹے دوی اور لمفی عروق کے راستے سے جاتے ہیں جو غریبائین صفحات میں سے تہی اعصاب کے ساتھ گزرتے ہیں۔

مختلف اقسام کے اجسام غریبہ اکثر ناک میں اکٹھے جاتے ہیں اور بعض اوقات کچھ سالوں تک پڑے رہتے ہیں۔ بچہ میں دائمی یک جانبی انفی مواد سے ناک میں داخل شدہ جسم غریب کے موجود ہونے کا شبہ پیدا ہو جانا چاہئے پھسل جانے والی چیز مثلاً بوٹ کے بٹن کا دور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر ایک خمیدہ سلائی آہستہ سے اس سے پیچھے گزاردینے سے اسے نکالا جاسکتا ہے۔

انفی کہنوں کو ناک کے نطول (douche) سے دھوئے وقت سیال ایک سیفن کے ذریعہ سے داخل کیا جاتا ہے۔ سیفن کی ٹونٹی نٹھنے میں داخل کر دیا جاتی ہے اور منہ کھلا رکھا جاتا ہے اور سیال اس نٹھنے میں سے داخل ہو کر حنک الرخو (soft palate) پر سے گزر کر دوسرے نٹھنے میں سے باہر نکل آتا ہے، لہذا موضح الذکر کہنے پیچھے سے آگے کی طرف کو دھل جاتا ہے۔ پانی کے مہر کا انحصار اس امر پر ہوتا ہے کہ جب منہ کھلا رکھا جاتا ہے تو صرف اسی میں سے سانس لینے کی طرف آنا میلان ہوتا ہے کہ حنک الرخو (soft palate) اوپر کی طرف کو کھینچ جاتا ہے اور موضح منخرین بلعوم سے علمدہ ہو جاتے ہیں۔

ہر ایک انفی حفرہ کی چھت بہت تنگ ہوتی ہے اور اس کا عرض صرف $\frac{1}{8}$ انچ ہوتا ہے (شکل ۲۷)۔ یہ باریک غریبائین صفحہ سے بنی ہوتی ہے مگر یہ استقد رنگ ہوتی ہے کہ اتنی بڑی چیز سے جتنی کہ سعدانی چھٹی ہوتی ہے اس کے منقبت ہونے کے خطرہ میں بہت سامبالنا گنا گیا ہے۔ باوجود اس کے جھمی کہنے ناک کی چھت میں سے گس جانے والے اجسام سے جو اتفاقاً داخل ہو گئے تھے یا خود کشی کی غرض سے داخل کئے گئے تھے کھل چکا ہے۔ انفی حفرہ کے التهاب کے بعد التهاب سحایہ (meningitis) واقع ہو چکا ہے اس حالت میں التهاب غریبائین صفحہ سے گزرتا ہے۔ گرد و جسمی اور گرد عرقی غلافوں کے ذریعہ سے ناک کے لمفی نظام کا تسلسل اسمیہ کے لمفی نظام کے ساتھ قائم ہے۔ اور ان گزرگاہوں میں سے سرائتیں ناک کی چھت سے لیکر دماغ کے اسمیہ تک پھیل سکتی ہیں۔

119

اس حصہ کے کسوریں دماغی نخاعی سیال کی بہت کثیر مقدار متعقوں سے بچتی ہے۔ ناک کی چھت میں سے قبیلہ سحایہ (meningocoele) بروز کر سکتا ہے۔ لشن برگ (Lichtenberg) نے ایک واقعہ کی اطلاع دی ہے جس میں یہ تودہ حنک کے ایک خلقی انشقاق میں سے گزر کر منہ میں لٹک رہا تھا

یہ غلطی سے سعدانہ (polyp) سمجھ لیا گیا تھا اور اسے باندھ دیا گیا اور موت درون جھمی التہاب سے واقع ہو گئی۔

فاسل

(septum) بالغوں میں نثار و نادر ہی میں سیدھا ہوتا ہے۔ اس کا انحراف اکثر بائیں جانب کو ہوتا ہے۔ مگر بچوں میں یہ سیدھا ہوتا ہے اور ساتویں سال تک ایسا ہی رہتا ہے۔ بالغوں میں تمام اشخاص میں سے ۷۶ فی صدی میں فاسل منحرف ہوتا ہے۔ اس کا انحراف چوٹ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ فاسل کا انحراف بعض اوقات کانے کی آواز میں بہت بری طرح سے خلل انداز ہوتا ہے۔ منحرف فاسل میں بعض اوقات مضاعف یعنی ایس (S) کی شکل کا غم دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک غم اوپر سے نیچے کی طرف کو اور دوسرا آگے سے پیچھے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ غیر طبعی طور پر بلند جھک اکثر پایا جاتا ہے۔ انحراف کی خفیف سی مقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مگر ایسے انحراف کا علاج جو فاسل اور مفتول (turbinate) ہڈیوں کی قربت کی وجہ سے انسداد پیدا کرنے کے لئے کافی ہو فاسل کے غضروفی حصہ کے زیر غامی جڑنی ہتھک (submucous resection) سے کیا جاسکتا ہے۔ اکثرانی آئٹنک کی چھٹی ناک عام طور پر فاسل کی تباہی اور ہم پہلو ہڈیوں کے کم و بیش متاثر ہونے سے دیکھنے میں آتی ہے۔

بیرونی دیوار (شکل ۲۸)۔ بیرونی دیوار پر تین مفتول (turbinate) ہڈیاں

ہوتی ہیں۔ بالائی اور وسطیٰ مصغاتی (ethmoid) سے پیدا ہوتی ہیں اور تحتانی ایک علحدہ ہڈی ہونے کی وجہ سے فک (maxilla) کی اندرونی جانب سے چسپیدہ ہوتی ہے۔ اور اس سے فکی جوف (maxillary sinus) کی اندرونی دیوار کا کچھ حصہ بھی بنتا ہے۔ انکے نیچے ناک کے تینوں منافذ واقع ہوتے ہیں۔ تحتانی انفی مشخہ (inferior nasal concha) بعض وقتا یوسٹیکین کیتھٹر (Eustachian catheter) کے داخل ہونے میں خلل ہوتا ہے، جبکہ اس آلہ کا خم نہ درت سے زیادہ ہو۔ اس ہڈی کا مقدم سرانقہ کے سوراخ سے تقریباً ۳ انچ پیچھے ہوتا ہے۔ انفی قنات (nasal-lacrymal duct) تحتانی منفذ میں تمنے کے سوراخ سے تقریباً ۳ انچ پیچھے اور ناک کے فرش سے تقریباً ۳ انچ اوپر کھلتی ہے۔ یہ فتح بالعموم جھری غا اور تنگ ہوتا ہے۔ انفی قنات انفی غشائے مخاطی کو ایس طرح ترچے رخ میں اور مصرامی طریقہ سے مشتب کرتی ہے جس طرح کہ حالب مشانہ میں داخل ہوتا ہے۔ اسلئے ناک دمسی تاج (lacrymal sac) کو منتفع کئے بغیر ماف

کیا جاسکتی ہے۔ تحتانی منفذ کی بلندی تقریباً $\frac{3}{4}$ انچ ہوتی ہے۔

فوقانی منفذ (superior meatus): بہت چھوٹا اور تنگ سا انشقاق ہے،

اور اسکے اوپر کے اور اگلے حصہ میں موخر مصفاتی خلیات کھلتے ہیں۔

وسطی منفذ (middle meatus): اگلی طرف پر بیرونی دیوار کے ایک حصہ پر

اطاق (atrium) کہا جاتا ہے بہت کھل جاتا ہے۔ اور تا وقتیکہ ہر ایک اوزار کی نوک کو محروم کے

فرش کی طرف اچھی طرح رکھنے کی احتیاط نہ کی جائے اسکو تحتانی منفذ کی نسبت وسطی منفذ میں

زیادہ آسانی سے گرا جا سکتا ہے۔ وسطی منفذ کی دیوار پر ایک گہری کھلی نالی ہوتی ہے (نیم قمری

فرجہ: hiatus semilunaris) جو اوپر سے نیچے کی اور پیچھے کی طرف کو جاتی ہے (شکل ۲۸)۔

اس میزاب میں جبہ جوف (frontal sinus) قمع (infundibulum) کے ذریعہ سے جو

تقریباً $\frac{1}{4}$ انچ طویل ہوتا ہے اور مقدم مصفاتی خلیات کھلتے ہیں اور نیز اسکے موخر حصے کے قریب

اس میں فکی جوف بھی کھلتا ہے۔ جبہ جوف کا مستدیر وزن عام طور پر فرجہ (hiatus) کے مقدم

حصے پر واقع ہوتا ہے۔ مگر با اوقات یہ ایک گوشہ میں بھی پایا جاتا ہے جو فرجہ سے اوپر اسکے

سامنے ہوتا ہے۔ مقدم مصفاتی خلیات جو تعداد میں بالعموم دو ہوتے ہیں، بعض اوقات فرجہ

کھلتے ہیں بعض اوقات قمع (infundibulum) میں اور بعض اوقات بلا واسطہ وسطی منفذ کے

مقدم حصہ میں۔ فکی جوف (maxillary sinus) کا فوٹیم قمری فرجہ (hiatus semilunaris)

کے موخر حصہ میں واقع ہونے کے بجائے بعض اوقات اس کے نیچے واقع ہوتا ہے (شکل ۲۸)۔ فرجہ کی

اوپر کی حد مصفاتی حباب (bulla ethmoidalis) سے بنتی ہے اسکا نیچے کا باریک اور نمایاں

حاشیہ مصفاتی (ethmoid) کے کلاب نما زائدہ (uncinate process) پر مشتمل ہوتا ہے

وسطی مصفاتی طلیہ نیم قمری فرجہ سے اوپر حباب (bulla) پر کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فرجہ کا لیول

ناک کے اندر اندرونی جنبی رابطہ (internal palpabral ligament) کے محل سے ظاہر


کیا جاسکتا ہے۔ فرجہ کے میلان کی وجہ سے پیپ کا رجحان سرائت زدہ جبہ جوف یا کسی دوسرے ہوائی

جوف میں سے فکی جوف میں بہنے اور اس کہفہ کو سرائت زدہ بنا دینے کی طرف ہوتا ہے۔

ناک کا فرش تقریباً $\frac{1}{4}$ انچ یا اس سے ذرا زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہموار

اور خفیف ماڈلن ہوتا ہے جو آگے سے پیچھے کو اوپر کی طرف کو چلا جاتا ہے (شکل ۲۷)۔ اس کے

مقدم حصہ پر شیشی سوراخ (incisor foramen) کے اوپر غشائے مخاطی کا ایک نشیب ہوتا ہے۔ یہ سوراخ اس ربط عظیم کا بقیہ حصہ ہے جو کبھی ناک اور منہ کے کہنوں کے درمیان موجود تھا۔ جو غشائے مخاطی انفی کہہ جات کا استر ہوتی ہے اسکی پوشش نیچے کے دو تہائی حصہ یعنی تنفسی حصہ پر بہ دار مرحلہ کی ہوتی ہے۔ بالائی ایک تہائی حصہ یعنی شمی حصہ ستونی مرحلہ سے ڈھکا ہوتا ہے اور دہلیز (vestibule) کا استر مطبق مرحلہ کا ہوتا ہے۔ عظام منقولہ



شکل ۲۸۔ انفی کہنہ کی بیرونی یا جانبی دیوار۔

وسلی منقولہ زائدہ کا زیادہ تر حصہ فرجہ، حجاب اور قعر کے قعر یا انفی جہی قعات اور فکی جوف کو معرا کرنے کے لئے کاٹ دیا گیا ہے۔

(turbinate bones) اور فاصل کے زیرین دو تہائی حصہ پر یہ بہت موٹا ہوتا ہے! اور انفی فرجہ عظام منقولہ کے درمیان کے وقفہ میں یہ بہت پتلا ہوتا ہے۔ جس غشائے مخاطی سے مختلف جوفوں اور مغارہ کا استر بنتا ہے وہ نمایاں طور پر پتلی اور زردی مائل ہوتی ہے۔ اس غشا میں بہت سے غدود ہوتے ہیں جو بیرونی دیوار کے زیرین اور پتلی حصوں اور فاصل کے موخر اور زیرین حصوں پر نمایاں ترین ہوتے ہیں۔ ان غدود میں بعض اوقات معتد بہ بیش پرورش ظاہر ہو جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں ایک آبی افراز کے بہت افراط سے ہیا کرنے کی قابلیت موجود ہوتی ہے! اور یہ افراز مزمن زکام کی بعض حالتوں میں جو تضرر کے بعد پیدا ہوئی تھیں اس کثرت سے پیدا ہو چکا ہے کہ اسکو غلطی سے

دماغی شوکی سیال کا سیلان تصور کیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں انفی غشائے مخاطی میں بہت سی غدہ آسا اور لف آسا بافت بھی موجود ہوتی ہے۔

عظام مفتول تحتانی کے زیرین کنارے اور موخر سرے پر طبعی غشائے مخاطی اس قدر موٹی اور ڈھیلی ہوتی ہے کہ یہ ایک نرم گدی کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو بعض اوقات ”جسم مفتول“ (turbinate body) کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ یہ کیفیت زیادہ تر ایک کثیر العروق نری مخاطی وریدی ضغیرہ کے موجود ہونے سے پیدا ہوتی ہے جسکے عروق کا رخ بیشتر حصہ میں مقدم موخر ہوتا ہے۔ جب انہیں خون سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پھول کر ہڈی اور فاصل کے درمیانی فاصلہ کو سدود کر دیتا ہے۔ اور جب انہیں مزمن التهاب واقع ہو جاتا ہے تو ناک کے بالائی حصوں کی غشائے مخاطی تہیج ہو کر مصفاقی خط اور وسطی مفتول ہڈی سے سعدانوں کی شکل میں ٹنک پڑتی ہے جو ہوا سانس سے اندر جاتی ہے وہ ناک کے کثیر العروق استری غشا پر سے گزرتے وقت گرم ہو جاتی ہے۔ مزید برآں یہ صاف بھی ہو جاتی ہے گرد اور دوسرے اڑنے والے ذرات شیخوں (conchæ) کی مرطوب سطح پر جم جاتے ہیں۔

حالتِ صحت میں ادھر کی دونوں کوشکوں کی غشائے مخاطی امراضیاتی عضویہ بات سے تقریباً مبرا ہوتی ہے۔ مگر تحتانی منفذ کو ہمیشہ سرائت زدہ تصور کرنا چاہئے۔ گو یہ اتنا سرائت زدہ نہیں ہوتا جتنا کہ منہ۔ چونکہ چھینکے، کھانسنے اور بولنے سے منہ اور ناک سے خود عضویہ بات خلیج ہوتے ہیں، اسلئے سرجنوں میں گاز کا زکانتاب باندھنے کا رواج ہے۔ یہ نقاب کم از کم آٹھ تہ موٹا ہونا چاہئے۔

سعدانے (polypi) اکثر ناک میں پائے جاتے ہیں۔ انکی دو قسمیں ہیں۔ ایک

مخاطی یا تہیجی، التهابی سعدانہ جو عام طور پر وسطی شخہ (middle concha) کے اوپر یا نیچے کی غشائے مخاطی سے یا مصفاقی خط سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایسی ہیملی (sarcomatous) سعدانہ جسکی ابتداء عام طور پر ناک کی چھت کے یا کھوپڑی کے قاعدہ کے گرد عظمہ سے ہوتی ہے۔ موخر الذکر قسم کے سعدانے (polypi) ہر ممکن الموصول رخ میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ ناک کے بانسے کو پھیلا دیتے ہیں، انفی قنات کو بند کر دیتے ہیں اور کوماع (epiphora) پیدا کر دیتے ہیں۔ نیز تنک الصلب کو متغضض کر دیتے ہیں اور منہ تک چلے آتے ہیں۔ مفاہرہ پر حملہ کر کے رضا رکھو پھیلا دیتے ہیں۔ اور نیچے کی طرف بڑھتے بڑھتے بلعوم میں چلے جاتے ہیں متعلق (velum palati)

کو آگے کی طرف کو دھکیل دیتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ کی اندرونی دیوار میں سے بھی نفوذ کرتے ہیں۔ ایسے سلعات کا تکشف اور ازالہ فک فوقانی کی موزوں اور اندرونی چسپیدگیوں کو ملاحظہ کرنے اور اسکو آگے کی طرف موڑنے اور اس طرح انفی کہنف کی بیرونی دیوار کو دور کر کے اس کہنف کو معرکہ کرنے سے کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ ہڈی کو سلعہ دور کرنے کے بعد پھر اسی جگہ قائم کیا جاسکتا ہے۔

انفی کہنف کی رسد خون وسیع ہوتی ہے اور یہ داخلی فکی (internal maxillary) عینی (ophthalmic) اور وہی (facial) شریانوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ناک سے جو صفاتی (ethmoidal) وریدیں آتی ہیں وہ عینی (ophthalmic) ورید میں داخل ہوتی ہیں۔ اور بعض ارباب سند کا یہ خیال ہے کہ بچوں میں انفی وریدوں اور فوقانی طولی جوف میں سوراخ عور (foramen cæcum) کے راستہ سے ہمیشہ ایک ربط پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ربط بالغ میں بھی برقرار رہتا ہے۔ ان تعلقات سے ان جھمی عوارض کے وقوع کی بھی کیتقد رتوجیہ ہو جاتی ہے جن پر انفی کہنف جات کے بعض الہابی عوارض منتج ہوتے ہیں۔ ناک سے جریان خون یا رعاف (epistaxis) عام طور پر واقع ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر ایک شدید عارضہ ثابت ہوتا ہے۔ اسکی کثرت وقوع کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ غشائے مخاطی کثیر العروق اور ڈھیلی ہوتی ہے اور نیز وریدیں مذکورہ جو سب سے نیچے کی (فکی: maxillary) نفوذ ہڈی پر پائی جاتی ہیں وسیع ضغیرہ جات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ان سے ایک قسم کی ایک کہنف کی بافت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا رعاف (epistaxis) اکثر وریدی دوران میں فعل آنے سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ان صفاتی سلعات کے موجود ہونے کی حالت میں جو بڑی بڑی وریدوں پر دباؤ ڈالتے ہیں اور سعال دیجی کے دوروں میں اور علی ہذا دوسرے عوارض میں دیکھنے میں آتا ہے۔ رعاف میں ہائز اوپر اٹھانے سے جو مفید اثر ظاہر ہوتا ہے اسکے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صدر اس طرح اور زیادہ پھیل جاتا ہے اور صفاتی وریدوں پر تضیی اثر کو عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جریان خون بعض اوقات مضطرب ہوتا ہے اور بہت دیر تک موجود رہتا ہے۔ کئی ایک مثالوں میں نرف جہلک بھی ثابت ہوا ہے۔ جریان خون کے مقام کا بعد الموت امتحان پر بھی معلوم کرنا اکثر آسان نہیں ہوتا۔ بہت سی حالتوں میں جریان خون کا مقام فاصل پر انفی ٹوک سے لے انچ اوپر اور پیچھے واقع ہوتا ہے۔

ان حصوں کی عصبی رسد شمی عصب (olfactory nerve) اور پانچویں عصب کی


پہلی اور دوسری قسموں سے آتی ہے۔ غرائش اور اشیاء کے نقصوں میں داخل کرنے سے جو تدبیر اکثر پیدا ہوتا ہے اسکی توضیح اس امر سے کیجا سکتی ہے کہ اس کہفہ کے کچھ حصہ کو انفی عصب جو مینی تنے (ophthalmic trunk) کی ایک شاخ ہے بکثرت رسد پہنچاتا ہے۔ عصبی قوت کے سمت مخالف میں منتقل ہونے کی مثال ان حالتوں میں دیکھی جا سکتی ہے جنہیں آنکھوں پر سورج کی تیز روشنی پڑنے سے جھپٹکیں آنے لگتی ہیں۔ جن تکلیفوں مثلاً کمانسی اور شعبنی دمہ میں مرکز تائیہ (vagal centers) پر اثر ہوجاتا ہے وہ انفی کہفہ جات کے عوارض کے بعد بھی پیدا ہوتی ہیں اور ان تکلیفوں سے نجاتی شہ کے اوپر کی غٹلے منالعی کی کی (cauterization) اور تعدیم حس (anaesthetisation) سے نجات حاصل کیجا سکتی ہے۔ شمی اعصاب (olfactory nerves) اس کہفہ کے بالائی ایک تہائی حصہ میں موجود ہوتے ہیں۔ اسلئے ارادۂ سو گھنے میں آدمی ناک کے راستہ سے ہوا زور سے اندر کو کھینچتا ہے اور نقصوں کو قمع کر لیتا ہے۔ جبھی شکل میں نقصوں کو پھیلانے کی عدم استطاعت سے شامہ کے جزوی فقدان کی جو بعض اوقات ایسے مریضوں میں دیکھنے میں آتا ہے توجہ ہو سکتی ہے۔ سر کی چوٹ سے پیدا شدہ عدم الشامہ (anosmia) یا نقصان شامہ بعض اوقات شمی عصبی ریشوں کے اس مقام پر پھٹ جانے سے ظہور پذیر ہوتا ہے جہاں یہ غربالین سوراخوں (cribriform foramina) میں سے گزرتے ہیں۔ شمی جڑیں عظم و قوی کے اجنبہ صغیر کی کور پر سے گزرتی ہیں اور اسلئے پیشانی کے بل گرنے میں انکو ضرر پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ شمی مرکز ہپوکیمپی تزرید (hippocampal gyrus) میں واقع ہوتا ہے۔

انفی حفرہ جات کے عروق لمف پس بلعومی غد میں داخل ہوتے ہیں جو بلعوم

کے پیچھے عضلہ مستقیمہ راسیہ کبیر مقدم (rectus capitis anterior major) کے سامنے واقع ہوتے ہیں۔ اسلئے جیسا کہ فرینکل (Fränkel) نے بیان کیا ہے۔ ”پس بلعومی غراج ناک کے مرض سے نتیجۂ پیدا ہو سکتا ہے۔“ دوسرے عروق لمف زیر قنکی، کمنی، اور بالائی عمیق عنقی لمفی غد میں جاتے ہیں۔ مزید برآں ناک کے عروق لمف اسحمیہ کے عروق لمف سے بھی غربالین معصر (cribriform plate) کے راستہ سے ربط رکھتے ہیں۔

انفی اجواف (nasal sinuses) زیادہ حال میں ناک کے معین اجواف کی

تشریح اور انکے تعلقات کا علم مرجن کے لئے نہایت ہی عظیم الٰہیت ہو گیا ہے۔ لندن ہسپتال (London Hospital) میں جن موضوعات کا امتحان کمرہ تقطیع میں کیا جاتا ہے انہیں تقریباً ۱۵ فیصدی میں ان اجواف میں سے ایک یا دو اجواف کا مرض پایا جاتا ہے۔ سرسینٹ کلیر تھامسن (Sir St. Clair Thomson) نے یہ اندازہ کیا ہے کہ معمر اشخاص میں ۳۰ فیصدی میں وتدی جوف



شکل ۲۹۔ جہی اور فکی اجواف کی سطحی ترسیم۔

۱۔ انفینہ سے ٹم اوپر۔ جب فوق مجری حاشیہ پر وسطی اور بیرونی ایک تہائی حصوں کے مقام اتصال پر۔ ج زیر مجری حاشیہ پر وسطی تاجہ کی بیرونی طرف پر۔ ۵۔ ماضی فراز کے مرکز پر۔ ج بیرونی حاشیہ کی سیدھیں۔ ۴۔ دوسرے مقدم طامنہ پر۔ ۳۔ آخری طامنہ پر۔ ۱۔ اور ج اور انفینہ جہی جوف کے سطحی محل کو ظاہر کرتے ہیں! اور ج ۵، ۴، ۳۔ فکی جوف کے سطحی محل کو۔

مرغ کا محل ہوتا ہے۔ معین اجواف۔ فکی، جہی، وتدی اور مصناتی۔ کی مجموعی گنجائش انفی کہنے کی دو چہ گنجائش سے زیادہ ہوتی ہے (Braune: برون)۔ انکے فوائد کی اطمینان بخش توضیح نہیں کی جاسکتی، سوائے اسکے کہ یہ وزن میں زیادتی کے بغیر چہرہ کے حجم میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر جیمز ایڈم (Dr. James Adam) کا خیال ہے یہ شہق کی ہوا کو گرم کرنے اور مرطوب بنانے میں مدد دیتے ہیں۔

جہی جوف (frontal sinus) کی جسامت اور شکل نہایت اختلاف پذیر ہوتی

ہے۔ شکل ۲۹ میں جو سطحی نشاندہی ظاہر کی گئی ہے اس سے اسکا اوسط نوناظر ہوتا ہے جو بالعموم میں

پایا جاتا ہے۔ جہی انفی قنات کا فتمہ یا قمع شکل ۲۸ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ عظیم الجسم جہی اجواف کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ مقطب (glabella) اور فوق ہڈی فرانتا (superciliary eminences) کے اوپر بڑے بڑے خارجی ارتفاعات بھی موجود ہوں۔ بعض اوقات ایک جوف دوسرے جوف کے صرف پر زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور درمیانی فاصل اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف کو ایک ترچھے رخ میں واقع ہوتا ہے۔ دایاں جوف اکثر اوقات زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ جہی جوف



شکل ۳۰۔ جہی جوف کی شکل اور اسکے ان تعلقات کو ظاہر کرتی ہے جو مجمر کی چمٹ سے ہیں۔ مزید برآں یہ کلی مغارہ کی شکل کو بھی ظاہر کرتی ہے۔

کی شکل جیسا کہ پیش سپین تراش (شکل ۳۰) میں دکھائی دیتی ہے حرن ایل (L) کی سی ہوتی ہے۔ اسکا انفی جارحہ مجمر کی چمٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ امران عملیہ جات کے سلسلہ میں جو اسکی مزمن عفونت کی حالت میں اسکو مسدود کر نیچے لئے تجویز کئے گئے ہیں اہمیت رکھتا ہے۔ مردوں میں عورتوں کی نسبت یہ جوف بڑے ہوتے ہیں۔ ۹ فیصدی واقعات میں یہ ایک طرف اور ۷ فیصدی میں دونوں طرف بھی غائب ہوتے ہیں (لاگن ٹرنر: Logan Turner) یہ ظاہر ہے کہ جہی جوف پر منخفص کسز بھی کہفم کو نقصان پہنچائے بغیر واقع ہو سکتا ہے۔ ایسی حالتوں میں جوف کے گارڈھے مشمولات کو غلطی سے یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ مصیبت نکل گیا ہے۔ چونکہ اجواف کو ناک کے ساتھ ربط و راہ حاصل ہے اسلئے

دیوار جوف کے کمرے بعض اوقات بہت سافناض (emphysema) پیدا ہو جاتا ہے۔ گاہے گاہے ان کہف جات میں حشرات، سرورے (larvæ) اور دیدان (maggots) بھی پائے گئے ہیں۔ سن طفولیت کی ابتدا میں جبھی جوف صرف ایک غنچہ سی یا ایک ناقص النمو ساخت ہوتی ہے۔ تقریباً چھٹے سال میں غنائے محاطی کا یہ غنچہ فرجہ (hiatus) کے مقدم سرے کے قرب و جوار سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسکا بڑھتا ہوا سرا عظم جبھی کے ڈپلوئی (diploë) میں گس جاتا ہے اور اندرونی عظمی لوح کو بیرونی لوح سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ تقریباً پچیسویں سال میں یہ اپنی پوری جسامت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بروں بالید کی ڈنڈی جبھی انفی قنات (fronto-nasal duct) بجاتی ہے یہ جوف کے موخر حصہ سے آتی ہے۔

یہ قنات پہ انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور نیچے کی اور ذرا سی پچھے کی طرف کو اگر نیم فری فرجہ (hiatus semilunaris) کے مقدم سرے پر یا اسکے قریب ہی کھل جاتی ہے فرجہ (hiatus) کے راستہ سے جبھی جوف کا افراز مغارہ (antrum) میں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا جبھی جوف کے مزمن تفتیح کی حالتوں میں یہ کہفہ ایک چوکی کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے (شکل ۲۸)۔ جبھی انفی قنات (fronto-nasal duct) اکثر پیچدار ہوتی ہے اور وسطی متول (middle turbinate process) کی چوکی کو دور کر دینے کے بعد جبھی اس میں نیچے سے کنتھیر گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ لہذا انسداد کی حالت میں جبھی جوف پر منقطب (glabella) کے مقام پر یا مجر کے فوقانی اندرونی زاویہ پر تر فان کیا جاتا ہے (ٹلی: Tilley)۔ اور ایک سلائی نیچے کی اور تسبقدر پچھے کی طرف کو گزار دیا جاتی ہے تاکہ جوف کی سیلیت ناک میں ہو۔

مقدم مصغاتی غلیات عام طور پر جبھی انفی قنات میں کھلتے ہیں اور اسلئے جبھی جوف کے ہر مرض سے یہ بالعموم متاثر ہو جاتے ہیں۔ عظم جبھی کے ڈپلوئی کی ورید (frontal diploic vein) جو فوقی مجری کٹاؤ پر جبھی ورید (frontal vein) سے مل جاتی ہے جبھی جوف سے خون وصول کرتی ہے۔ جبھی استیج کی حالتوں میں سرایت ڈپلوئی (diploë) کے ذریعہ سے عظم جبھی میں تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ اور ایک قسم کا مخرب التهاب عظم (osteitis) اور التهاب بحایہ (meningitis) پیدا ہو جاتا ہے۔

دتدی جوف (sphenoidal sinus) فوقانی شنجہ کے پچھے دتدی مصغاتی

گوشہ میں کھلتا ہے (شکل ۲۸)۔ یہ زندگی کے اسی حصہ میں نمودا ہوتا ہے جس میں کہ جبھی جوف - یہ گہرا

129

واقع ہوا ہے اور جب آپس میں مرض پیدا ہو جائے تو اس تک بہت آسانی سے رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس میں نرسن نفیج جو ناک کی سرایتوں سے پیدا ہو جاتا ہے اکثر پایا جاتا ہے۔ اسکی مقدم دیوار کا قاعہ جو مقابلہ پتلی ہوتی ہے مقدم قحفنوں کے زیرین حاشیہ سے ۷ اور ۸ سنٹی میٹر کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹلی (Tilley) اس امر کا مشورہ دیتا ہے کہ وسطی عظم مفیول کے زیرین کنارے کو جوف ہندی کے قحفہ کا رہنما تصور کرنا چاہئے۔ انفی قاعل (nasal septum) بھی اس کے لئے ایک معتبر رہنما ہے۔ کیونکہ اسکا میکسی حصہ (vomarine part) ان اجواف کی مقدم دیوار پر مقبب ہوتا ہے۔ اگر مقدم قحفنوں کے فرش سے اس نقطہ کی طرف ایک سلائی سیدھی گزار دی جائے تو یہ مذکورہ گہرائی (۷ تا ۸ سنٹی میٹر) پر اس جوف کے قحفہ پر پہنچ جائے گی۔

اس جوف کی باریک جانبی دیوار سے قریبی طور پر ملی ہوئی چند نہایت ہی اہم ساختیں ہوتی ہیں۔ کہنکی جوف اور اندرونی مسباتی شریان کے علاوہ بصری عصب اور پانچویں عصب کی دوسری قسمت اس سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ اور انکے التهاب جوف (sinusitis) میں متاثر ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے (فصل ۳۳ صفحہ ۱۴۰)۔ چھت پر جسم نخامی ہوتا ہے۔ اس جسم کے سلعات بعض اوقات اس جوف پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسکی وریدیں مصفاقی وریدوں میں ملتی ہیں۔ ان اجواف کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں۔ اور آسانی سے منتبب ہو جاتی ہیں جیسا کہ ایک واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے جو لندن ہسپتال (London Hospital) میں ہوا۔ ایک آدمی ٹھوکر کھا کر گرا۔ اور اسکی چھتری کا سراسر اعضا حاک کے اوپر چہرے میں گس گیا۔ وہ ہسپتال میں چل کر آیا اور تین دن بعد فوت ہو گیا۔ چھتری کی شام جسہ (pons) میں مدفون پائی گئی۔ اور اسکا سر فکی اور وندی اجواف میں سے گزر گیا تھا۔

فکی جوف (maxillary sinus) (مغارہ ہائی مور antrum of Highmore: (شکل ۳۰) بوقت پیدائش موجود ہوتا ہے مگر بڑھاپے میں اسکے ابعاد عظیم ترین ہوتے ہیں۔ جن افراد میں غدودہ کی شکایت موجود رہی ہو ان میں اس جوف کی بالیدگی ناقص رہ جاتی ہے۔ اسکی سطحی تزیین جو اسکے محل کو چہرے پر ظاہر کرتی ہیں شکل ۲۹ میں دیکھی ہیں۔ اس کہنکی دیواریں بچوں میں بالوں کی نسبت زیادہ موٹی ہوتی ہیں۔

اس میں مختلف قسم کے سلعات پیدا ہو سکتے ہیں جن سے اسکی دیواریں مختلف جہات میں متمد ہو جاتی ہیں چنانچہ بالی پتلی اندرونی دیواریں سے ٹکرا ناک پر حملہ کر دی ہے۔ اور اس

کہف کی چمت کو اوپر کی طرف دھکیل کر مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے (دیکھو شکل ۲، صفحہ ۱۱۷) اور یہ جوف کے فرش میں سے گزر کر منہ میں مداخلت کرتی ہے اور جوف کی مقدم دیوار میں سے جو سیکر پٹلی ہوتی ہے نکل کر محال میں آ جاتی ہے۔ اس جوف کی دیوار کا کثیف ترین حصہ وہ ہے جو عظم العارض سے علاقہ رکھتا ہے اور یہ دبنا نہیں۔ بالیدوں کا میلان پیچھے کی طرف براہنے کی طرف نہیں ہوتا۔ اگرچہ بعض اوقات وجہی (zygomatic) اور جینیمی فکی (pterygo-maxillary) حفرہ جات بھی حملہ آور ہوتی ہیں۔ چونکہ زیر مجھری (infraorbital) عصب اس جوف کی چمت کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے اور اوپر کے دانتوں کے اعصاب بھی اسکی دیواروں سے تعلق رکھتے ہیں اسلئے اس سے پیدا شدہ بالیدوں کا دباؤ ان ساختوں پر پڑتا ہے اور اس طرح چہرہ اور دانت کا وجع العصب پیدا ہو جاتا ہے۔

تشریحی نقطہ نگاہ سے مغارہ کی سیلیٹ یا اسکا استقصاء یا تو دوسرے ضاحک کے اوپر جہاں ہڈی پٹلی ہوتی ہے ایک مٹھی مٹی کی گرد عظمی دامن معکوس کر لینے کے بعد سوراخ کر دینے سے یا ایک ڈاڑھ محال کر اسکے سوراخ کو جو مغارہ میں رہ جاتا ہے بڑا کر دینے سے کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ ڈاڑھوں کے اور ضاحک دوسری ڈاڑھ کے اندرونی سنحات یا تو جوف کے کہف میں پیچھے ہوتے ہیں یا اسکے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مگر مزاولت جراحی میں انہیں سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس طرح مغارہ اور منہ کے درمیان جو جراثیم سے معمور ہوتا ہے ربط پیدا ہو جانے سے قبل الذکر میں منلوہ مسرات ضرور پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح مغارہ کا مرض برقرار رہتا ہے۔ چونکہ منہ کی نسبت ناک میں بہت کم امراض یا خود عضویہ جات موجود ہوتے ہیں اسلئے سیلیٹ کے راستہ کے اسی کا انتخاب کرنا چاہئے۔ مزید برآں اس طریقہ سے قیمی مادہ نگاہ نہیں جاتا اور سانس کے ساتھ اندر نہیں جاتا مگر منہ میں سیلیٹ کرنے کی حالت میں اس سے احتراز نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ یہ ایک جزو لا ینفک ہے۔ اگر ناک میں سے مغارہ میں کو چا لگانا ہو تو انفی منظار داخل کرنے کے بعد ایک مینل (trocar) تحتانی عظم مفتول کے نیچے سے اسکے طول کے وسط پر زیر نظر گزارنا چاہئے اور اسکے پسیدہ قاعدہ کے نیچے جتنا انچی ممکن ہو لیجانا چاہئے۔ یہاں پر ہڈی بہت پٹلی ہوتی ہے اسلئے مینل تیزی کے ساتھ ٹھونک دینے سے مغارہ کے کہف کے اندر چلا جائیگا۔

یہ جوف اپنے مقدمہ اور بالائی صعد پر اکثر جہمی جوف سے بھی ربط رکھتا ہے۔ شکل ۲، سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مغارہ جات حکم (palate) کے لیول سے بھی نیچے اتر جاتے ہیں۔ اور ان کی

131

مسیلیت ایسے فتمہ سے جو تنک کے لیول کے اوپر بنایا جائے بخوبی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ناک میں ان کی موثر طور پر مسیلیت کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو سوراخ مذکورہ سابقہ طریقہ سے جیمل (trocar) سے کیا جائے اسکو بڑا کر کے نیچے کی طرف کو بڑھا دیا جائے۔

فکی جوف کا فتمہ شکل ۲۸ و ۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ اس کہف کی چھت کے لیول پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس کہف میں پیپ موجود ہو تو اسکی مسیلیت صرف اسی حالت میں سب سے زیادہ ہوگی جبکہ سر کو پھیر کر اس حالت میں رکھا جائے کہ ماؤف کو تنک سب سے اونچی رہے۔ جب سر آگے کی طرف کو جھکا ہو تو تندی جوف نہایت آسانی سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور جبھی جوف اس وقت خالی ہوتا ہے جبکہ سر نیچے کی طرف ڈال دیا جائے۔ اگر تھناتی منفذ بڑا ہو یا نابی حفرہ (canine fossa) زیادہ واضح ہو تو اس مغارہ کا کہف چھوٹا ہوتا ہے۔

ان اجواف کے عروق لمف کی مسیلیت پس بلعوی غد میں ہوتی ہے ایک موقع پر گرنے سے اوپر کا ایک دانت مغارہ میں بالکل گھس گیا تھا اور نظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ایک واقعہ میں ایک بالائی ثنیہ اس حادثہ کے ساڑھے تین سال بعد جس سے یہ اندر گھس گیا تھا مغارہ میں آزاد پایا گیا۔

بافتہ

چہرہ

132

(FACE)

چہرہ کے جن حصوں کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے انکے علاوہ دوسرے حصوں کا بیان مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت کیا جائیگا۔

- ۱۔ چہرہ عمومی حیثیت سے
- ۲۔ خطہ کفیبہ (parotid region)۔
- ۳۔ اوپر اور نیچے کے جبڑے اور انکے متعلقہ حصے۔
- لبوں کا ذکر کہفہ دہن کے ساتھ آئیگا (باب ہشتم)۔

چہرہ عمومی حیثیت سے

چہرہ کی جلد پتل اور نازک ہوتی ہے۔ مگر اس میں دُہنی اور سرتی غد دہیت کثرت سے موجود ہوتے ہیں۔ اسلئے اس پر اکثر شکیل (acne) نکل آتے ہیں۔ جلد کے پتلے ہونے اور کشیف رد اول کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہی خراجات کا منہ بالمعوم جلد ہی بنجاتا ہے اس لئے یہ شاذ و نادر ہی بڑی جسامت اختیار کرتے ہیں۔

چہرہ کی زیر جلدی خلوی بافت نازک اور ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے۔ اور

پھیلنے والی در ریز شدوں سے آسانی ماؤف ہو جاتی ہے۔ لہذا انتہاب کی حالت میں بعض اوقات بہت سا ورم نمودار ہو جاتا ہے اور عمومی استسقا میں چہرہ کی اور خاص کر نیچے کے پوٹوں کی ڈھیل بافت کی پھولن ایک نمایاں اور ابتدائی مظہر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ٹھڈی کے اوپر کی جلد خاص طور پر بستہ ہوتی ہے اور نیچے کے حصوں سے منضم ہوتی ہے اور بہت سے لحاظات میں یہ چاندلی کی جلد سے بہت قریبی مشابہت رکھتی ہے۔

وجہی بافتوں کی حرکت پذیری چہرہ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ اسپر تر قیعی عملیہ جات کا میاہی سے کیئے جاسکیں۔ اور انکی کثرت عروق کی وجہ سے مربع اور مکمل اندمال بالعموم نقیبی ہوتا ہے۔ شحمی سلعات چہرہ پر شاذ و نادر ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں اگرچہ اسکی زیر جلدی بافت میں بہت سا شحم موجود ہوتا ہے۔ اور فی الحقیقت علوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سلعات اس خط سے احتراز کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈینے (Denay) نے ایک آدمی کے متعلق اطلاع دی ہے جسکے جسم پر ۲۱۵ شحمی سلعات تھے مگر چہرہ پر ایک بھی نہیں تھا۔ لیکن پیشانی پر شحمی سلعات قلیل الوقوع نہیں۔

چہرہ پر بعض قروح مثلاً قارض (rodent) اور ذبی قروح (lupus ulcers) کے پیدا ہونے کا خاص امکان ہوتا ہے۔ اور اس پر قایقہ خبیث (malignant pustule) راجحہ (anthrax) کا حکم نہایت کثرت سے ہوتا ہے۔

چہرہ پر بعض ارتقاعات موجود ہیں مثلاً ٹھڈی۔ عظم خدی اور پیشانی۔ ان پر کسی کند آکے سے چوٹ لگنے یا انجھل کرنے سے ایسا زخم پیدا ہو سکتا ہے جسکے کنارے صاف طور پر کٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ زخم بعینہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس طرح چاندلی پر پیدا ہوتا ہے۔

عظم العارض (malar bone) اس قدر محکم ہوتی ہے اور اسکے تعلقات مجسمہ سے اس قدر بلا واسطہ ہوتے ہیں کہ اسپر زور سے چوٹ لگنے سے ارتجاج (concussion) پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لمبی نازک ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہے اسلئے اسیں کسر شاذ و نادر ہی واقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ فی الحقیقت فک (maxilla) میں محسوس ہوتی ہے اور اس ساخت میں وسیع کسر پیدا کر دیتی ہے اور خود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ عظم عارضی کے کسر سے بعض اوقات محجر کا کدم (ecchymosis) پیدا ہو جاتا ہے جو اسی کدم سے مشابہ ہوتا ہے جو کوپری کے

قاعدہ کے کسر میں پایا جاتا ہے۔

رسد خون۔

عرق حرکی اعصاب کی رسد جو فو قانی عنقی عقدہ سے آتی ہے خاص طور پر افراط سے موجود ہوتی ہے۔ لہذا جذبہ کی حالتوں میں چہرہ آسانی سے سرخ بھی ہو جاتا ہے اور نیز اسکی رنگت بھی اڑ جاتی ہے۔ شراب خوار اشخاص میں اور ان لوگوں میں جو سردی میں زیادہ رہتے ہوں اور رسد دوران خون کے مریضوں میں جنہیں اسناد خواہ قلبی عرقی تغیرات سے پیدا ہوا ہو یا بعض جلدی امراض سے جلدی بذیرے اکثر مستقل طور پر محقق رہتے ہیں۔ وحمت (naevi) اور مختلف اقسام کے ناخط سلعات چہرہ پر عام طور پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ رسد خون کے بافراط موجود ہونے کی وجہ سے چہرہ کے زخموں سے اگرچہ انکے لگنے کے وقت جریان خون بکثرت واقع ہوتا ہے مگر یہ بے نظیر سرعت سے خشک خشک طور پر مندمل بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے زخموں کے کناروں میں دل ول اول ہی صحیح صحیح مطابقت پیدا کر دینے سے ندبہ کی زیادہ پیدائش کے بغیر ہی بالعموم مکمل اندمال واقع ہو جاتا ہے۔ جلد کے وسیع دامنوں کی حیویت جو دریدہ زخموں میں جلد کے پھٹنے سے بجاتے ہیں تقریباً اسی طرح ہی نمایاں طور پر قائم رہتی ہے جس طرح کہ چاندلی کے اسی قسم کے دامنوں کی۔ چہرہ کے وسیع ضررات جنہیں بہت سی ساخت ضائع ہو گئی ہوا اکثر حیرت انگیز طریقہ پر مندمل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ان ترقیبی وجہی عملیات سے ظاہر ہوتا ہے جو جنگ عظیم کے زخمیوں پر کئے گئے تھے۔ وجہی شریان کے نبضانات جبڑے کے زیرین کنارے پر جہاں عضلہ مضغنیہ (masseter)

134

muscle) کے مقدم کنارے کے عین سامنے سے گزرتی ہے بہترین طور پر محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ یہاں یہ صرف جلد اور عضلہ منتشرہ (platysma) سے ہی پوشیدہ ہوتی ہے اور ہڈی پر باسانی مضبوط کیجا سکتی ہے اور اسپر بندش بھی لگائی جاسکتی ہے! اس شریان کے تقلمات چہرہ پر اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ اسکو کاٹنے کے بعد دونوں سروں کا باندھا ضروری ہوتا ہے۔


وجہی ورید شریان کے ساتھ صرف جبڑے کے زیرین کنارے پر ہی ملی ہوتی ہے۔ اور چہرہ پر یہ اس سے معتد بہ فاصلہ پر ہوتی ہے۔ یہ ورید اتنی ڈھیلی ڈھالی نہیں ہوتی جتنی کہ اکثر سطحی وریدیں ہوتی ہیں۔ کاٹنے کے بعد یہ زیادہ متفتح رہتی ہے۔ اس میں مصاریع نہیں ہوتے، اور ایک سرے پر یہ کھنکی جوف سے بلا واسطہ طور پر ربط رکھتی ہے اور دوسرے پر گردن میں اندرونی سباتی ورید سے۔

مزید برآں یہ درون جمجمی وریدوں سے بھی ربط رکھتی ہے اگر یہ اتنا براہ راست نہیں ہوتا۔ اور یہ ربط یوں ہوتا ہے:- وہی ورید عمیق وہی ورید (deep facial vein) کو وصول کرتی ہے جو جنامی ضغیرہ سے آتی ہے! اور یہ ضغیرہ کہنکی جوف سے چند چھوٹی چھوٹی وریدوں کے ذریعہ سے جو سوراخ بیضوی (foramen ovale) اور سوراخ دریدہ وسطی (foramen lacerum medium) کی یعنی بافت میں سے گزرتی ہیں ربط رکھتا ہے۔ جبھی ورید کے ان تعلقات سے چہرہ کی بعض التہابی سرائتوں سے موت واقع ہونے کی توجیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ چہرہ کے شب چراغ (carbuncle) یا کسی دوسری منتشر اور عمیق التہابی حالت سے (جو خاکسک بالائی لب کی ہوا اور جناح الانف کے قرب و جوار میں ہو) دماغی اجواف میں بعض اوقات ہلک علقیت پیدا ہو جاتی ہے۔

چہرہ کے نمونہ کا حوالہ دینے سے پانچویں عصب کی تقسیم اور بعض غیر طبی حالتوں مثلاً ترگوشی لب (hare-lip) کبر الفم (macrostoma) وغیرہ کی توضیح میں مدد ملے گی۔ یہ پانچ

135 **زائندوں سے نمونایا ہے۔ ایک وسطانی یا جبھی انفی (fronto-nasal) جو ہر ایک طرف موجود ہوتا ہے اور ایک فکی (maxillary) اور ایک چانوی (mandibular) جبھی انفی زائندہ پر دو چھوٹے چھوٹے جانبی ارتفاعات پیدا ہو جاتے ہیں جو گلوبجہ نما زائندے کہلاتے ہیں! انکے درمیان ایک مثلث رقبہ یعنی انفی میدان (nasal field) ہوتا ہے۔ اس سے آئندہ چکر ناک کا بانسا طیار ہوتا ہے۔ ہر ایک گلوبجہ نما زائندہ (processus globularis) کی جانب پر ایک نشیب یعنی انفی گڑھا (nasal pit) ہوتا ہے! سطح جبھی انفی زائندہ (fronto-nasal process) تین حصوں پر تقسیم ہو جاتا ہے یعنی دو جانبی انفی زائندے اور ایک وسطانی زائندہ جبہ دو گلوبجہ نما یا وسطانی انفی ارتفاعات موجود ہوتے ہیں۔ یہ بڑھتے بڑھتے سلاخوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے اور فکی زائندے سے متحد ہو جاتے ہیں جیسا کہ شکل ۳۱ و ۳۲ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ انفی میدان (nasal field) مرتفع ہو جاتا ہے اور اس کے بالائی حصہ سے ناک کی پشت طیار ہوتی ہے اور اسکا زیریں حصہ بڑھتے بڑھتے انفی فاصل کاستونجہ (columella) بن جاتا ہے۔ لب کا نثرہ (philtrum) اور پیش فک (premaxilla) گلوبجہ نما زائندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ وسطی خط پر متحد ہونے سے بنتے ہیں۔ اسکے بعد چہرہ پہلے چانوی زائندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے اور پھر ہر ایک طرف فکی زائندہ کے چانہ اور جبھی انفی زائندہ کے کچھ حصوں کے ملنے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ فک اور جانبی انفی زائندہ کے مقام اتصال سے جناح الانف (ala nasi) طیا**

ہوتے ہیں۔ نثرہ (philtrum) (جو گلوبچہ نمایا وسطانی انفی زائیدوں کے اتحاد سے پیدا ہوتا ہے) اور فک کے عدم اتحاد سے جانبی خرگوشی لب (lateral hare-lip) پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ناک اور فک کے نہ ملنے سے وہی درز (facial cleft) پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فک اور چانہ کے غیر مکمل اتحاد سے کبر النعم (macrostoma) پیدا ہوتا ہے۔ اگر جہی انفی زائیدہ (fronto-nasal process) کا نمو واضح نہ ہو تو سائیکلوپس (cyclops) کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اسکے ساتھ یا نچوں عصب کی ایک شاخ یعنی انفی عصب آتا ہے۔ یا نچوں عصب کی دوسری قسمت فکی زائیدہ کا عصب ہے اور



شکل ۳۱-۸ ملی میٹر مضغہ کا چہرہ۔
(ہس His اور مک مورچ McMurich کے مطاب)۔
تیسری قسمت چانوی زائیدہ کا۔


عصبی رسد۔ چہرہ پر اعصاب بکثرت پائے جاتے ہیں یا نچوں عصب حسی

اور جہی عصب حرکت ہے (شکل ۲ صفحہ ۱۱)۔ چہرہ پر کثیر التعداد عصبی ریشکوں کے موجود ہونے اور یا نچوں عصب کے وسیع حسی نوات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ پر شدید خراش اور حوال کے اثر کر نیسے ایک وسیع عصبی فعل کے ظہور پذیر ہونے کا احتمال ہوتا ہے (شکل ۳۲ صفحہ ۱۴۳)۔ ڈاکٹر جارج جاکسن (Dr. George Johnson) ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے جس میں زخار کے ایک ندبہ میں حقیق کے ایک ٹکڑہ کے مدفون ہونے سے وہی وجع العصب (facial neuralgia) اور جھجھل (facial

(paralysis اور فک بستگی (trismus) پیدا ہو گئے تھے اور صرع کے حملے خود کر آئے تھے۔

۱۔ حسی رسد

پانچواں یعنی سہ توامی (trigeminal) عصب جس (pons) کی



شکل ۳۲ چہرہ کے ان حصوں کو ظاہر کرتی ہے جو انفی فکلی اور چانوی زائدوں

سے بنتے ہیں۔
(From Keith's "Human Embryology and Morphology")

تحتانی سطح سے نکلتا ہے اور اسکی دو جڑیں ہوتی ہیں جنہیں سے ایک بڑی حسی ہوتی ہے اور دوسری چھوٹی حرکتی۔ یہ جڑیں آگے اور باہر کی طرف کو بڑا حکم کویری کے موخر حفرہ میں چلی جاتی ہیں۔ اور خیمۃ الدماغ (tentorium cerebelli) کے عین نیچے اور جس مقام پر یہ عظم حجری کے بالائی زائو سے چسپیدہ ہوتا ہے اسکے قریب ہی ام جانیہ کو منتقب کرتی ہیں۔ داخلی سمعی منفذ اور اس لئے ساتواں اور آٹھواں عصب بھی موخر حفرہ سے باہر نکلنے سے عین پہلے انکے نیچے اور پیچھے ہوتے ہیں۔ لہذا دماغ کے پیش زیرین حصہ پر جو سلعات پیدا ہوتے ہیں انکے دباؤ کے سہ توامی (trigeminal) عصب کی جڑوں پر پڑنے کا احتمال ہوتا ہے، جو کیفیت رجحان العصبیہ (hypo-aesthesia)

اور ناقص لمبھی معکوسہ (conjunctival reflex) کا باعث ہوتا ہے۔ مگر یہ حالتیں اتنی شدید نہیں ہوتیں جتنی کہ صادقہ توامی وجع العصب میں ہوتی ہیں۔

ام جافیہ کو منقبذ کرنے کے بعد جڑیں غار میگل (cave of Meckel) میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ غار ام جافیہ کے پھٹنے سے پیدا ہوتا ہے اور عظم تحریر کے راس پر واقع ہوتا ہے۔ یہاں پر سسی جڑ پھیل کر نیم قمری (semilunar) یعنی گیسری (Gasserian) عقدہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور عرق جڑ اس عقدہ کے نیچے سے آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر اس عصب کی تیسری یعنی چانوی قسمت سے متحد ہو جاتی ہے۔

138

میگل کے غار کے نیچے ہڈی کے اس صفحہ میں جس سے قنال سباتی کی چست عظم تحریر کے راس کے قریب بنتی ہے ایک نشیب ہوتا ہے۔ سر جن کے لئے اس امر کا خیال رکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ شاذ ذواتوں میں ہڈی کا یہ صفحہ غائب بھی ہوتا ہے۔

دوسرے قریبی علاقہ جات جنکو گیسری (Gasserian) عقدہ پر عملیہ کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) عقدہ کی اندرونی طرف پر کھنکی جوف کا موخر حصہ ہوتا ہے۔

(۲) باہر کی طرف وسطی سحانی شریان ہوتی ہے۔ اور اس عقدہ تک باہر کی طرف سے

رسائی کرتے وقت اس عرق کو سورایخ شوکی (foramen spinosum) میں کوئی موزوں چیز ٹھونس دینے سے سدود کر دیا جاتا ہے۔

(۳) اوپر کی اور باہر کی طرف صدغی و تدی لختہ (temporo-sphenoidal

lobe) ہوتا ہے۔

یہ عقدہ نیم قمری ہوتا ہے۔ مسی جڑ مقعر وسطانی جانب پر داخل ہوتی ہے اور عصب کور کی تینوں قسمتیں جانبی مدب طرف سے نکلتی ہیں۔ ان قسمتوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ام جافیہ کی ایک نلی جاتی ہے جو غار میگل (cave of Meckel) کی دیواروں سے نکلتی ہے۔ عیلمی (ophthalmic) یا پہلی قسمت کھنکی جوف کی بیرونی دیوار میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور فوقانی مجری یا تدی شقاق کے قریب انفی ادعی اور جہی تین شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کھنکی جوف میں تیسرا محرک العین (oculo-motor) عصب اور چوتھا کمری (trochlear) عصب اکٹھے عین اور واقع ہوتا ہے۔


فکلی (maxillary) یا دوسری قسمت حفرہ وسطی میں سے گزرتی ہوئی جوف کہنکی کے زیرین حصہ کے قریب سے آگے کی طرف کو چلی جاتی ہے اور کھوپڑی میں سے صلیب مدورہ (foramen rotundum) میں سے باہر نکل کر جنبی حنکی حفرہ (pterygo-palatine fossa) اور تحتانی مجری (inferior orbital) یا فکلی (spheno-maxillary) شقاق میں سے گزرتی ہے۔ اور پھر تحتانی مجری قنات میں داخل ہو کر چہرہ پر تحتانی مجری سوراخ پر نکل آتی ہے۔ پہلی قسمت کی طرح یہ بھی حسی ہوتی ہے۔

چانوی یا تیسری قسمت سوراخ بیضوی (foramen ovale) میں سے باہر نکلتی ہے۔ یہ زیادہ تر حسی ہوتی ہے۔ مگر اس میں مضمغی عضلات، چانی لامی (mylo-hoid) عضلہ اور دو ٹوٹکی عضلہ (digastric) کے مقدمہ شکم کی رسد کے لئے سر کی ریشہ جات موجود ہوتے ہیں۔ پانچویں عصب کی قسمتوں کے ذریعہ سے جو رقبہ جات حسی رسد پاتے ہیں وہ شکل ۲ صفحہ ۱۱ میں ظاہر کئے گئے ہیں۔ فوق مجری اور زیر مجری اور ذقنی سوراخوں کے محلات مندرجہ ذیل طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں۔ فوق مجری سوراخ فوق مجری حید کے اندرونی اور وسطی ٹٹوں کے مقام اتصال پر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ سے لے کر ایک سیدھا خط نیچے کی طرف کو ہر ایک جبڑے کے دونوں ضوا احک کے درمیان قریب سے گزرتا ہوا کھینچا جائے تو یہ زیر مجری اور ذقنی سوراخوں کو کاٹتا ہو اگر زیر مجری زیر مجری سوراخ مجر کے حاشیہ کے نیچے پہلے ایچ سے ذرا زیادہ فاصلہ پر واقع ہوتا ہے۔ ذقنی سوراخ بالغوں میں جو فیذہ اور جبڑے کے زیرین کنارے کے وسط پر واقع ہوتا ہے اور زیرین لب اور جبڑے کے درمیان فضا کے محاطی کا جوتہ انبان ہوتا ہے اس سے نیچے پہلے ایچ سے ذرا زیادہ فاصلہ پر ہوتا ہے۔ کسریں بلوغ میں یہ سوراخ فک کے زیرین کنارے کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور بڑھاپے میں یہ جو فیذہ کے پاس ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ذقنی سوراخ میں کوئی اشتراب کرنا مقصود ہو تو سوئی داخل کرتے وقت اسکا میلان ذرا نیچے اور آگے کی طرف کو رکھنا چاہئے۔ کیونکہ سوراخ کے نزدیک ہی قنات غیر متوقع طور پر اوپر اور نیچے کی طرف کو مڑ جاتی ہے۔

زیر مجری عصب وبع العصب میں اُس مقام پر کاٹ دیا گیا ہے جہاں

یہ چہرہ پر نکلتا ہے۔ اس تک یا تو خارجی ننگاف سے رسائی کی جاتی ہے اور یا رخسار اٹھا کر منہ کے اندر سے بعض حالتوں میں مجر کا فرش معرا کیا جا چکا ہے اور زیر مجری قنات (جس کے مقدمہ

نصف کی چیمٹ عظمی ہوتی ہے) کھول دی گئی ہے۔ اور اس طرح اس عصب کے تنے کے بڑے بڑے حصے کاٹ کر علیحدہ کر دئے گئے ہیں۔ و تدمی حنکی (spheno-palatine) عقدہ (عقدہ میککل : Meckel's ganglion) کو پانچویں عصب کی دوسری قسمت کے وجع العصب کی تنکین کے لئے اکڑ کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ زخار کے سامنے کے حصہ سے جلد کا ایک مثلث دامن کاٹ کر اوپر کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور زیر مجری سورخ معرا کر لیا جاتا ہے۔ مفارہ کی مقدم دیوار ترخان کے ذریعہ سے کھول لی جاتی ہے اور زیر مجری میزب کے فرش سے ہڈی کاٹ دی جاتی ہے۔ اس طرح اس قنال میں جو عصب موجود ہوتا ہے



شکل ۳۳۔ پانچویں عصب کی دوسری اور تیسری قسموں کی سطحی تزیین۔

140

وہ ابھی طرح سے سامنے آ جاتا ہے۔ اس عصب کا تعاقب پیچھے کی طرف کو مفارہ کی موخر دیوار تک کیا جاتا ہے۔ اس دیوار میں بذریعہ ترخان سورخ کرنے سے تدمی فکی (spheno-maxillary) (جنفی حنکی : pterygo-palatine) حفرہ کھل جاتا ہے اور عقدہ میککل (Meckel's ganglion) معرا ہو جاتا ہے (شکل ۳۳)۔ اس عقدہ کی اُٹھ طرف سورخ تدریجاً شناخت کیا جاسکتا ہے۔ زیر مجری شریان بھی عصب کے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے، اور یہ عرق معرا اپنی مقدم سنی (anterior dental) شاخ کے جوٹنایا اور انیاب کو آتی ہے غالباً کاٹ دیا جاتا ہے۔ زیر مجری شریان جنفی ضغیرہ (pterygoid plexus) میں ختم ہو جاتی ہے۔ عقدہ مذکور اندرونی فکی (internal maxillary) شریان کی انتہائی شاخوں سے محصور ہوتا ہے۔

اور یہ ایک مثلث شکل کا جسم ہوتا ہے جس کا قطر تقریباً ۱ انچ ہوتا ہے۔ باہر کی طرف سے یہ ذرا محدب ہوتا ہے اور اسکی زنگت سرخی مائل ہوتی ہے۔

جس عملیہ کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ویسے عملیات سے حصول کے تعلقات کا پتہ چلنے میں مدد ملتی ہے۔ گراب منزلات میں انکی جگہ اشترابات کے سادہ ذرائع اکثر اختیار کئے جاتے ہیں۔ عصب کے تنے میں انکھل مطلق داخل کرنے سے اسکے رقبہ تفرع میں عدم حیثت پیدا ہو جاتی ہے جو چھ ماہ تک یا اس سے زائد عرصہ تک کے لئے رہتی ہے۔ ایسے اشترابات کو کامیابی سے سرخام دینے کے لئے ان اعصاب کے محل اور عمر اور انکے ارد گرد کی ساختوں کے بہت صحیح علم کی ضرورت ہے۔ پانچویں عصب کی دوسری قسمت کا مشکل ۳۳ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر وجہ (zygoma) کے بالائی کنارہ پر عظم الملائن کے صعودی حاشیہ کے ۶ ملی میٹر (۱/۴ انچ) پیچھے ایک نقطہ لیا جائے تو یہ وندی فکی حفزہ (spheno-maxillary fossa) کے بالائی حصہ کے عین اوپر واقع ہوگا جس میں پانچویں عصب کی دوسری قسمت اور عقدہ میکل (Meckel's ganglion) ہوتا ہے۔ عصب تک پہنچنے کے لئے سوئی کو ۳۴ ملی میٹر (۱/۴ انچ) داخل کر دینا چاہئے۔ مجر کے فرش کے ساتھ ساتھ کا راستہ اس سے زیادہ آسان اور زیادہ بے خطر ہے۔ سوئی مجر کے تین کنارے کے نقطہ وسطی پر داخل کی جاتی ہے اور فرش کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف کو مڑے مہمی مستوی کے متوازی ہونک دی جاتی ہے۔ سوئی کو وندی فکی حفزہ (spheno-maxillary fossa) میں یہاں تک ہونک دیا جاتا ہے کہ یہ سورخ مدور پر یا اسکے گرد و نواح میں عظم وندی کے سامنے آنے سے آگے جانے سے رک جاتی ہے۔ مناسب دست و رزی سے سوئی سورخ مدور میں داخل ہوتی ہوئی محسوس کی جاسکتی ہے۔ مجر کے حاشیہ سے سورخ مدور ۳۳ ملی میٹر (۱/۴ انچ) کی گہرائی پر واقع ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس عصب تک وجہ (zygoma) کے بالائی کنارہ پر وندی زاویہ کے عین پیچھے اندر کی طرف سوئی داخل کرنے سے بھی رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ عقدہ سطح سے ۵۰ ملی میٹر (۲ انچ) کے فاصلہ پر واقع ہوتا ہے (Symington: سمنگٹن)۔

تحتانی سنی عصب (inferior dental nerve) دونوں نواک

کی ہڑاؤں کے مقابل فذی غنائے مغالی میں ننگاف دکر سورخ ذقنی (mental foramen) پر کاٹا جا چکا ہے۔ اس ننگاف میں سے عصب کا المصاب اور اسکے جلدی حصہ کا استیصال کیا جاسکتا ہے۔


یہ عصب چانوی (تحتانی سنی) سوراخ میں داخل ہونے سے پیشتر مندرجہ ذیل طریقہ پر کاما جا چکا ہے۔ منہ کو خوب اچھی طرح سے کھول کر آخری بالائی لائحہ سے لیکر آخری زیرین لائحہ تک اکیلین نس زائدہ (coronoid process) کے عین اندر کی طرف جسکے حدود جس سے واضح طور پر معلوم کئے جاسکتے ہیں ایک شکاف دے دیا جاتا ہے۔ یہ شکاف غشائے مخاطی میں سے گزرتا ہوا نیچے کی طرف عضلہ صدغیہ کے وتر تک پہنچتا ہے۔ اس شکاف میں انگلی داخل کر کے جڑے کی فرع (ramus) او عضلہ جنبیہ داخلہ (internal pterygoid muscle) کے درمیان سے گزار دیا جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ غظمی مقام محسوس ہونے لگتا ہے جو چانوی (تحتانی سنی: inferior dental) قنال کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں پر اس عصب کو ایک ہک کے ذریعہ سے اٹھا کر منفر د کر لیا جاتا ہے اور کاٹ دیا جاتا ہے۔

خدی عصب (buccal nerve) رخسار کی غشائے مخاطی اور جلد کو سرد پہنچاتا ہے۔ اور عضلہ بوقیہ (buccinator muscle) کی بیرونی سطح پر سے آگے کی طرف کو چلا جاتا ہے۔

پانچویں عصب کی تیسری قسمت کا تنا کھوپری کے حفرہ وسطی سے
سوراخ بیضوی میں سے باہر نکلتا ہے جسکا محل وجہ کئے برین کنرے کے اس حصہ کا متناظر ہوتا ہے جو فراز مفصلی (eminentia articularis) کے عین سامنے واقع ہوتا ہے (شکل ۳۳)۔ اس عصب کے تنے یا عقدہ گیسری (Gasserian ganglion) میں اشراق کرنے کے لئے میفر خوب اچھی طرح سے منہ کھولنے کے لئے دیا جاتا ہے تاکہ چانہ کا اکیلین نس زائدہ منخفض ہو کر راستے سے ہٹ جائے۔ اور پھر فراز مفصلی (eminentia articularis) کے ایک انچ سامنے سوئی داخل کر دیا جاتی ہے اور اسکو سیدھا اندر کی طرف اور کس قدر اوپر کی طرف غظم و تدی کی زیرین سطح کے بالمقابل لے جایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ ۳.۴ ملی میٹر (۱ ۱/۴ انچ) کی گہرائی پر پہنچ جاتی ہے۔ جب سوئی خارجی جنبی صفحہ (external pterygoid plate) کی بیرونی سطح سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو تو اسے اتنا پیچھے ہٹایا جاسکتا ہے کہ یہ اس صفحہ کے پچھلے کنارے پر سے مچسل جائے۔ اب پچھکاری کے نئی کو ذرا نیچے کی طرف دبانے سے سوئی کا سرا اور پرکار رخ اختیار کر لیتا اور اس لئے آگے بڑھ کر میکل (Meckel) کے غاریں داخل کیا جائیگا۔ اس طریقہ سے جسم عقدہ میں الجھل کا اشراق کیا جاسکتا ہے (دیکھو شکل ۳۵)۔

جب کوئی حسی عصب کاٹ دیا جاتا ہے تو اس سے پیدا شدہ

فقدانِ حواسِ درود کا رقبہ اسکے تشریحی تفرع کا متناظر نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب پانچویں مجہمی عصب کی عین (ophthalmic) قسمت کاٹ دیا جاتی ہے تو پیشانی کے اوپر کی جلد کی صرف ایک کم بختی بجھا رہے ہی جس کو مل طور برزائل ہوتی ہے حالانکہ تشریحی تفرع سے آدمی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ پیشانی اور



کرنے کی قوت بخشنے ہیں۔ (۲) وہ جو نخر مرضی حس پذیر (protopathic sensibility) کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ جلد کو کسی چیز کے چھنے اور ۲۰ درجہ ف سے نیچے کی تیش کے لئے حساس بناتے ہیں۔ (۳) وہ جو برناقد حس پذیر (epicritic sensibility) کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ریشے جلد کو ہلکے لمس (جسکا امتحان کسی ایسی چیز سے جیسی کہ روئی ہے کیا جاتا ہے) اور تیش کے زیادہ دقیق درجوں کو محسوس کرنے کی قوت بخشنے ہیں۔ اکثر مثالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب عصب کاٹا جاتا ہے تو برناقد (epicritic) حس پذیر کی فقدان اپنی وسعت میں عصب کے تشریحی تفرع کا متناظر ہوتا ہے۔ جب نیم قمری یا گیسری (Gasserian) عقدہ دو کیا جاتا ہے (دیکھو شکل ۲ اور ۳) تو برناقد (epicritic) حس پذیر کی فقدان رقبہ تفرع کا متناظر ہوتا ہے مگر نخر مرضی (protopathic) حس پذیر کی فقدان تشریحی رقبہ سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو نخر مرضی (protopathic) ریشہ جات دوسرے عصب سے نکلتے ہیں (شکل ۳۲) وہ جلد کے اُس رقبہ تک بھی پہنچتے ہیں اور اسکو رسد بھی پہنچاتے ہیں جسکو برناقد (epicritic) حس پذیر یا پنچوں عصب سے حاصل ہوتی ہے۔ پھرے کے یرین حصہ میں ان رقبہ جات میں کوئی ترکیب نہیں پایا جاتا ہے۔ پنچوں عصب کی ذقنی (mental) شاخ میں برناقد (epicritic) اور نخر مرضی (protopathic) ریشہ جات کا تفرع جلد کے ایک ہی حصہ پر پایا جاتا ہے۔ اسلئے کسی حسی عصب کے کٹنے سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں انکا انحصار ان ریشوں کی نوعیت پر ہوتا ہے جو اس عصب میں موجود ہوتے ہیں، اور نیز جلد کی اس وسعت پر ہوتا ہے جسپر ہر قسم کے عصب کا پھیلاؤ فروا پایا جاتا ہے۔ نیم قمری عقدہ کے استیصال کے بعد بھی چہرہ کی عمیق ساختیں دباؤ کیلئے حساس رہتی ہیں۔ اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عصب درجی میں بعض درآر ریشے موجود ہوتے ہیں جو دباؤ کے لئے حساس ہوتے ہیں (میلونی: Maloney اور کینیڈی: Kennedy)۔

گیسری (Gasserian) عقدہ کا استیصال۔ ناقابل برداشت اور دشوار علاج وجع العصب کے مریضوں کے لئے سرجن کو یہ اختیار ہے کہ وہ یا تو عقدہ میں الکحل کا شراب کر دے یا نیم قمری عقدہ کا استیصال کر دے، اور یا اسکی حسی جڑوں کو کاٹ دے۔ یہ پنچوں عصب کا حسی عقدہ ہے اور اُس حسی عقدہ کا متناظر ہے جو شوکی عصب کی موخر جڑ پر پایا جاتا ہے۔ اکٹھے استیصال پنچوں عصب کے عصبی ریشوں میں انحطاط لازمی طور پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جو علیہ بالعموم مراحم دیا جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے (دیکھو شکل ۳۵)۔


اومیگا (omega) کی شکل کا جلد کا ایک دامن اوپر اٹھایا جاتا ہے، اس دامن کے قاعدہ پر وجہ اور اس کے انحراب پر صدغی حید ہوتا ہے۔ بافتوں کو صدغی حفرہ کے فرش کی گہرائی تک الٹ دیا جاتا ہے سطحی اور عمیق صدغی عروق کا باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ فلیمان اور وتدی کے جناح کبیریں وجہ کے بالائی کنارہ کے لیول پر ایک عریض تر فانی فتح بنا کر ام جانیہ کو معرا کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وسطی سمائی عروق کو جو میدان عملیہ کو محور کرتے ہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ ام جانیہ اور صدغی وتدی لختہ کو جو اس کے اوپر واقع ہوتا ہے ہڈی سے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے پانچویں عصب کی



کے بہت قریب واقع ہوتا ہے۔ ہرچہ کہیں تلفیف جس میں شمی مرکز پایا جاتا ہے اس عقدہ کے میں اوپر واقع ہوتی ہے (شکل ۳۶)۔ جب جانی خلاف کھول دیا جاتا ہے تو دماغی شوکی سیال ہمیشہ نکلتا ہے (کشیگ: Cushing)۔

146

فراز مفصلی (eminentia articularis) جو وجہ کے قاعدہ پر واقع ہوتا ہے اس عقدہ کے محل کے لئے ایک کارآمد رہنما کام دیتا ہے۔ جب وسطی حفرہ کھول دیا جاتا ہے اور



شکل ۳۶۔ پانچویں اور دسویں جمجی اور پہلے اور دوسرے عصب کے حسی نواتات کی قربت کو ظاہر کرتی ہے۔

صدی نمونہ اوپر اٹھایا جاتا ہے تو یہ عقدہ لم ۲ انچ کی گہرائی پر اسی اکیلی مستوی پر چہر مفصلی فراز واقع ہوتا ہے پایا جاتا ہے۔ مگر یہ اس افراز سے زیادہ بلند لیول پر ہوتا ہے۔

ان مختلف اقسام کے دیر بعد کی حقیقت سمجھنے کے لئے جو اس کثرت سے ان رقبہ جات میں پایا جاتا ہے جن کو پانچواں عصب جو عظیم الجسامت ہوتا ہے رسد پہنچاتا ہے۔ اوجاع اعصاب

147

لے اس علم کی تشریح کی تفصیل کے لئے دیکھو سرجیکل ٹریٹمنٹ آف فیشل نیورلجیا (The Surgical Treatment of Facial Neuralgia) مصنفہ جے ایچس جونیر لندن ۱۹۰۷ء۔

در در شریقتہ وغیرہ — یہ ضروری ہے کہ اُن حسی نوات کے بعض مرکزی تعلقات سے واقفیت حاصل کی جائے جن پر اسکے دراز ریشہ جات ختم ہوتے ہیں۔ یہ مرکز نواح مستطیل کے یرین حصہ تک پھیلا ہوتا ہے (دیکھو شکل ۳۶)۔ اور شوکی رما دی مادہ کے موخر قرن سے جس میں قذالی اور دوسرے عقی اعصاب کے حسی ریشہ جات ختم ہوتے ہیں مسلسل ہوتا ہے۔ اسکے نزدیک ہی عصب تانیہ (vagus) کا حسی نوات ہوتا ہے۔ تانی مرکز کے اختلالات بعض اوقات بیش بہا و کی وجہ سے پانچویں عصب کے نواتات کو متاثر کر دیتے ہیں! اس سے درد بالعموم اس عصب کے اس تفرع سے جو ام جانیہ میں پایا جاتا ہے منسوب ہوتا ہے۔ پانچویں عصب کی ہر قسمت سے ام جانیہ کو ایک شاخ جاتی ہے۔

(ب) حرکی عصبی رسد

ساتواں عصب عضلات اظہار، بوتی عضلہ (buccinator)، عضلہ منتشرہ (platysma)، اور دو شکی (digastric) عضلہ کے موخر شکم کو رسد پہنچاتا ہے۔ پانچویں عصب کی تیسری قسمت مضغی عضلات، چانی لامی عضلات (mylo-hyoid) اور دو شکی عضلہ کے مقدم شکم کو رسد پہنچاتی ہے۔

۲۔ نکفی خط

(THE PAROTID REGION)

غده نکفیه (parotid gland) کا عمیق حصہ نیچے کے جبرے کی فرع (ramus)

کے پیچے ایک معین فضا میں واقع ہوتا ہے (شکل ۳۷)۔ جب سر حالتِ بسط میں ہوتا ہے یا جب فکِ زیرین آگے کی طرف بڑھتا ہے جیسا کہ ٹھڈی کو آگے کی طرف کوٹھکانے میں ہوتا ہے تو اس فضا کی جسامت بڑھ جاتی ہے۔ موخر الذکر حرکت میں مقدم موخر سمت میں تقریباً ۱۲ انچ کے برابر افزائش ہو جاتی ہے۔ اور جب سر کو خمیدہ کیا جائے تو یہ کم ہو جاتی ہے۔ جب منہ خوب اچھی طرح سے کھولا جائے تو اس فضا کا نیچے کا حصہ کم ہو جاتا ہے اور جب قذال آگے کی طرف کو پھیلتا ہے تو یہ اوپر کے حصہ میں بڑی ہو جاتی ہے۔ نکفی فضا پر عملیہ کرتے وقت اور اسکا استقصا کرنے میں ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔

مزید برآں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ نکفہ کے الہاب میں ان تمام حرکتوں سے جسکا رجحان اس فضا کو جمیں یہ غده واقع ہوتا ہے تنگ کرنے کی طرف ہو بہت سادہ درپیدا ہوتا ہے۔ جبڑے کی فرع میں زائد شیرخوارگی اور پیرائہ سالی میں جو ترچھاپن پایا جاتا ہے انکی وجہ سے یہ فضا بالغ کی فضا کے مقابل میں اقل الذکر حالت میں نسبتاً اور موخر الذکر میں حقیقتہً بڑی ہوتی ہے۔ غده کا بیشتر حصہ سطحی ہوتا ہے اور عضلہ مضغیہ کے اوپر پھیلا ہوتا ہے۔

148

شکل ۳-۲۔ افقی تراش جو چہرہ اور گردن کی ایک جانب میں نیچے کے دانتوں کے لیول کے عین اوپر سے گزرتی ہے۔

(براون: Braune)

۱۔ وجہی شریان۔ ج۔ وجہی ورید۔ ج۔ لسانی عصب۔
 ۲۔ تھمائی لمفی عصب اور شریان جو جبڑے کی صعودی فرع کے اندر کیلبرف واقع ہیں۔ ۳۔ زائدہ ابریہ۔ س۔ داخلی سبانی شریان۔ ص۔ داخلی و واجی ورید معہ اعصاب ثانیہ و شوکی معین تحت اللسانی کے جو اس کے اندر کیلبرف واقع ہیں۔ ط۔ فہری شریان صعودی فرع کے باہر کی طرف مضغیہ دکھایا گیا ہے اور اس کے اندر کی طرف داخلی جنبی عضلہ نکلیا گیا ہے۔ آخر الذکر کے اندر کیلبرف عضلہ مضغیہ فوقانی اور لوزہ دکھایا گیا ہے۔



یہ غده ایک روا سے جو منحنی روا سے حاصل ہوتی ہے قریبی طور پر محصور ہوتا ہے۔ نکفی ردا کی سطحی تہ بہت کشیف ہوتی ہے اور یہ نیچے کی طرف کو قصبی عضلہ (sterno-mastoid) کے خلاف ہے اور آگے کیلبرف کو مضغیہ کے خلاف سے مسلسل ہوتی ہے اور کیلبرف یہ وجہ سے چسپیدہ ہوتی ہے۔ اور نیچے کیلبرف یہ گہری تہ سے ملجاتی ہے۔ گہری تہ نازک ہوتی ہے اور اوپر کیلبرف یہ زائدہ ابریہ سے چسپیدہ ہوتی ہے جس سے ابریہ فکی (stylo-maxillary) رابطہ بنتا ہے۔ اور یہ جنبی عضلات اور جنبی زائدہ سے چپکی ہوتی ہے۔ اسلئے یہ غده ایک روا کے ایک واضح تہ کے اندر واقع ہوتا ہے جو نیچے کیلبرف سے بالکل بند ہوتا ہے۔ مگر اوپر کیلبرف سے کھلا ہوتا ہے

149

زائدہ ابریہ کی مقدم کورا اور داخلہ منجی (internal pterygoid) عضلہ کے منوکراہ کے درمیان ردایں ایک رنڈہ ہوتا ہے جس سے نکفی فضا بلعوم کے گرد و نواح کی اقصالی بافت سے ربط و راہ رکھتی ہے۔ یہ ایک بہت مشہور و معروف امر ہے کہ پس بلعومی خراج میں نکفی ورم بہت عام ہوتا ہے۔ اور کئی ایک مثالوں میں پیپ یا کم سے کم اسکا کچھ حصہ ہی نکفی خط کے راستہ سے نکلا گیا ہے ان حالتوں میں یہ بہت اغلب ہے کہ مادہ بلعومی خط میں سے نکفی خط میں اس رنڈہ کے اندر سے گزر جاتا ہو جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔

اس ردائی ترتیب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نکفی خراج کے براہ راست باہر کی طرف کو جلد میں بڑھنے میں بہت زیادہ مزاحمت پیش آتی ہے۔ یہ خراج اکثر اوپر کی طرف کو اقل مزاحمت کی سمت میں بڑھتا ہوا سدغی یا وجبی حضرات تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ اس رخ میں بھی جاذبہ اس ترقی کو مزاحم آتی ہے۔ یہ اکثر بوقی کہف یا بلعوم کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ ردائے مذکور کے زیرین حدود کو چا کر گردن میں چلا جاتا ہے۔ یہ ضروریاد رکھنا چاہیے کہ یہ غدہ غرض و فی منفذ اور جہاں کے فراع اور دیگر عظمی حصوں سے براہ راست مس کرتا ہے! اور سدغی فکی مفصل سے ایک قریبی علاقہ رکھتا ہے چنانچہ نکفی خراج منفذ مذکور میں تینو رینی (Santorini) کے جبری کی طرح کے شقاق کے راستہ سے جو غرض و فی میں موجود ہوتا ہے پھٹ چکا ہے۔ یہ اپنی ہم پہلو ہڈیوں کے گرد عظمی التهاب کا باعث بھی ہو چکا ہے، اور نیز اس سے سدغی فکی مفصل کا التهاب بھی پیدا ہو چکا ہے۔ بہت سی حالتوں میں جبکہ متعلق فرکو (Virchow) نے اطلاع دی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیپ یا پنجویں عصب کی شاخوں کے ساتھ ساتھ چکر کھوپری میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ نیم قمری (semilunar) عقدہ کا ماعول پیپ سے در رنجتہ پایا جا چکا ہے۔

اذینی صدغی (auriculo-temporal) اور عظیم اذینی (great auricular)

اعصاب غدہ مذکور کو رسد حس پہنچاتے ہیں اور ان اعصاب کی موجودگی اور نیز نکفی غدہ کے سخت اور کڑا ہونے سے اس شدید درد کی توجیہ ہوتی ہے جو اس غدہ کے سریع المنو سلعات اور حالت التهاب میں محسوس ہوتا ہے۔ درد اکثر اذینی صدغی (auriculo-temporal) عصب کے ممر کے ساتھ بہت نمایاں طور پر منسوب ہوتا ہے۔ چنانچہ نکفی بالید کے ایک مریض میں جو میرے (فرڈریک ٹریویر کے) زیر علاج تھا درد صیوان الاذن اور صدغہ کے ان حصوں میں پایا جاتا تھا جس کو اس عصب سے رسد پہنچتی تھی۔ نیز منفذ کی گہرائی میں بھی اس مقام پر درد محسوس ہوتا تھا جو اس عصب کی

منفذی شخاع کے داخل ہونے کی جگہ کا متناظر تھا۔ اور نیچے کے جبرے کے مفصل میں بھی در دیا جاتا تھا جسکو ازینی صدغی عصب رسد پہنچاتا ہے۔

غده میں جو اہم ترین ساختیں پائی جاتی ہیں وہ خارجی سبائی شریان معہ اپنی دو انہائی

شاخوں کے اور عصب وجہی ہیں۔ خارجی سبائی شریان (external carotid


artery) جبرے کی فرع کے پیچھے اسکے موخر کن رے کے تحتانی اور وسطی ایک تہائی حصوں کے مقام انضمام کی بلندی پر پائی جاتی ہے۔ اسکے بعد یہ کھنی غده کی عمیق جانب میں داخل ہو جاتی ہے اور ٹھوڑا سا جھکے کی او باکریلہ قہر مٹنے کے بعد سطح کے زیادہ نزدیک آ جاتی ہے۔ اور جبرے کے قندال کے لیول پر اپنی دو انہائی شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اسلئے یہ شریان غده کے تحتانی کنارہ پر داخل نہیں ہوتی اور کھنی فضا کے زیر ترین حصہ سے کوئی حقیقی تعلق نہیں رکھتی۔ علاوہ ازیں یہ عرق فرع کی کور کے متوازی نہیں ہوتا بلکہ کس قدر ترچھے پن کے ساتھ کھنی غده میں سے گزر جاتا ہے۔

کھوپری کے قاعدہ میں سے ابری طلی (stylo-mastoid) سوراخ میں سے نکلتے وقت وجہی عصب (facial nerve) طلی زائدہ کے مقدم کنارہ کے نقطہ وسطی سے ایک انچ گہرا واقع ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے آگے کی طرف کو اگر ایک افقی خط چاند کی صعودی فرع کے موخر کنارہ تک کھینچا جائے تو یہ اس عصب کے اصلی تنے کی نشاندہی کرتا ہے (شکل ۳۸)۔ غده کے اندر جہاں یہ عصب صدغی وجہی (temporo-facial) اور عنتی وجہی (cervico-facial) قسموں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں یہ خارجی سبائی (external carotid) شریان اور صدغی فکی (temporo-maxillary) ورید سے اوپری پایا جاتا ہے۔ جہاں یہ عصب ابری طلی (stylo-mastoid) سوراخ سے نکلتا ہے اسکے قریب ہی وجہی ٹک (facial tic) کو ٹسکین دینے کے لئے کھینچا بھی جا چکا ہے۔ طلی زائدہ کے مقدم کنارہ کے وسط سے پہلے انچ آگے کے مقام پر یہ نہایت آسانی سے ملتا ہے۔ یہ دو شکمی عضلہ کے موخر شکم کے اوپر پایا جاتا ہے جو زخم کی گہرائی میں اس تک پہنچنے کے لئے رہنما کا کام دیتا ہے۔

151

عصب وجہی کے کٹنے سے بوقیہ (buccinator) اور عضلات الہار مشلول ہو جاتے ہیں اور چہرہ صبیح و سالم جانب کو کھینچ جاتا ہے اور آنکھ کھلی ہی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں چند درآر ریشے بھی ہوتے ہیں جو گہرے دباؤ کے لئے حساس ہوتے ہیں۔ شلل کی حالتوں میں چہرہ کی

حرکت پذیری کو از سر نو قائم کرنے کے لئے سر جنوں نے متعدد مثالوں میں وجہی تہ کے کو کسی قریب جوار کے عصب کے تنے سے ٹانگ دیا ہے۔ جو اعصاب فغقب کئے جاتے ہیں وہ شوکی معین (spinal accessory) اور تحت اللسانی (hypoglossal) ہیں (شکل ۳۸)۔ ایک حالت میں تو عضلات اطہار اسوقت فعل کرتے ہیں، جب عضلہ منخرنہ (trapezius) اور قصبی عضلہ (sterno-mastoid) کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حالت میں یہ اسوقت فعل کرتے ہیں جب زبان کو حرکت دیجاتی ہے۔



شکل ۳۸۔ وجہی، شوکی معین اور تحت اللسانی اعصاب کی سطحی تریسہیں۔
 ۱۔ حلی زائده کے کنارہ مقدم کا نقطہ وسطی۔ ج۔ وہ نقطہ جو قصبی عضلہ کے مقدم کنارہ پر زائده حلیہ سے ایچ نیچے واقع ہے۔ ج۔ قصبی عضلہ کے موخر کنارہ کا نقطہ وسطی۔
 ج کے اوپر طلسم کا مستعرض زاویہ نظر کیا گیا ہے۔

152

کچھ عرصہ کے بعد مریض ان حرکات کو جو اس طرح نامناسب طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں علمدہ علمدہ عمل میں لاسکتا ہے۔ وجہی عصب سے ایچ کے مقام خروج پر موخر اذنی (posterior auricular) شاخ ٹھکر کان کے عضلات کو چلی جاتی ہے اور شاخ ٹھکر دو ٹھکر دو ٹھکر کے موخر ٹھکر اور ابری حلی (stylo-hyoid) عضلہ کو پہنچ جاتے ہیں۔

تکفیه کے سلعات میں غضرونی بافت کے موجود ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ یہ ایک معروف و مشہور امر ہے کہ کن پھیٹر (mumps) کے بعد انتقالی خراجات خصیتین میں کافی عام طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ ایک اہم امر ہے کہ خصیتین ہڈی کے علاوہ جسم کے ان

چند حصوں میں سے ہیں جنکی نوبالیدوں کے اجزائے ترکیب میں مخضر و قی مادہ اکثر شامل ہوتا ہے۔
نکھنی کا التهاب شکم اور حوض کے نضریات اور امراض کے بعد خاص طور پر کثرت سے
پایا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ بعض نوعی تپوں کے بعد بھی اور زیادہ تکھفیف کے ساتھ تپ محرقہ
کے بعد بطور عاقبہ کے بہت کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ یہ خاص کر اس وقت نمودار ہوتا ہے جبکہ
مریض کو دودھ کی سی نرم غذا دیجارہی ہو اور اسکا منہ صاف نہ رکھا گیا ہو۔ مرآت منہ سے
منتشر ہوتی ہے اور یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ یہ پہلے زیادہ تر گرد قناتی ہوتی ہے۔

بہت سے لمفی غدود غددہ نکھنی کی سطح پر اور اسکے جسم میں واقع ہوتے ہیں۔

اور یہ چاندنی کے وجہی اور جداری خطوں، مجر، انفی حفزہ جات کے موخر حصہ، اوپر کے جڑے
اور بلعوم کے پھیلے اور اوپر کے حصہ سے لمف وصول کرتے ہیں۔ ان غدود کے کلانی یافتہ ہونے سے
ایک قسم کا ”نکھنی سلعہ“ بنتا ہے۔

نکھنی (Stenon's) قنات (شکل ۳۸) تقریباً ۲½ انچ لمبی

ہوتی ہے اور اسکا قطر ۱/۸ انچ ہوتا ہے۔ اسکا دھنہ اسکا تنگ ترین حصہ ہوتا ہے۔ عضلہ مضغیہ
(masseter) کے مقدم کنارہ پر یہ قنات دفعۃً اندر کی طرف مڑ کر عضلہ بوقیہ (buccinator)
کو منقبذ کر رہتی ہے! اور یہ خم آنا اچانک پیدا ہوتا ہے کہ قنات کا بوقی قطعہ بعض اوقات مضغی
قطعہ پر تقریباً ۱/۲ انچ قائمہ پرواقع ہوتا ہے۔ جب منہ کی طرف سے قنات میں سلائی گزار دی جائے تو
اس خم کا خیال رکھنا چاہئے۔ یہ قنات اوپر کی دوسری ڈاڑھ کے لیول پر ایک حلیہ کی چوٹی پر نکلتی ہے
عضلہ مضغیہ میں سے قنات کا ممر ایک خط سے ملتا ہر کیا جاتا ہے جو شنبہ (concha) کے زیرین حاشیہ سے
اس نقطہ تک کھینچا جائے جو جناح الانف اور لب کے سرخ حاشیہ کے درمیان عین وسط پر واقع
ہوتا ہے۔ یہ وجہ کے نیچے ایک انگلی کے عرض کے فاصلہ پر واقع ہوتی ہے اور متعرض ہی (transverse)
(facial) شریان کے اوپر اور عصب وجہی کی زیر مجری شاخیں اسکے نیچے ہوتی ہیں۔ یہ قنات جلد
کے نیچے نشق بھی ہو جاتی ہے اور ریت و عابد رہو جاتا ہے۔ اس قنات کے زخموں سے ریتی ناسور
کے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ قنات کے بوقی حصہ کا کم از کم نصف حصہ عضلہ بوقی کے جسم میں
مدفون ہوتا ہے۔ جب ریتی ناسور عضلہ بوقیہ (buccinator) پر واقع ہو تو یہ بعض اوقات

غده نکفہ کو یا اسکے اس حصہ کو جزائہ نکفہ (soccia parotidis) کے نام سے موسوم ہے متاثر کر دیتا ہے۔ الہابی حالتیں منہ سے قنات کے ساتھ ساتھ منتشر ہو کر نکفہ تک پہنچ سکتی ہیں۔

۳۔ اوپر اور نیچے کے جبرے اور

ان کے متعلقہ حصے

فک (Maxilla)۔ (فکی جوف کے لئے دیکھو صفحہ 129) اور تنک العصب کے لئے دیکھو صفحہ 179)۔ اس ہڈی میں اسکے چوک پن اور اسکے عجیب طرح کو کھلا ہونے کی وجہ سے بہت آسانی سے کسر واقع ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ ہڈی کثیر العروق ہوتی ہے اسلئے شدید تضررات جنہیں بہت ماحرم ضائع ہو چکا ہو اکثر حیرت انگیز طریقہ سے مندل ہو جاتے ہیں۔ اسکے کو کھل پن اور ان کہف جات کی وجہ سے حکمی حدود بندی میں یہ مدد دیتا ہے چہرہ کے عمیق حصہ میں عظیم البسات اجسام غریبہ کا امتیاس ممکن ہو جاتا ہے۔ اس ہڈی میں بعض اوقات وسیع تنخر واقع ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ دیاسلائی کے کاغذ انوں میں کام کرنے والوں میں دیکھا جاتا ہے جو سفید فاسفورس کے دضان کے معرض اثر میں رہتے ہیں۔ تنخر کی ایک حالت میں جو خسرو کے بعد نمودار ہوئی یہ شکایت پیش فکی (premaxillary) یا ثقیبی (incisive) ہڈی تک ہی محدود تھی۔

فک (maxilla) کے گرد عظمہ کارجمان گرد مجہ کی طرح نئی ہڈی کی تکوین کی طرف نہیں ہوتا۔ اوپر کے جبرے کے تنخر کی معمولی حالتوں میں ہڈی میں تجدید پیدائش نہیں پائی جاتی۔ اور رخنہ مستقل طور پر باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ میں گرد عظمہ جدید ہڈی با فراط پیداکر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ٹٹے بڑے (وسیع) نقصانات پورے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ امر قابل ذکر ہے کہ چند سال گزر سنے پر اس نئی ہڈی کے ایک بہت وسیع حد تک بار دیگر منجذب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔

استیصال فک (excision of the maxilla)۔ یہ ہڈی محل سلعہ ہونے کی وجہ سے بعض دیگر حالتوں کے تحت اکثر ہٹا ہ دور کیجا چکی ہے۔ عمل میں جو عظمی تعلقات کاٹے جاتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، (۱)۔ دیکھو شکل ۲۷ صفحہ 117 اور شکل ۳۳ صفحہ 140)۔ (۱) وہ تعلق جو مجھ

کے باہر کی طرف عظم عارضی (malar bone) کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ (۲) انفی (جہمی: frontal) زائده کا تعلق جو جہمی، انفی اور دمی ہڈیوں کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ (۳) مجہری صفحہ کے وہ تعلقات جو مصفائی اور تنک (palate) کے ساتھ پائے جاتے ہیں (مجہری صفحہ اکثر باقی چھوڑ دیا جاتا ہے یا مجہری حاشیہ کے نزدیک سے کاٹ دیا جاتا ہے)۔ (۴) مقابل کی ہڈی اور تنک کے ساتھ جو تعلق منہ کی نیچت میں پایا جاتا ہے۔ اور (۵) پیچھے کی طرف کا وہ تعلق جو عظم الخنک کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور وہ لہنی چسپید گیاں جو مناجی زائدوں کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ قبل الذکر چار حالتوں میں ہڈی کی علیحدگی کسی کاٹنے والے اوزار سے عمل میں لائی جاتی ہے اور موخر الذکر حالتوں میں اسے صرف مروڑ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

نرم حصے جو کاٹے جاتے ہیں۔ انکا ذکر تین عنوانات کے تحت کیا جاسکتا ہے۔ وہ حصے (۱) جو پہلے آشکاف میں کٹ جاتے ہیں (۲) جو دامن الثاتے وقت کٹتے ہیں اور (۳) جو ہڈی کو علیحدہ کرتے وقت کاٹے جاتے ہیں۔

(۱) مروجیا وسطی (median) آشکاف سے جو نیچے کے پوٹے کے متوازی شروع کیا جاتا ہے اور ناک کی جانب پر سے جناح الف کے گرد سے لاکر اور کے لب کے وسط تک دیا جاتا ہے مندرجہ ذیل حصے اوپر سے نیچے کی طرف بالترتیب کٹتے ہیں: جلد، سطحی رداء عضلہ محیطہ عینیہ (orbicularis oculi) زیر مجہری (infraorbital) عصب اور شریان کی جفنی شاخیں، رافع شفستہ الاعلیٰ (levator labii superioris) کا کچھ حصہ زاویہ (angular) شریان اور ورید، زیر مجہری (infraorbital) عصب کی انفی شاخیں، ضاغطۃ المنخر (compressor naris) (عضلۃ الفم: musculus nasalis) ناک کے فاسل اور جنابین کا خافض، انفی خضروف کی ہڈی سے چسپیدگی، عضلہ محیطہ الفم (orbicularis oris)، فوقانی اکلیل (superior coronony) شریان اور ورید اور لب کی عثائے محاطی۔ وجہی عصب کی بہت سی شاخیں بھی جو عضلات کو جاتی ہیں کٹ جاتی ہیں۔ (۲) دامن کے لٹانے میں مذکور بالا عضلات کی تقطیع کیجائے گی اور اگر جمہی زائده سالم دور کر لیا جائے تو داخلی جفنی رباط (internal palpebral ligament) بھی ساتھ ہی ہوگا۔ نیز رافع زاویہ (levator anguli oris) اور عضلہ بوقیہ (buccinator) عضلہ مضغیہ (masseter) کے

چند ریشوں اور موربات تنہانیہ کی، جو مجہری صفحہ پر ہوتے ہیں، بھی تقطیع ہوگی۔ زیر مجہری عصب اور شریان اپنے سوراخ میں سے نکلتے ہوئے کاٹے جائیں گے اور اس دامن کے اندر وجہی (facial)

شریان اور ورید کے تنے ہستعروض وجہی شریان اور وجہی عصب کا وجہی حصہ بھی ہو گئے۔ (۳) جب زائڈ کو علیحدہ کرنے میں دمی تاج (lacrymal sac) اور زیر بکری (infratrochlear) عصب کو نقصان پہنچ جائے گا اور انفی دمی قناتہ اور انفی عصب کی خارجی شاخ کٹ جائے گی۔ نیچے سے ہڈی علیحدہ کرتے وقت حنک الصلب کی پوششوں اور حنک اللین کی چسپیدگی کو جو اس کے ساتھ ہوتی ہے کاٹ دیا جاتا ہے بشرطیکہ اس زائڈ کے دور کر دینے سے احتراز نہ کیا جاسکتا ہو۔ حنک الصلب کی نرم پوشش کو تقطیع سے علیحدہ کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی ہر ایک کوشش بے سود ہوتی ہے۔ پیچھے کی طرف زیر مجری عصب کا تنہا بار دیگر کاٹ دیا جاتا ہے (اس وقت یہ وندی حنکی عقدہ کے سامنے سے کاٹا جاتا ہے) اور ساتھ ہی موضعی (posterior dental) اور زیر مجبسی (infraorbital) شریانیں اور وندی حنکی (sphenopalatine) شریان کی بعض شاخیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں۔ عمیق وجہی ورید جو جنینی ضغیرہ سے آتی ہے غالباً کٹ جائے گی اور آخر میں حنک (palate) کے نزدیک سے کبیر حنکی عصب (large palatine nerve) اور نزولی حنکی شریان (descending palatine artery) بھی کاٹ دی جاتی ہے۔

اس امر کا خیال رہے کہ اس عمل میں کوئی بڑی شریان نہ کٹنے پائے۔ عظم مغتول تھانی (inferior turbinated bone) (نکلی مغتولی: maxillo-turbinal) بھی فک کے رتھ ہی لازمی طور پر چلی آتی ہے۔

چانہ (mandible) یہ ہڈی گھوڑے کے نعل کی شکل رکھنے کی وجہ سے جس سے اس میں کمانی کے بعض خواص پیدا ہو گئے ہیں اور اپنی ساخت کی بستگی اور بہت سی حرکت پذیری کے باعث اور نیز حائل کی طرح درون مفصل غضروفات کے موجود ہونے کی وجہ سے جو اسکے چسپیدہ سروں کی حفاظت کرتے ہیں ایک بڑی حد تک گسے محفوظ رہتی ہے۔ یہ ہڈی بالعموم بلا واسطہ ضرب سے ٹوٹ جاتی ہے اور کمراسکے کسی حصہ میں بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ارتفاق (symphysis) بہت موٹا ہونے کی وجہ سے شاذ و نادر ہی ٹوٹتا ہے فرخ (ramus) اپنی طرفوں کے عضلی گدیوں سے ملفوف ہونے کی وجہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اکلیل نما (coronoid) زائڈ ضرب پہنچنے کے خطرہ سے اور بھی زیادہ محفوظ ہے کیونکہ یہ گہرائی پر واقع ہوتا ہے اور وجہ (zygoma) سے اسکی حفاظت ہوتی ہے۔ ہڈی کا کمزور ترین حصہ سامنے کی طرف واقع ہوتا ہے جہاں اسکی قوت ذقنی سوراخ کے موجود ہونے اور کچلیوں کے لئے وقب (sockets) موجود ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ لہذا کمراسکے

قریب سب سے زیادہ کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہڈی بلا واسطہ ضرب سے ارتفاق کے نزدیک سے یا اسکے اوپر سے بھی ٹوٹ جاتی ہے اور ایسا کسی ایسی ضرب سے یا ہڈی کے اس طرح بھج جمانے سے ہوتا ہے جس سے فرمیں کا رجحان ایک دوسرے کے نزدیک تر ہو جانے کی طرف ہو چنانچہ جب اضمغنی خط پر ضرب لگنے سے خط وسطی پر ٹوٹ چکا ہے۔

اس ہڈی کے کسور میں غیر وضعیت کی مقدار بہت مختلف ہوتی ہے۔ اور قوت کی نوعیت اور سمت کا اسپر بہت اثر ہوتا ہے۔ مجمل طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جب اس ہڈی کا جسم ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مقدم قطعہ جبڑے کے خافضات اوٹوگنی عضلہ (digastric) پائیا نیلا (mylo-hyoid) ذقنیہ لیبہ (genio-hyoid) اور ذقنیہ لاسیہ (genio-glossus) کے عمل سے پیچھے اور نیچے کی طرف کھینچ جاتا ہے اور پچھلا قطعہ جبڑے کے رافعات اضمغنیہ (masseter) عضلہ جینیعیہ داخلہ (internal pterygoid) اور صدغیہ (temporal) کی وجہ سے اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے جس گھٹنے مخالفی گرد و غلط سے چاڑ کا جو فیزی حصہ پوشیدہ ہوتا ہے وہ عام طور پر پھٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح کسور سطحیں ان عفونتی حالتوں کے معرض اثر میں آجاتی ہیں جو غمض میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ چانیہ لاسیہ (mylo-hyoid) دونوں قطععات سے چسپیدہ ہوتا ہے اور اس سے غیر وضعیت میں ترمیم ہو جائے گی۔ فرع کے کسور میں شاؤنا درہی زیادہ غیر وضعیت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ عضلی بافت دونوں قطعوں سے تقریباً مساوی طور پر ہی چسپیدہ ہوتی ہے۔

اس ہڈی کے جسم کے کسور میں سنی (dental) عصب تضرر سے اکثر حیرت انگیز طور پر بچ جاتا ہے، اور اسکی توجہ یہ فرض کر لینے سے کیجاتی ہے کہ ہڈیوں میں اتنی غیر وضعیت واقع نہیں ہوتی جس سے یہ عصب پھٹ سکے۔ مگر حادثہ کے ہفتوں بعد ایسا ہوا ہے کہ یہ عصب نامی دشبذ (callus) سے استقدر مضبوط ہو گیا ہے کہ اس کا فعل زائل ہو گیا ہے۔ ایک یا دونوں قندال نما زائڈ سے (condyloid processes) ٹھڈی کے بل کرنے یا اس پر چوٹ کھانے سے اکثر ٹوٹ چکے ہیں۔

چانوی (mandibular) (صدغی فکی) (temporo-maxillary) مفصل

مفصل کو ایک کیسہ سہارا دیتا ہے جسکی دہازت مختلف حصوں میں بہت مختلف ہوتی ہے۔ کیسہ کا سب سے زیادہ موٹا حصہ خارجی حصہ ہوتا ہے (صدغی چانوی: temporo-mandibular یا باجی lateral: رابطہ) اور اسکے بعد موٹائی میں اندرونی حصہ ہوتا ہے اور کیسہ کے مقدم اور موخر حصے

باریک ہوتے ہیں اور مقدم حصہ خاص کر بہت باریک ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس مفصل میں تقیع واقع ہو جاتا ہے تو اس جوڑ کی خارجی جانب سے پیپ کے بٹکنے کا سب سے کم امکان ہوتا ہے۔ اور کیسے کے مقدم حصہ سے اس کے خارج ہونے کا احتمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ حصہ بہت بڑی حد تک خارجی جنبی (external pterygoid) عضلہ کی چسپیدگیوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔

جڑے کے قندال کے عین پیچھے غلٹی منفذ ہوتا ہے اور اس سے ذرا اندر کی جانب اذن وسطی ہوتا ہے۔ جڑے کے سامنے کی جانب پر سخت ضربات لگنے سے ان ساختوں کو بعض اوقات فرہنج جاتا ہے۔ یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس مفصل کے مضبوط ترین رباط (خارجی جانبی) کا رخ نیچے اور پیچھے کی جانب کو ہوتا ہے تاکہ یہ قندال کی ہر اس حرکت کو جو اس ہڈی کی نازک دیوار کی طرف ہو جو منفذ اور لبل کو محدود کرتی ہے فوراً مزاحمت پیش کرے۔ اگر یہ رباط نہ ہوتا تو ٹھڈی کی ضرب اس حالت کی نسبت زیادہ خطرناک حادثہ ہوتی۔

اس مفصل کے حرکات عجیب ہیں۔ منہ کھولنے پر یہ مشاہدہ میں آئے گا کہ قندال مفصلی فراز پر آگے اور نیچے کی طرف کو حرکت کرتا ہے اور جڑے کا زاویہ پیچھے کی اور اوپر کی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ تحتانی سنی سوراخ (inferior dental foramen) سے اگر ایک ستعرف خط کھینچا جائے تو یہ اس حرکت کا تقریباً محور ہوگا۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحتانی سنی (inferior dental) (جو فیزی: alveolar) اعصاب چانچی میں اقل حرکت کے مقام پر داخل ہوتے ہیں۔ خارجی جنبی (external pterygoid) عضلات قندال کو مفصلی فراز پر سے کھینچ کر منہ کے کھولنے میں سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ٹھڈی چانی لانی (mylo-hyoid) اور دو شکمی (digastric) عضلات کے انقباض سے منقبض ہو جاتی ہے۔

خلع (dislocation) اس مفصل میں آگے کی طرف کو خلع آسانی سے واقع ہو سکتا ہے۔

یہ بعض اوقات یک جانبی ہوتا ہے اور بعض اوقات دو جانبی۔ موخر الذکر زیادہ عام ہے۔ اور یہ صرف اس حالت ہی میں واقع ہوتا ہے۔ جبکہ منہ اتفاق سے وسیع طور پر کھلا ہو۔ یہ خلع حقیقت میں تقریباً ہمیشہ تشنجی عضلی فعل سے پیدا ہوتا ہے جبکہ منہ کھلا ہو اگرچہ چند واقعات میں یہ بلا واسطہ ضرب مثلاً منہ اچھی طرح سے کھلا ہونے کی حالت میں نیچے کے سامنے کے دانتوں پر نیچے کی سمت میں ضرب لگنے سے بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ ہنسنے، جانی لینے اور بہت زور سے قے آنے کے دوران میں بھی

واقع ہو چکا ہے۔ ایک سے زائد واقعات میں یہ حادثہ اس وقت بھی ہوا ہے جبکہ دندان ساز منہ کا سبیکہ لے رہا تھا۔ منہ کو وسیع طور پر کھولنے کی حالت میں قندال سے بین مفصل یعنی غضروف کے آگے کیلٹرف کو پھسل جاتے ہیں۔ یہ یعنی غضروف مفصل فراز (eminentia articularis) کی مقدم کو تک پھیلا ہوتا ہے جبکہ اسکو وصول کرنے کے لئے غضروف کا استر چڑھا ہوتا ہے۔ قندال اس فراز کی چوٹی تک کبھی نہیں پہنچتا۔ کیسے کہ تمام حصے سوائے مقدم حصہ کے تنیدہ ہو جاتے ہیں۔ اکیلی زائد بہت متخفف ہو جاتا ہے۔ اب اگر خارجی جنبی (external pterygoid) عضلہ (وہ عضلہ جو اس خلع کا زیادہ تر ذمہ دار ہوتا ہے) زور سے متخفف ہو جائے تو قندال جلدی سے فراز مذکور کے اوپر سے کھینچ کر وہی حفرہ (zygomatic fossa) میں پہنچ جاتا ہے اور دروں مفصلی غضروف پیچھے رہ جاتا ہے۔ جدید عمل پر پہنچنے کے ساتھ ہی یہ مدغی (temporal) داخلی جنبی (internal pterygoid) اور مضغی (masseter) عضلات سے اوپر کیلٹرف کو کھینچ جاتا ہے اور وہاں کم و بیش مثبت ہو جاتا ہے۔

چانہ کا خلع جزوی (subluxation of the mandible) - یہ نام

جبرے کے خفیف سے اور بالکل غیر مکمل خلع کو دیا گیا ہے جو نازک ستورات میں قلیل الوقوع نہیں۔ یہ دروں مفصلی غضروف کی غیر وضعیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسکا علاج اس غضروف کے استیصال یا اسکو دوخت کے ذریعے مفصل کی ارد گرد کی لیفی سامتوں سے ٹانک دینے سے کیا جاتا ہے (انٹن ڈیل

Annandale)

چانہ کا استیصال (excision of the mandible) - نیچے کے جبرے

کے معتد بہ حصول کا استیصال منہ میں سے بغیر خارجی زخم کے کیا جاسکتا ہے۔

اس جبرے کے ایک سالم نصف کا استیصال کرنے کے لئے ایک شکاف انتصابی سمت میں نیچے کے لب میں سے گزرتا ہوا ٹھڈی کے سب سے نک دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسکو پیچھے کیلٹرف کو جبرے کے تحتانی کنارہ کے ساتھ کھینچ کر فرج کے موخر کنارہ پر سے انتصابی رخ میں اوپر کو لاکر کان کی لک کے قریب ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو زخم جسے کاٹے جاتے ہیں انکو تین عنوانات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) وہ پہلے شکاف سے خالق رکھتے ہیں۔ (۲) وہ جو ٹھڈی کی بیرونی سطح کے صاف کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۳) وہ جو ٹھڈی کی اندرونی سطح کے صاف کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

۱۔ (ا) مقدم انتصابی شکاف میں :- جلد وغیرہ، عضلہ محیطیہ النعم (orbicularis oris)، تختہانی اکلیلی (inferior coronary) اور تختہانی لبی (inferior labial) عروق تحت ذقنی (submental) شریان کی شاخیں۔ رافعتہ الذقن (levator menti)، ذقنی (mental) عروق اور عصب، مقدم وراجی (anterior jugular) ورید کی بعض چھوٹی چھوٹی شاخیں۔ (ب) افقی شکاف میں :- جلد وغیرہ، عضلہ منتشرہ (platysma)، سطحی عنقی (superficial cervical) عصب (عنقی جلدی عصب: nervus cutaneus colli) کی شاخیں، عصب وجہی کے فوق چانوی حصہ کی شاخیں، وجہی شریان اور مضغیہ (masseter) کے کنارہ پرا اور عصب وجہی کی تختہانی چانوی (inframandibular) شاخ (یہ لازمی طور پر کاٹی نہیں جاتی)۔ (ج) موخر انتصابی شکاف ہڈی تک نہیں پہنچتا اور یہ صرف غدہ کھنکھہ کی سطح اور عضلہ مضغیہ کے موخر کنارہ کے کچھ حصہ کو معرا کرتا ہے۔

(۲) بیرونی سطح کو صاف کرنے میں مندرجہ ذیل حصص کو بذریعہ تقطیع چھیکے کو اٹا دیا جاتا ہے۔ رافعتہ الذقن (levator menti) اور دو عضلات خافض عضلہ بوقیہ (buccinator) عضلہ مضغیہ (masseter) [غدہ کھنکھہ کا کچھ حصہ اس پر تعرض واقع ہوتا ہے اور ستعرض وجہی (transverse facial) عروق، عصب وجہی اور سٹینسن (Stenson) کی قنات اس پر سے گزرتے ہیں]، مضغیتی (masseteric) عروق اور عصب عضلہ غدیہ (temporal muscle)۔ (۳) اندرونی سطح کو صاف کرنے میں :- روئخی (digastric) عضلہ ذقنیہ لامیہ (genio-hyoid)، ذقنیہ لسانیہ (genio-glossus) اور چانیہ لامیہ (mylo-hyoid) فوقانی مضیق (superior constrictor) کے چند ریشہ جات، داخلی جنبی (internal pterygoid) عضلہ، تختہانی سنی (inferior dental) (جو فیزی: alveolar) شریان اور عصب چانی لامی (mylo-hyoid) عروق اور عصب داخلی جانی (internal lateral) رباط، عضلہ مدغیہ کا بقیہ منتہی، غٹائے مخاطی۔

وہ حصص جن کو ضرر پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے :- عصب وجہی بشریکہ موخر انتصابی شکاف کو بہت اوپر لے جائیں۔ داخلی فکی (internal maxillary) شریان مدغی فکی (temporo-maxillary) ورید ازبنی مدغی (auriculo-temporal) عصب (یہ وہ ساختیں ہیں جو جبرٹ کے قندال سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہیں) خارجی سبانی (external

(carotid) شریان، عصب لسانی ہنکمی، تحت چانوی (submandibular) اور تحت اللسانی (sublingual) غدہ۔ ایسا ہو چکا ہے کہ زیر گرد عظمیٰ استیصال کے بعد تمام کی تمام ہڈی دوبارہ پیدا ہو گئی ہے۔

بدشکلیاں (deformities) نیچے کا جبر اکبسی بالکل غائب ہوتا ہے اور کبسی اسکے ابعاد بہت قصیر ہوتے ہیں اور کبسی اسکا ٹکون غیر مکمل ہوتا ہے۔ یہ حالتیں خلقی ہوتی ہیں اور اعلیٰ خاصاً چانوی یا پہلی حشری محراب کے جس سے یہ جبر اُبنا ہے ناقص نمو پر ہوتا ہے۔ انکے ساتھ اکثر خیشومی ناسو (branchial fistulae) مسترد کان کبرالضم (macrostoma) اور اسی طرح کے دوسرے تشوہات پائے جاتے ہیں۔

جبرڑوں کے اعصاب۔ اوپر کے دانتوں کو پانچویں عصب کی دوسری قسمت

رسد پہنچاتی ہے، اور نیچے کے دانتوں کو اسکی تیسری قسمت۔ سنی اعصاب کے خراش آور ضرات سے فعل معکوس کے بہت سے تعجب نیز مظاہر پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی حالتوں کے متعلق الطلاع دیجا چکی ہے جنہیں تول العین (strabismus) عارضی کوری اور کچ گردنی (wry-neck) بوسیدہ دانتوں کی خراش سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہلٹن (Hilton) نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے جسکو نیچے کے جبر کے ایک بوسیدہ دانت کیوجہ سے (جسکو پانچویں عصب کی تیسری قسمت سے رسد پہنچتی تھی) بہت تکلیف تھی۔ اس میں اس خطہ پر جسکو افونی صدغی (auriculo-temporal) عصب رسد پہنچاتا ہے (یہ بھی تیسری قسمت کی شاخ ہے) سفید بالوں کا ایک قطعہ نمودار ہو گیا تھا۔ نیچے کی تیسری دائرہ کی جڑیں سستی (dental) (چانوی : mandibular) قنال کے بہت قریب واقع ہوتی ہیں۔ لہذا اگر یہ دانت بے احتیاطی سے نکالا جائے تو عصب کے دریدہ ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جڑیں عصب مذکور کو گھیرے ہوئے بھی ہوتی ہیں۔

دانتوں کی بوسیدگی میں اکثر چہرہ اور گردن کی ایک جانب پر بیش حسیت کے رقبہ جات پائے جاتے ہیں۔ سنی بوسیدگی سے پیدا شدہ درد کے بعض قہ جات جلد کی طرف معکوس ہونے کی توجہ کی تلاش مرکزی عصبی نواتات کے قریبی ایٹلاف میں کرنا چاہئے جنہیں جلدی اور سنی اعصاب جاکر ختم ہوتے ہیں (دیکھو شکل ۳ صفحہ ۱۴۸)۔ گردنی غشا کے مرض سے درد ہائے بعید پیدا نہیں ہوتے (ہیڈ: Head)۔

چہانے کے عضلات پر اکثر تشخّص کا حملہ ہو جاتا ہے۔ جسم کے اور کسی حصہ کے عضلات کے کسی گروہ کے عضلات مقابل اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے کہ چانوی خط کے ہیں۔ چانہ میں کاٹنے اور پیسنے کی جو بہت سی طاقت موجود ہوتی ہے وہ صدغیہ (temporal) (masseter) (genio-hyoid) اور داخلی جنبی عضلہ (internal pterygoid) کی وجہ سے ہے۔ ایسے مقابل عضلات جو چانہ کو منھض کرتے ہیں یعنی خارجی جنبی عضلہ (external pterygoid)، دوشکمی عضلہ (digastric) چانیہ لامیہ (mylo-hyoid) ذقنیہ لامیہ (genio-hyoid) انکی صرف تغییسی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جو وقت تشخّص کی حالت میں ہوتے ہیں یہ اپنے مقابل عضلات پر فوراً غالب آجاتے ہیں۔ جب تشخّص رجعی ہوتا ہے تو دانت بچنے لگتے ہیں! اور جب تشخّص تنشی ہوتا ہے تو منھ زور سے بند ہو جاتا ہے اور ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے جو فک بستگی (trismus) (دانتی کھینچا) کے نام سے موسوم ہے۔ فک بستگی کراڑے کے اولین علامات میں سے ہے۔ مزید برآں پانچویں عصب کی تیسری قسمت کی کسی ایک شاخ کی خراش سے اسکے پیدا ہونے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ چنانچہ بچے کے دانتوں کی بوسیدگی اور نیچے کی عقل دائرہ کے نکلنے کے دوران میں فک بستگی عام طور پر پائی جاتی ہے اوپر کے دانتوں کے سٹ کے عوارض میں یہ بہت کم موجود ہوتی ہے۔ اگر عقدہ گیسری (Gasserian ganglion) کا استیصال کرتے وقت پانچویں عصب کی تیسری قسمت کٹ جائے تو متناظر جانب پر عضلات مضغ مشغول وذبول ہو جاتے ہیں۔ مگر تب بھی تندرست جانب کے عضلات جوڑے کے ان ضروری حرکات کو جو نطق اور مضغ سے تعلق رکھتے ہیں سرانجام دے سکتے ہیں۔


دانت۔ عمر کا اندازہ کرنے کے لئے دانت نکلنے کے مندرجہ ذیل اوقات

بیان کے لئے ہیں۔ عارضی دانت زیرین وسطی ثنایا چھٹے مہینے سے لیکر نویں مہینہ تک۔ بالائی ثنایا دس ماہ پر زیرین جانبی ثنایا اور چار پہلی داڑھیں کچھ مہینے بعد۔ بعد ازاں چار یا پانچ ماہ کے وقفہ کے بعد انیاب نکلتے ہیں اور اخیر میں دوسری داڑھیں نکلتی ہیں۔ دوسرے سال کے اختتام پر تمام دانت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ متقل دانت۔ پہلی داڑھیں چھٹے یا ساتویں سال۔ اسکے بعد آٹھویں سال میں ترتیب دائرین و وسطی ثنایا، اور پھر بالائی وسطی ثنایا، اور کچھ عرصہ بعد جانبی ثنایا۔ پہلے ضوا حک نویں یا دسویں سال۔ دوسرے ضوا حک اور انیاب گیارہویں سال کے قریب انہیں سے نیچے کے اوپر کے دانتوں سے پہلے نکلتے ہیں۔ دوسری داڑھیں بارہویں یا تیرہویں سال۔ عقل دائرہ ۱۸ سے ۲۵ سال میں یا اسکے بعد۔

جوفیزی خراج (alveolar abscess) دانت کے سرخ کے قریب بنتا ہے۔

جن دانتوں کا ایک سرخ ہوتا ہے انہیں پیپسرخ کے میزاب کے ساتھ نکل آتی ہے۔ دوسرے دانتوں میں اسکار جمان جوفیزہ کو مشتتب کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ اگر سرخ کا سرا اس مقام کے اندر ہے جہاں غشائے مخاطی مسوڑے پر سے رخسار پر منعکس ہوتی ہے تو خراج منہ میں پھٹ جائے گا۔ لیکن اگر سرخ کا

سرا اس انکاس کے باہر ہے یا اگر پیپ خط انکاس کے ورا تر سکتی ہے تو یہ بعض اوقات رخسار میں سے نکل آتی ہے۔ بالائی ثنایا یا انیاب کا جوفیزی خراج رخسار میں کبھی نہیں پھٹتا۔ جب اسکا تعلق اوپر کی دائروں سے ہو تو یہ بعض اوقات ایسا کرتا ہے۔ جو خراج اوپر کی پہلی دائرہ یا دوسرے مقدم خاصکے کی جڑوں پر بنتا ہے وہ اکثر فکی جوف میں پھٹ جاتا ہے۔ ثنایا، انیاب، اور پہلے مقدم خاصکے کی جڑوں اس جوف سے زیادہ دور واقع ہوتی ہیں۔ لہذا جو خراجات ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ثنایا و نادر ہی جوف میں پھٹتے ہیں۔ اور جب خراج کا تعلق نیچے کے کسی دانت سے ہوتا ہے تو یہ بعض اوقات رخسار کی جلد میں سے نمودار ہوتا ہے۔



شکل ۳۹۔ ایک ثنئیہ کی تصویر۔

- (۱) مینا۔ (۲) ناہض اسن۔ (۳) مغز۔
(۴) جلبہ مجریہ۔ (۵) گردنی خشا۔ (۶) بنی
قتال۔ (۷) ڈی۔ (۸) لب۔ (۹) ڈینٹین۔

اوپر کی عقل دائرہ اوپر کے جبرے کے نمودار


میں اور نیچے کی عقل دائرہ فرع معودی کی اندرونی جانب میں نمودار ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ دائرہ اپنے محل پر ظاہر ہونے میں ناکام رہتی ہیں یا گہرائی میں ہی مدفون رہتی ہیں۔ انکی وجہ سے کبھی کبھی عمیق اور پوشیدہ خراجات پیدا ہو جاتے ہیں جبکہ منہ اکثر گردن میں ان کے مبداء سے کچھ فاصلہ پر بنتا ہے۔

دانت کی ساخت۔ دانت مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ (۱) ڈینٹین

(dentine) جسکے اوپر (ج) مینا (enamel) ٹوپی کی طرح چڑھا ہوتا ہے۔ اور مینا کے اندر ایک مرکزی کہنہ مغز ہوتا ہے۔ جسکے اندر (ج) مغز (pulp) ہوتا ہے۔ جبر (root) یا دانت

مدفون حصہ کے ارد گرد ایک غلیظہ ہوتی ہے جو جلبہ حجریہ (crusta petrosa) کے نام سے موسوم ہے۔ اور یہ ایک وقت میں ایک گرد سنی غشا (periodontal membrane) کے ذریعہ سے مثبت ہوتی ہے۔

نمو۔ مینا (enamel) فم الاصلی (stomodæum) کے برنا ہاض (epiblast)



کی ایک دروں بالید سے لیا رہوتا ہے۔ اور ڈینٹین (dentine) میان ناہضی سنی حلیمہ کی سطح کے اوپر خاص خلیات (سنی ناہضات: odontoblasts) کی فعالیت سے نموداتی ہے جن پر شاخدار زائڈ ہوتے ہیں جو ڈینٹین (dentine) کے انیمیبات میں سے تشع ہوتے ہیں۔ مغز (pulp) سنی حلیمہ کا بقیہ حصہ ہوتا ہے۔ اور شاخدار خلیات سے مرکب ہوتا ہے اور اس میں دانت کا عصب اور اس کی شریان اور ورید ہوتی ہے۔ دوران نمو میں جنینی دانت ایک سنی ناچس (dental sac) میں ہوتا ہے جو جو فیزہ میں مدفون ہوتا

شکل ۴۔ جنینہ کا نمو جنینی زندگی کے پہلے چھ مہینے میں۔
 ۱۔ ایریب۔ ۲۔ سوزا۔ ۳۔ میزاب۔ ۴۔ سنی شلف کا خط۔ ۵۔ جلی دروں بالید۔ ۶۔ زبان۔ ۷۔ مستقل دانت کا نبیہ۔ ۸۔ مینا ناہض (ameloblast)۔ ۹۔ حلیمہ۔ ۱۰۔ چاند کی تراش۔ ۱۱۔ سنی ناچس۔ ۱۲۔ دودھ کے دانت کا ٹینا۔

ہے (شکل ۲۰)۔ مستقل دانت ان کلیوں سے پیدا ہوتا ہے جو نامی دودھ کے دانت کی لسانی طرف پر واقع ہوتی ہیں۔ یہاں ایک برنا ہاضی دروں بالید کی پیدا ہو جاتی ہے جس سے آئندہ مستقل دانت کا مینا بنتا ہے۔

مستقل داڑھیں سنی شلف (dental shelf) کے عقبی تطول سے پیدا ہوتی ہیں پہلی داڑھ دانتوں میں سے پہلا مستقل دانت ہوتی ہے۔ اسکو تقریباً چھٹے سال تک آنا چاہئے۔

سنی سلعات (odontomes) سات یا آٹھ قسم کے ناقص سنی نمو سے نتیجہ

پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر آدمی میں صرف تین قسمیں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) جرابی سنی سلعہ (follicular odontome) یا حامل سن دویر (dentigerous cyst)

جو سنی تاج (dental sac) کے برقرار رہنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں سنی تاج کا مابقی موجود ہوتا ہے جیسا کہ شعاع نگاری سے ظاہر ہوتا ہے (۲) سرطانی سنی سلعہ (epithelial odontome) یا جبرٹے کا تیفی دویری مرض (fibro-cystic disease of the jaw) جس میں بڑا مضمی عنصر کا نمو غلط طریقہ پر ہوتا ہے جس سے کثیر دویری سلعہ بن جاتا ہے اور (۳) سنی دویرہ (dental cyst) یہ ایک ناشپاتی مانتا ہے جو کسی سنی سنخ سے چسپیدہ ہوتا ہے جس میں اسی بوسیدگی کے امارات بالعموم موجود ہوتے ہیں۔ موصوف الذکر قسم عمومی طور پر ایک الہابی حاصل خیال کیجاتی تھی، مگر اب اسے اکثر سرطانی سنی سلعہ کی ایک قسم تصور کیا جاتا ہے (سجے - جی۔ ٹرنر: J. G. Turner) کیونکہ سیمبیاتی نقطہ نگاہ سے اسکا اسٹریپٹ قامت مکعبی خلیات سے مرکب ہوتا ہے۔ جراحی اور عظیم امت سنی سلعات چاہے پر نہایت کثرت سے اثر انداز ہوتے ہیں سنی دویرہ اوپر کے جبرٹے میں کثرت سے واقع ہوتا ہے اور دانت نکالتے وقت اسکی جبرٹے سے چپکا ہوا بعض اوقات سالم باہر نکل آتا ہے۔

بہشت

منہ۔ زبان۔ حنک اور بلعوم

منہ

لب۔ جن بڑی بڑی ساختوں سے لب مرکب ہوتے ہیں انہیں آپس میں باہر کی طرف سے لیکر اندر کی طرف کو مندرجہ ذیل تعلقات پائے جاتے ہیں۔ (۱) جلد۔ (۲) سطحی ردا۔ (۳) عضلہ محیطۃ الفم (orbicularis oris)۔ (۴) ثنوی (labial) (اکلیل: coronary) عروق۔ (۵) مخاطی غدد اور (۶) غشائے مخاطی۔

لب کا آزاد کنارہ بہت حساس ہوتا ہے اور بہت سے انتہائی بصلات والے اعصاب یہاں آکر ختم ہوتے ہیں جو لمبی جسمات (tactile corpuscles) کے مشابہ ہوتے ہیں۔ بالائی لب کو پانچویں عصب کی دوسری قسمت حس پہنچاتی ہے اور زیرین لب کو تیسری قسمت۔ ان ثنوی اعصاب کے اوپر اکثر غلہ کی ایک فصل نمودار ہو جاتی ہے (غلہ ثنوی: herpes labialis)۔

لبوں میں بہت سی انصافی بافت موجود ہوتی ہے اور کوٹنگی یا التهاب یا تہج سے انہیں معتد بہ ورم پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت حرکت پذیر ہوتے ہیں اور ایک معتد بہ فاصلہ تنک ہر قسم کی عظمی پسیدگی سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لبوں کے تباہ کن التهاب اور جرم کے ایسے نقصانات سے جو شدید استراقات میں پائے جاتے ہیں منھ کا بہت سا انقباض

اور بدشکل پیدا ہو جائے گی۔ مزید برآں منہج کے قرب و جوار میں منقبض ہونے والے ندبات سے لبوں کے کھینچنے کا احتمال ہوتا ہے جس سے یہ یا تو باہر کی طرف مڑ جاتے ہیں اور یا اسی قسم کی دوسری بدشکلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ منہج کے ارد گرد کی بافتوں کا ڈھیلا پن اور اس حصہ کی عمومی عروقیات سے بہت سے ترقیعی علیوں میں جو ان بدشکلیوں کو رفع کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں کامیابی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

166

کثیر العروق ہونے کی وجہ سے لب اکثر نامات (naevi) اور دیگر عرقی ملعات کا محل ہوتے ہیں شفوی ثریا میں کثیر الجسامت ہوتی ہیں اور ان کا نمضان لب کی جھکی بھرنے سے بالعموم محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ عروق عضلہ محیطہ الفم (orbicularis oris) کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ اور اسلٹے یہ جلد کی نسبت ششائے مخاطی سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ جب لب کی اندرونی سطح کسی ضرب کی وجہ سے دانستہ کے مقابل سے کٹ جائے ہے تو ان ثریاؤں کے زخمی ہو جانے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ زخم نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں اسلٹے ان سے پیدا شدہ زخف کی وجہ سے بعض اوقات تشخیص میں غلطی پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ ایریچسن (Erichsen) ایک مخمور آدمی کا واقعہ بیان کرتا ہے جو ایک ایسے ہی زخم کا موضوع تھا اور جس نے وہ خون جو ایک شفوی ثریاں سے بہتا تھا نکل کر خون کی تہ کی تھی۔ اس کے متعلق کچھ عرصہ کے لئے یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ کسی اندرونی ضرب کا مریض ہے۔ چونکہ شفوی ثریاؤں میں نقصانات بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اسلٹے جب کبھی شفوی ثریاں کٹ جائے تو اس کے دونوں سروں کو باندھنا بالعموم ضروری ہوتا ہے۔

مخاطی غدود جو زیر مخاطی ساخت میں پائے جاتے ہیں عظیم الجسامت اور کثیر التعداد ہوتے ہیں۔ ان غدود کی قناتوں کے بند ہو کر متدد ہو جانے سے دودھیا نیلگوں مخاطی دویرے (mucous cyst) پیدا ہو جاتے ہیں جو لبوں پر بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

لب زیرین کی تمغی مسیلیت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے شکر (chancre) کا ایک امتیازی خاصہ یہ ہے کہ زبردستی غدود قبہ نما شکل میں کلانی یافتہ ہو جاتے ہیں چنانچہ اس چہرہ کا خاکہ عجیب طور پر متغیر ہو جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو ٹھنڈیاں ہیں۔ مزید برآں نیچے کے لب پر سرطانی سلحہ بھی عام طور پر واقع ہوتا ہے، اگرچہ اُس زمانہ کی نسبت یہ شائد اب قلیل الوقوع ہے جبکہ کھردری نئی والے مٹی کے چھوٹے چھوٹے پائپ زیادہ استعمال کئے جاتے تھے۔ اس کتاب کے ایک سابقہ ایڈیشن میں ٹریویر (Treves) نے یہ بیان کیا تھا کہ ”سرطانی سلحہ جسم کے کسی دوسرے

حصہ کی نسبت نیچے کے لب میں زیادہ کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ مگر اب یہ بیان صحیح ثابت نہیں ہوتا جبکہ زبان اور مری کا سرطلی سلعہ زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ نیچے کے لب کے عروق لمف ٹھڈی اور نیچے کے جھٹے کی فرع پر سے گزر کر زیر ذقنی (submental) اور زیر چانوی (submandibular) غد میں چلے جاتے ہیں۔ موصوفہ الذکر میں سے بہت سے زیر فکی (submaxillary) ریتی غد میں مدون ہوتے ہیں (دیکھو شکل ۵ صفحہ ۲۲۸)۔


وی کی شکل کے شکاف کو جوب کے سرطلی سلعہ اور اسکے لمفی میدان کو علیحدہ کر نیچے لئے بہت متروج ہے ترک کر دینا چاہئے۔ کیونکہ اس سے ان لمفی عروق کے شامل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ جو زیر فکی غدہ کی طرف جاتے ہیں اور جن میں سے بعض تو زیر ذقنی خط میں سے گزرتے بھی نہیں۔ شکاف کے اطراف مستحق ہونے کی بجائے منفرج ہونے چاہئیں، گو اس طریقہ سے بعد میں کناروں کے نزدیک لانے میں دقت پیش آتی ہے جسکی وجہ سے سرجن کو ٹھڈی کے ڈھکنے کے لئے ترقیبی ترکیبوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ مزید برآں اگر سرطلی سلعہ کچھ دہن کے نزدیک یا اسکے اوپر واقع ہو تو شکاف میں اوپر کے لب کے کچھ حصہ اور رخسار کی ہم پہلو بافتوں کو شامل رکھنا چاہئے تاکہ ان عروق لمف کو جو سرطانی غلیات کے حامل ہیں کاٹنے اور اس طرح مرض کے بار دیگر متقب ہونے کا خطرہ نہ رہے اس جگہ بھی جیسا کہ دوسرے مقامات پر کیا جاتا ہے ابتدائی بالید اور اس کی لمفی سیلیت کے تمام میدان کو ضرور ایک سالمہ تودہ کی شکل میں کاٹ کر علیحدہ کر دینا چاہئے۔ لہذا یہ ظاہر ہے کہ زیر فکی ریتی غد کا بھی ایک یا دونوں طرف پراثیر کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں غد کا دور کر دینا دانشمندی ہے کیونکہ بعض اوقات عروق لمف زیر ذقنی خط کو عبور کر جاتے ہیں۔ ”ترگو شلی لب“ (hare-lip) نیچے کے لب میں درز دار حک (cleft palate) کے موضوع میں پایا جاتا ہے۔

خدی کہفہ (buccal cavity)۔ منہ کے اندر کا امتحان کرتے وقت مندرجہ

ذیل امور کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ منہ کے فرش پر قید اللسان (frenum linguae) کی ہر ایک طرف تخت اللسانی حلیہ جات (sublingual papillae) و ہارٹن (Wharton) کی قنات کے فحات کے ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں۔ ہارٹن (Bartholin) کی قنات (جو تخت اللسانی غدہ کی قناتوں میں سے ایک ہے) زیر چانوی (وہارٹن کی Wharton's قنات

آخری حصہ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، اور یہ یا تو اسی کے ساتھ مل کر کھلتی ہے اور یا اسکے بہت نزدیک کھلتی ہے۔ یہ قنات خاص طور پر تند و ناپذیر ہوتی ہے۔ اور اس سے اس شدید درد کے محسوس ہونے کی جو انکے کسی حصہ سے مسدود ہو جانے پر پیدا ہوتا ہے کسی حد تک توجیہ ہوتی ہے۔ اس قنات اور لسانی عصب (lingual nerve) کا قرب بھی بعض حالتوں میں درد کا باعث ہوتا ہے۔ زیر چانوی غدہ غشائے مخاطی کے نیچے سے جڑے کے زاویہ کے ذرا سامنے شناخت کیا جاسکتا ہے، خاص کر جبکہ اسکو باہر سے اوپر کی طرف کو دبایا جائے۔ منہ کے فرش پر جو فیروزہ اور زبان کے

168



شکل ۴۱۔ زبان اور چانہ میں سے گزرتی ہوئی تراش، زیر لسانی غدہ اور لسانی شریان کو ظاہر کر نیچے لئے۔

(پوآئیر: Poirier کے مطابق)

مقدمہ حصہ کے درمیان غشائے مخاطی کا ایک بخوبی نمایاں جید ہوتا ہے، جس کا نام زیر لسانی شنیہ (plica sublingualis) ہے جو زیر لسانی حلیہ کی طرف کو جو قید اللسان کے قریب واقع ہوتا ہے آگے کی طرف اور اندر کی طرف کو ترچے رخ میں جاتا ہے۔ یہ زیر لسانی غدہ کے محل (شکل ۴۱) اور نیز اپنے تمام طول میں زیر چانوی قنات کے مرا اور لسانی عصب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ساختیں معہ زیر لسانی شریان کے غشائے مخاطی کے نیچے اس غدہ اور زبان کی ایک جانب کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ زیر لسانی غدہ کی قناتیں جو دس سے لیکر بیس تک ہوتی ہیں غشائے مخاطی کے مذکورہ بالا حید کے ساتھ ساتھ منہ میں کھلتی ہیں۔

ضعفہ (ranula) جو مخاطی مشمولات سے ہر ایک ٹیلگوں دویری ملحق ہوتا ہے

زیر لسانی غدہ کے محل پر قید اللسان کی ایک طرف دیکھنے میں آتا ہے۔ اسکی اصل مشتبہ ہے اور اسے مخاطی غدہ یا زیر لسانی غدہ یا بلینڈن (Blandin) اور نوہن (Nuhn) کے راسی لسانی غدہ کی قنات کے اسناد سے مختلف طور پر منسوب کیا جاتا ہے۔ اور گلو سٹن (Galveston) کا باشندہ تھا مسن (Thomson) اس امر کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ضفدعہ (ranula) بعض اوقات عنقی یا تحت الفکی دو بیروں کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں یہ عنقی جوف (cervical sinus) کے جو نمونہ پانے والی گردن میں دیکھنے میں آتا ہے ایک حصہ کا غیر مسدود باقی ہوتا ہے جو اپنے مناسب محل سے علیحدہ ہو کر بارہویں عصب کے تفرع کے عضلات کے زبان میں منتقل ہونے کے دوران میں آگے کی طرف کو چلا آتا ہے۔

جہاں منہ کے فرش کی غنائے مخاطی مسوڑوں پر منعکس ہونے کے لئے آگے بڑھتی ہے وہاں یہ جڑے کے اوپر کے کنارے کے پاس ہی اس سے چسپیدہ ہوتا ہے (تکمل ۴۱)۔ یہاں بھی بعض مخاطی غدہ واقع ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات دویرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عضلہ ذقنیہ لسانیہ (genio-glossus) ایک نیچے کے کنارے کے نزدیک چسپیدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں ساختوں (غنائے مخاطی اور عضلہ) کے درمیان ٹلو (Tillaux) کے قول کے مطابق ایک چھوٹی سی فضا ہوتی ہے جس کا استر فلسما فی سر حلقہ کا ہوتا ہے۔ اس کہفہ کو زیر لسانی درجہ (sublingual bursa) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مرکز پر یہ قید اللسان کی وجہ سے مضیق ہوتا ہے۔ اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ”حاد ضفدعہ“ (acute ranula) میں فساد کا مقام یہی ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی کی توجیہ ضفدعہ (ranula) کے تھا مسن (Thomson) کے مذکورہ بالا نظریہ سے کی جاسکتی ہے۔

جب منہ کو وسیع طور پر کھولا جائے تو جنبی چانوی (pterygo-mandibular) ربا^ط غنائے مخاطی کے نیچے آسانی سے نظر آسکتا ہے اور محسوس بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ سب سے پھل دار ڈھ کے پیچھے سے ترچے رخ میں نیچے کی طرف کو جاتا ہوا ایک نمایاں شکن کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ جہاں یہ رباط چانہ سے چسپیدہ ہوتا ہے اس سے ذرا نیچے اور سامنے کی طرف لسانی عصب جو ہڈی کے نزدیک اخیر کی دائرہ کے عین نیچے واقع ہوتا ہے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ عصب اس مقام پر جہاں یہ ہڈی سے ملا ہوتا ہے کاٹا بھی جاسکتا ہے اور پچکپکاری کی سوئی سے بھی اس تک رسائی کیجا جاسکتی ہے۔ یہ عصب اس مقام پر جہاں یہ ہڈی کے ساتھ ملا ہوتا ہے نیچے کی دائرہ کو جو ہڈی سے

طریقہ سے نکالنے میں یہ جھٹے کے پھسلنے سے کچلا جا چکا ہے۔

نیچے کے جبرے کا اکلیل نما زائیدہ (coronoid process) منہ میں سے آسانی سے نکال سکتا ہے اور اس ہڈی کے مفلوج ہونے پر یہ خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے۔

آخری دائرہ اور چاندنی فرج کے درمیان بعض اوقات ایک اچھی خاصی فضا موجود ہوتی ہے جسے راستہ سے فلک سببی یا جبرے کی جباۃ (ankylosis) کے دوران میں مرض کو غذا

دیجا سکتی ہے۔ خلقی ادمیہ نما اور درقی دویرے (congenital dermoid and thyroid cysts)

بعض اوقات منہ کے فرش میں ادنیٰ چمکے جبرے کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ ایسے دویروں کے متعلق یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی حشوی (visceral) یا پس چانوی (postmandibular) درز کے ناقص طور پر بند ہونے سے رونما ہوتے ہیں یا یہ وسطانی درقی بالید کی کسی ضال کلی سے پیدا ہوتے ہیں۔

مسوڑے بسترے محکم اور کثیر العروق ہوتے ہیں۔ دانت نکالنے پر جو خون نکلتا ہے وہ زیادہ تر انہیں سے خارج ہوتا ہے۔ مسومیت سیما میں مسوڑے خاص طور پر متاثر ہو جاتے ہیں اور نیز سقر بوط (scurvy) میں بھی یہ ماؤف ہو جاتے ہیں۔ سیسہ کی مزمن مسومیت میں انہیں حاشیوں پر اکثر ایک نیلی لکیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ لیڈ سلفائیڈ (lead sulphide) کے مسوڑوں کی بافتوں میں فراہم ہوجانے سے مندرجہ ذیل طریقہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دانتوں پر جو فاسفل غذا جمع ہو جاتے ہیں انکی تحلیل سے ہائیڈروجن سلفائیڈ (hydrogen sulphide) پیدا ہوتا ہے اور یہ اس سیسہ پر جو خون میں دورہ کر رہا ہے عمل کرنے سے اس مطروح کو پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلی لکیر ان اشخاص میں نہیں ہوتی جو دانت صاف رکھتے ہیں۔ سبمتہ (bismuth) کی مسومیت میں بھی بعض اوقات اسی قسم کی لکیر پائی جاتی ہے۔

زبان

زبان کی برین سطح پر قید اللسان (frenum) سے ۱/۲ انچ سے کم فاصلہ پر فٹائے غامی کی

نیچے صفندی ورید (ranine vein) (رفیق تحت اللسانی: comitans hypoglossi) کا سرا دیکھا جاسکتا ہے۔ غشاء مخاطی کے دوسرے طرف اور شکن دار خط بھی اس عضو کی پرین سطح پر دیکھے جاسکتے ہیں جو زبان کی نوک کی طرف مستقیم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ صفندی (ranine) شریان (عمیق لسانی: deep lingual) کے محل کو نکال کر کہتے ہیں، جو ورید کی نسبت جسکے یہ قریب ہی واقع ہوتی ہے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زبان کی مستعرض تراش میں صفندی شریان (ranine artery) نیچے کی سطح ۳ تا ۴ ملی میٹر کے فاصلہ پر زبان کے اسی نصف کی مستعرض تراش کے وسطی اور اندرونی ثلثوں کے مقام اتصال پر پائی جاتی ہے۔ اس امر کا علم زبان کے کسی حصہ کو دروں دہنی طرف منقسم سے لسانی شریان کو باندھنے کے بغیر علیحدہ کرتے وقت مفید ثابت ہوتا ہے۔

زبان کے خلقی نقص نہایت ہی نادر الوقوع ہیں۔ بعض اوقات اسکی نوک میں ایک بے قاعدہ درز موجود ہوتی ہے اور یا اسپرندی سعدانے موجود ہوتے ہیں جو شاید اُن غد سے پیدا ہوتے ہیں جو زبان کی نوک کے نیچے ضعیف طور پر موجود ہوتے ہیں۔

شاذ شاذ حالتوں میں قید اللسان غیر طبعی طور پر چھوٹا ہوتا ہے۔ اور عقدۃ اللسان (tongue-tie) پیدا ہو جاتا ہے جو حقیقت میں بہت قلیل الوقوع عارضہ ہے۔ عضلہ ذقنیہ لسانیہ (genio-glossus) جو زبان کا خاص عضلہ ہے اور عضلہ ذقنیہ لامیہ (genio-hyoid) ارتفاق کے ذقنی (genial) (منثل: mental) درز جات سے نکلتے ہیں۔ زبان ان چسپید گیوں کی وجہ سے جو ارتفاق کے ساتھ ہوتی ہیں پیچھے کی طرف گرنے سے رُکی رہتی ہے۔ اگر ان چسپید گیوں کو کاٹ دیا جائے تو زبان الٹائی اور گھلی بھی جاسکتی ہے۔ مکمل عدم حیثیت میں جیسی کہ کلورو فارم سے پیدا ہوتی ہے جب زبان کی تمام عضلی چسپید گیوں کو اصل پر لٹ جاتی ہیں تو اسے پیچھے کی طرف کو گر جانے اور کبھی (epiglottis) کو دبا دینے کا احتمال ہوتا ہے جس سے دم گھٹ جاتا ہے۔

زبان محکم ہوتی ہے اور اسکی بافت گھنی ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی اسکی تصانی بافت کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے جسکی وجہ سے یہ ملتبہ ہونے پر بہت متورم ہو جاتی ہے۔ سطحی سرطانیہ دبیز ہوتا ہے اور اس عضو کے مزمن سطحی التهاب میں یہ اکثر مجتمع ہو جاتا ہے اور گھنی غیر شفاف تہوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے مثلاً غصبتۃ اللسان (ichthyosis linguae) اور لکچیا (leucoplakia) بیاض (leucoma) وغیرہ۔ ان مخاطی غد سے جو خاص طور پر غشاء مخاطی کے نیچے زبان کے قاعدہ کے نزدیک واقع ہوتے ہیں، مخاطی دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات اس حصہ میں دیکھنے میں

آتے ہیں۔

زبان بہت کثیر العروق ہوتی ہے۔ اور اسلئے اس میں اکثر شامی بالیدیں پیدا ہو جاتی ہیں اسکی

زیادہ تر رسد لسانی **شریان** (lingual artery) سے آتی ہے۔ یہ عرق اس عضو تک اسکی

زیرین سطح سے پہنچتا ہے۔ اور شریان سباتی (carotid) سے عظم لامی (hyoid) کے لیول پر نکلتا ہے اور وسطی مضیق (middle constrictor) کو دوشکی عضلہ (digastric) کے نیچے سے عبور کر کے

عضلہ لامیہ لسانیہ (hyo-glossus) کے نیچے اور عضلہ ذقنیہ لامیہ لسانیہ (genio-hyo-glossus) کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر تحت اللسانی (hypoglossal) عصب اس سے اوپر واقع ہوتا

ہے۔ اور اس سے عضلہ لامیہ لسانیہ (hyo-glossus) کے ذریعہ سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر اس مقام پر شریان مذکور کو باندھنا مقصود ہو تو یہ عصب ایک مفید رہنما کام دیتا ہے۔ مگر چونکہ ٹھہری لسانی (dorsalis lingual) شاخ بعض اوقات اس مقام سے اور آگے جا کر نکلتی ہے اس لئے اس

172

شریان کو یہاں باندھنے سے زبان کے موخر حصہ کے جریان خون کو بند کرنے میں ناکامی ہو سکتا تھا۔ لہذا اس عرق کو اس مقام کے قریب جہاں یہ شریان سباتی (carotid) سے نکلتا ہے

باندھنا زیادہ قرین عقل ہوتا ہے۔ لسانی شریان سباتی (carotid) سے علیحدہ مقام پر نکلتے کے علاوہ گاہے گاہے فوقانی درقی (superior thyroid) یا وجہی (facial) شریان کے ساتھ بھی

نکلتی ہے۔ بعض اوقات یہ تینوں شریانیں ایک مشترک تنے سے نکلتی ہیں۔ چونکہ فوقانی درقی (superior

thyroid) شریان کو بلا ضرورت باندھنا مقصود نہیں ہوتا اسلئے جراح کو اس شریان کی ابتدا کو بھی

محرک کر لینا چاہئے تاکہ اسے اس امر کا یقین ہو جائے کہ وہ صرف لسانی شریان کو ہی مسدود کر رہا ہے۔

زبان میں **عضبی رسد** اکثریت سے موجود ہوتی ہے اور عام احساسات اور ذائقہ کے

احساسات دونوں تیز ہوتے ہیں۔ ویبر (Weber) کے مطابق لمسی حس پذیری جسم کے کسی اور حصہ کی نسبت زبان کی نوک پر زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس عضو کے موخر ثلث سے دونوں قسم کے معمولی اور

ذایقہ کے ریشے لسانی بلعومی (glosso-pharyngeal) عصب میں جاتے ہیں۔ اور مقدم دوہٹا

کو لمسی ریشوں کی رسد عصب لسانی سے ملتی ہے اور ذائقہ کی رسد جل طبعی (chorda tympani)

سے حاصل ہوتی ہے جو عصب لسانی میں مخلوط ہوتا ہے نیم قمری عقدہ کے استیصال کے بعد ذائقہ

غیر متاثر رہتا ہے کیونکہ جو ریشے اس جس کو سراخام دیتے ہیں وہ عصب لسانی میں جبل لمبلی (chorda tympani) کے ذریعہ سے پہنچتے ہیں۔ مگر الذکر عصب میں سے کچھ حسی ریشہ جات بھی ضرور جاتے ہیں کیونکہ نیم قمری عقدہ کے استعمال کے بعد بھی زبان کے مقدم دو تہائی حصوں میں کسی قدر حس پذیری باقی رہ جاتی ہے اگرچہ درد کی حس پذیری مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ جس رقبہ کو عصب لسانی سے رسد پہنچتی ہے اسکے درد غیر حواری میں مریض کو منفذہ گوش کے خطہ کے عمیق حصوں میں اکثر شدید درد محسوس ہونے سے تکلیف ہوتی ہے اور جلد کا ایک رقبہ کان سے یکسر جڑے کے نیچے کے کنارے کے ساتھ بعض اوقات الیم ہوتا ہے (ہیڈ: Head)۔ زبان کا مقدم دو تہائی حصہ چانوی محرا (mandibular arch) سے مشتق ہوتا ہے۔ اور منفذہ کی مقدم حد بھی اسی سے طیار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کے مقدم حصہ کی عصبی رسد کا جو پانچویں عصب کی تیسری قسمت سے آتی ہے درد محمولہ اسکے جلدی اختتام میں ہوتا ہے۔ زبان کا موخر دو تہائی حصہ دوسری (لامی: hyoid) اور تیسری حشوی محراوں سے مشتق ہوتا ہے اور اسکا تعلق حنجرہ کے اوپر کی جلد کے الیم رقبہ جات سے ہوتا ہے (ہیڈ: Head)۔

173

مضغی عضلات کا شعبی انقباض بعض اوقات درد غیر لسانی قروح کے ساتھ پایا جاتا ہے جبکہ یہ عصب ذوقی کے خطہ میں پائے جائیں۔ قذالی خطہ کے خراج اور زبان کے نصف حصہ کی لاغری میں بظاہر کوئی تعلق نہیں پایا جاتا مگر سر جیمز پیجٹ (Sir James Paget) نے مندرجہ ذیل واقعہ کی اطلاع دی ہے:۔


”ایک آدمی کے سر کے پچھلے حصہ پر چوٹ آگئی جو بظاہر شدید نہیں تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد زبان کا دایاں نصف لاشعہ ہونا شروع ہو گیا اور لاغری ترقی کرتی گئی حتیٰ کہ یہ غیر متغیر جانب کے نصف سے بھی کم رہ گیا۔ اس کے بعد قذال پر ایک خراج بن گیا جس میں سے عظم قذالی کے تین بیں حصہ کے ٹکڑے نکالے گئے۔ مردہ ہڈی کے دور کرنے کے بعد زبان اپنی پہلی حالت پر آنا شروع کر دیا اور ایک ہینڈ میں اسکی حالت تقریباً لمبی ہو گئی۔“

یہاں ذبول لسانی عضلات کی لاغری سے پیدا ہوا تھا جو زیر لسانی (hypoglossal) عصب پر جو عظم قذالی کے مقدم قذالی سوراخ سے نکلتا ہے دباؤ پڑنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس واقعہ سے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے اور ان سے جو ساختیں گزرتی ہیں ان کے بھی یاد رکھنے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

زبان میں بہت سی لمفی بافت موجود ہوتی ہے اور اس کا معتد بہ حصہ (لسانی لوزہ: lingual tonsil) اس عضو کے موخر حصہ پر غنائے مخاطی کے نیچے مجتمع ہوتا ہے۔ اس بافت کی

بیش پرورش سے بعض اوقات حساس کمبی میں خراش پیدا ہونے کی وجہ سے تکلیف دہ علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لسانی اور بلعومی غدہ آسافٹ اور حقیقی لوزتین سے حلقوم کی خاکن اُسے کے ارد گرد لمفی بافت کا ایک مکمل حلقہ بنجاتا ہے۔

لسانی عروق لمف (نکسل ۴۲) عظیم الجسامۃ اور کثیر المتعدد ہوتے ہیں اور



نکسل ۴۲۔ زبان کے عروق لمف۔

(پوئیر Poirier کے مطابق۔)

سرطانی سداوت کے منتشر ہونے کے لئے ایک کھلے مجرئی کا کام دیتے ہیں۔ یہ دونوں نظام میں مرتب ہوتے ہیں۔ (۱) سطحی جن سے زبان کی پشت اور اسکے جوانب پر زیر مخاطی بافت میں ایک تہائی کثیر العروق صفیرہ بنتا ہے۔ (۲) عمیق جو زبان کے عضلی نظام میں ایک جال کی شکل میں مرتب ہوتے ہیں۔ ان دونوں نظام میں آزاد راہ و ربط موجود ہوتا ہے۔ چیٹل (Cheatle) نے یہ دریافت کیا ہے کہ زبان کے سرطان کی حالتوں میں ذقنی لسانی عضلہ (genio-glossus) نمانوی مطروح کا ایک عام مہل ہوتا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا کہ خبیث خلیات زبان کے قاعدہ کی سمت میں بہت نیچے تک پائے جاتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرطان کا استیصال زبان کی سطح پر اور اسکی گہری بافتوں میں ایک سولفی حاشیہ کے ساتھ ضرور کرنا چاہئے۔

ان دونوں نظامات سے لطف برآر عروق کے مندرجہ ذیل گروہوں کے ذریعہ سے جاتا ہے: (۱) حاشیائی یا جانبی عروق جو زبان کی جانب سے زیر مخاطی ضغیرہ سے باہر جاتے ہیں۔ انہیں سے کچھ عدد کے زیر چانوی گروہ میں اور بقیہ بالائی عمیق عنقی گروہ میں جاتے ہیں، (۲) مرکزی عروق جو دو ذقنی لسانی (genio-glossus) عضلات کے درمیان بنتے ہیں اور بالائی عمیق عنقی غدد میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں، (۳) راسی عروق جو زیر ذقنی غدد اور بالائی عمیق عنقی غدد میں ختم ہوتے ہیں، (۴) قاعدی عروق جو زبان کے موخثلث میں سے آتے ہیں بالائی عمیق عنقی گروہ میں ختم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے عروق لطف سرطانی غلیات کے حملہ سے مسدود ہو جاتے ہیں اسلئے لطف کو ثانوی گزرگاہیں اور پمپ کے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں اور یہ بھی کچھ عرصہ کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سرطانی حملہ وسیع رقبہ اور بہت سی سمتوں میں پھیل جاتا ہے جو لمبی غدد زیر چانوی غدد کے اوپر واقع ہیں اور نیز جو اس میں مدفون ہوتے ہیں وہ بھی اور اس غدد اور زیر لسانی غدد کی لطف آسا بافت ثانوی مطروح کا محل بن جاتی ہے۔ مزید برآں زیر ذقنی غدد بھی ماؤف ہو جاتے ہیں۔

اس حیرت انگیز خلقی عارضہ میں جو کبر اللسان (macroglossia) کے نام سے موسوم ہے زبان بہت کلائی یافتہ ہو جاتی ہے اور بعض حالتوں میں یہ بہت ہی عظیم الابعاد ہوتی ہے۔ اسکی کلائی کی اصلی وجہ اس کے لمبی مجاری کی بہت ہی تنوع حالت ہے۔ [اسی لئے فرکو (Virchow) نے کہنی لمبی وعائی سلمہ (lymphangioma cavernosum) کا نام تجویز کیا تھا] اور نیز تمام زبان میں لمبی بافت کا افزودہ نہ ہوتا ہے۔ جو حصہ نمایاں ترین طور پر متاثر ہوتا ہے وہ زبان کا قاعدہ ہے جہاں عروق لطف بالعموم سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ چند حالتوں میں کبر اللسان (macroglossia) زیادہ تر عضلی ہوتا ہے۔ اور بعض میں دموی عائی (haemangioma) بھی اسکا باعث ہوتا ہے۔

زبان کے قریب کے معین غدد۔ وہ معین غدد جو جسم درقی سے تعلق

لہ عروق لطف کے مفصل بیان کے لئے دیکھو پوائے ریئر (Poirier) کی کتاب "لمفٹکس" (Lymphatics) متر سیل لیف (Cecil Leaf) ۱۹۰۳ء۔

رکھتے ہیں اکثر عظم لامی (hyoid bone) کے قرب وجوار میں پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ان میں یہ زبان کے قاعدی حصہ میں سوراخ اُحور (foramen cæcum) کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں (Makins)۔ بعض کبھی کبھی عضلہ چانیہ لامیہ (mylo-hyoid muscle) سے اوپری ہونے میں اور بعض عظم لامی کے عین اوپر ہوتے ہیں اور بعض گاہ گاہ اس ہڈی کے خالی حصہ میں پائے جاتے ہیں بعض اوقات انہی محلات پر ایسے دورے بھی پائے جاتے ہیں جنکا استرہد بہ دار سر حلقہ کا ہوتا ہے۔ یہ تمام ساختیں اس مرکزی عطفہ کی عنق کا مابقا ہوتی ہیں جو مضغہ میں بلعوم کی اُکلی دیوار سے بروز کرتا ہے! درجس سے غدہ درقیہ کی خاکنائے اور اسکا متصلہ حصہ بنتے ہیں۔ زبان پر کا سوراخ اُحور (foramen cæcum) اس مقام کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے عطفہ مذکور بلعوم سے نکلتا ہے۔ ایسی قناتیں بھی پائی گئی ہیں جو سوراخ اُحور سے نکل کر ان معین غدہ تک جاتی ہیں جو عظم لامیہ کے قرب وجوار میں واقع ہوتے ہیں اور جنکا استرہد سر حلقہ کا ہوتا ہے۔ ان غدی اور مرحلی اجتماعات سے جو عظم لامی کے قرب وجوار میں پائے جاتے ہیں گردن کے سرطان کی بعض گہری واقع ہونے والی قسین بھی پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں سے بعض خمیث دویروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جنکا ذکر مصنف نے کیا ہے (Treves Path. Soc. Trans. 1886)۔

176

استیصال - سالم زبان کو دور کرنے کے مختلف طریقہ اختیار کئے گئے ہیں۔

یہ منہ میں سے حرارت رسانی (diathermy) کے چاقو یا قینچی سے دور کیا جاسکتی ہے۔ موزن الذکر عملیہ گردن میں لسانی عروق کو باندھنے کے ساتھ یا باندھنے کے بغیر بھی کیا جاتا ہے۔ مگر اس عضو کی زیادہ گہری چسپیدگیوں کو منہ میں سے جو مقابلہ ایک چھوٹا سوراخ ہے مکمل طور پر معرکہ نامشکل ہے۔ گنجائش بڑھانے کے لئے ایک طریقہ عمل میں رخسار میں شکاف دیا جاتا ہے اور ایک میں نیچے کے لب کو اور نیچے کے جڑے کے ارتفاق کو کاٹا جاتا ہے۔

عملیہ جات کے ایک اور سلسلہ میں عظم لامیہ اور چانے کے درمیان شکاف دیگر زبان تک رسانی کی گئی ہے اور یا اسے مکمل طور پر معرکہ بھی کر لیا گیا ہے کاختر (Kocher) نے گردن میں سے زبان کو متکشف کر نیکاطریقہ رائج کیا تھا۔ اس میں جس شکاف سے زبان تک رسانی حاصل کی جاتی ہے وہ کان سے شروع ہو کر قصی حلی (sterno-mastoid) عضلہ کے مقدم کنارہ کے ساتھ ساتھ عظم لامی تک جاتا ہے! اور یہاں سے یہ دو ٹکسی عضلہ (digastric) کے مقدم بطن کے ساتھ ساتھ

اور پوکو چلا جاتا ہے۔ اس طریقہ سے لسانی شریان کو ابتدا ہی میں باندھ کر زف پر مکمل طور پر قابو حاصل کر لینے کے علاوہ بالائی گہرے عقی غدد لمفی غدد اور زیر چانوی اور زیر لسانی غدد کے اوپر کی اور انکے اندر کی بافت کو جو ثانوی سرطانی مطروحات کا محل ہوتے ہیں باسانی دور کیا جاسکتا ہے۔

سالم عضو کے دور کرنے میں مندرجہ ذیل ساختیں لازمی طور پر کاٹی جاتی ہیں۔ قید اللسان غشائے مخاطی زبان کے اطراف کے ساتھ ساتھ، لسانی لمبی شکل (glosso-epiglottic folds) عضلہ ذقنیہ لسانیہ (genio-glossus)، عضلہ لامیہ لسانیہ (hyo-glossus)، عضلہ ابیریہ لسانیہ (stylo-glossus)، عضلات حنکیہ لسانیہ (palato-glossus muscles) اور فوقانی اور تحتانی لسانی عضلات کے جو عظم لامی سے چسپیدہ ہوتے ہیں چند ریشہ جات، لسانی، لسانی بلعومی اور تحت اللسانی اعصاب کی انتہائی شاخیں، لسانی عروق اور زبان کے اطراف پر اس کے قاعدہ کے نزدیک صعودی بلعومی (ascending pharyngeal) شریان کی اور وہی شریان کی لوزی (tonsillar) شاخ کی چند شاخیں۔

حنک

(PALATE)

حنک الصلب (hard palate) کی محراب کی بلندی اور شکل مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے۔ جنکو جوانی میں غدودہ (adenoids) کی شکیات رہی ہو انہیں یہ خاص طور پر تنگ اور بلند ہوتی ہے۔ حنک پر جو عملیہ جات کئے جاتے ہیں انکے سلسلہ میں اس محراب کے خاکہ کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔

حنک مشقوق (cleft palate) حنک اور اوپر کے لب میں درز کے جو

مختلف اقسام پائے جاتے ہیں انکو سمجھنے کے لئے ان حصوں کے نموکا مختصر اعادة کرنا ضروری ہے کیونکہ حنک مشقوق (cleft palate) اور "خرگوشی لب" (hare-lip) کے تمام اقسام حصوں کے غیر مکمل اتحاد سے پیدا ہوتے ہیں۔ فصل ۴۳-۱ میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ عظمی حنک بوقت پیدائش تین عناصر سے مرکب ہوتا ہے: (۱) پیش فکی (premaxillary) (os incisum: عظم تنیتی)

جسم چار شنیایا ہوتے ہیں، (۲) دایاں فکی، (۳) بایاں فکی جن پر دائیں اور بائیں کچلیاں اور دوڑ کی ڈاڑھیں ہوتی ہیں۔ یہ تینوں حصے مختلف الاصل ہوتے ہیں۔ پیش فکی حصہ وسطانی انفی زائڈہ (medial nasal process) سے (شکل ۱۳ صفحہ ۱۳۶) اور فکی حصے دائیں اور بائیں فکی زائڈوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان مختلف عناصر کا اتحاد جس سے حنک طیار ہوتا ہے اگلے حصے سے شروع ہو کر پیچھے کی طرف کو جاتا ہے۔ فکی زائڈے حنک کے موخر دو تہائی حصوں میں ایک دوسرے سے



شکل ۳۳ جانبی ثنیہ کا تعلق حنکی درز سے ظاہر کرتی ہے۔

ا۔ حنک الصلب لمبی۔ پیش فک پر نقطے لگے ہوئے ہیں۔ جانبی ثنیہ اسکے اور فک کے درمیان کی درز (suture) میں پایا جاتا ہے۔

ب۔ دو جانبی حنک مشقوق۔ جانبی ثنیہ پیش فک پر درز کی اندر کی جانب واقع ہے۔ ناک کا فاصل فکی ہڈیوں کے درمیان کی درز میں منکشف ہے۔

ج۔ دو جانبی حنک مشقوق۔ جانبی ثنیہ درز کی باہر کی جانب فک پر واقع ہے۔

خط وسطی میں متحد ہو جاتے ہیں۔ مگر اگلے ایک تہائی حصے میں یہ پیش فکی حصہ سے مل جاتے ہیں۔ چنانچہ خط اتحاد وائی (Y) کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور پیش فکی حصہ اسکی دونوں شاخوں پر واقع ہوتا ہے۔ درز اکثر حالتوں میں وائی (Y) کے اصلی تنہ پر واقع ہوتی ہے یا اس سے صرف حنک الرخوی متاثر ہوتا ہے، یا یہ ایک یا دونوں اطراف پر آگے کی طرف کو جو فیروزہ تک پہنچتی ہوتی ہے، جیسا کہ شکل ۳۳ ب اور ج میں ظاہر کیا گیا ہے۔ جانبی ثنیہ پیش فکی اور فکی عناصر کے درمیان کے میزاب میں نمو پاتا ہے۔ اگر حنک مشقوق (cleft palate) کی حالت نمودار ہو جائے تو یہ نمو عناصر بالیدگی کے ساتھ ساتھ علحدہ ہوتے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جو درز بخاتی ہے اسکی ایک نہ ایک جانب سے

جانبی ثنیہ کی کلی چپکی ہوتی ہے لہذا بعض حالتوں میں یہ ثنیہ فکی زائدہ پر پایا جاتا ہے اور بعض حالتوں میں فکی پر ہوتا ہے (شکل ۳۴ ج-ج)۔ ہر ایک پیش فک میں بعض اوقات عظمت کے دو مراکز ہوتے ہیں۔ مگر جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے درز عظمت کے مراکز کے عدم اتحاد کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ حنک کے نوی حصوں کی علیحدگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ زمانہ طفولیت میں بالیدگی میں جوں جوں ترقی ہوتی جاتی ہے درز زیادہ چوڑی ہوتی جاتی ہے۔

اوپر کے لب کا نموانہی تین عناصر سے ہوتا ہے جن سے کہ حنک کا ہوتا ہے (شکل ۳۱ صفحہ ۱۳۶)۔ اگر حنکی درز جو فیہ تک پہنچ جائے تو لب بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ مگر حنک پر درز موجود ہونے کے بغیر بھی ایک یا دونوں لبوں پر درز واقع ہو سکتی ہے۔ لب کا پیش فکی یا وسطی عنصر ہی اپنی اصل میں دو جانبی ہوتا ہے۔ مگر اسکے دونوں حصوں کی مستقل علیحدگی کا پایا جانا نہایت ہی نادر وقوع ہے۔ دو جانبی ترگوشتی لب (hare-lip) میں گاہے گاہے بچے کے لب پر دو ملیہ جات دیکھے میں آتے ہیں، جو لبوں کے اقتراب کی حالت میں اوپر کے لب کی درزوں میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جاتے ہیں۔

جو غشائے مخاطی حنک الصلب کی پوشش ہوتی ہے اس میں ایک عجیب بات

یہ ہوتی ہے کہ وہ اور گردِ عظمتہ جو ان ہڈیوں کا خلاف ہوتا ہے تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس غشا کی تقطیع کے بعد ہڈی مبرا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس غشائے مخاطی اور گردِ عظمتہ کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ غشا خط وسطی میں پٹلی ہوتی ہے۔ مگر جانبین پر جو فیہوں کے قریب بہت دبیز ہوتی ہے۔ اور دبازت کی زیادتی کا انحصار زیادہ تر وسطی تہوں کے نیچے مخاطی غدود کی ایک تعداد کے موجود ہونے پر ہے۔ ایسے غدود خط وسطی پر موجود نہیں ہوتے۔ جب حنک الصلب کی نرم پوشش کی تقطیع دامنوں کی شکل میں کی جاتی ہے جیسا کہ مشقوق حنک کے علیہ میں کیا جاتا ہے تو اسکی کثافت اور سختی کی وجہ سے اسکی دست درزی بہت آسان ہوتی ہے۔

سر ریکمن گودلی (Sir Rickman Godlee) نے متعدد واقعات ایسے بیان کئے ہیں جن میں حنک الصلب کے نیچے کی سطح کے موخر حصہ میں ایک عظمی ارتفاع یعنی حنکی منسرق (torus palatinus) پایا جاتا ہے۔ یہ ارتفاع یا عظمی بروں بالیدگی (exostosis) یورپیوں کی نسبت دوسرے اقوام میں زیادہ عام ہوتی ہے۔ اور سین بلوغ کی ابتدا پر بننا شروع ہوتی ہے۔ یہ حنک کی وسطی درز (suture) کے دونوں اطراف پر ہڈی کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے، اور استثنائی حالتوں میں یہ اچھے خاصے ابعاد اختیار کر لیتی ہے۔

حنک الصلب کی ہڈیوں اور اسکی مخاطی پوشش کی زیادہ تر سرد خون

داخلی فکلی شریان (internal maxillary artery) کی نزولی حنکی (descending palatine) شاخ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ عرق جسے حنک الصلب کا صرف ایک ہی عرق کہا جاسکتا ہے حنک الصلب اور حنک الرخو کے مقام اتصال کے نزدیک اور آخری ڈاڑھ کی اندرونی جانب کے پاس ہی موخر حنکی قنال سے نکلتا ہے۔ اور آگے کی اور اندر کی طرف کو جا کر مقدم حنکی قنال پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسکا نبضان حنک پر اکثر واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ حنک الصلب سے مکشط (raspatory) کے ذریعہ سے مخاطی گرد عظمی دامنوں کی تقطیع کرتے وقت یہ نہایت ضروری ہے کہ ابتدائی شکاف غنائے مخاطی میں جو فیہ کے قریب دیا جائے تاکہ یہ دامن شریان مذکور پر مشتمل رہے اور اس وجہ سے اسکی حیویت محفوظ رہے۔ دامن کی تقطیع کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ شریان غنائے مخاطی کی نسبت ہڈی کے زیادہ قریب سے جاتی ہے۔


180

حنک الرخو (soft palate) کی دبازت یکساں ہوتی ہے۔ اور اسکی اوسط پیمائش کا

اندازہ تقریباً ۴ انچ کیا گیا ہے۔ اسکی دبازت کا زیادہ تر انحصار مخاطی غد کے ایک طبقہ پر ہے جو اسکی بالائی سطح پر ہوتا ہے۔ اسکا مرکزی اساس ایک وتری پھیلاؤ یعنی حنکی مفاق (palatal aponeurosis) ہے جس میں حنک کے ناشرات ختم ہوتے ہیں اور جسکے ذریعہ سے یہ حنک الصلب کے موخر کنارہ سے چسپیدہ ہوتے ہیں۔ جب حنک الرخو خلعی طور پر مشقوق ہوتا ہے تو اس شقاق کی کوریں نکلنے کے دوران میں فوقانی مضیق (superior constrictor) کے بالاترین ریشہ جات ذریعہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ اس قرب کی وجہ سے یہ درز تنگ ہو کر نصف یا دو تہائی رہ جاتی ہے۔ جن عضلات کا رجحان درز کو عریض کرنے کی طرف ہوتا ہے ان میں سے زیادہ اہم رافع الحنک (levator palati) اور ناشر الحنک (tensor palati) ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جب رز کو عملیہ سے بند کرنے کی کوشش کی جائے تو ان عضلات کو کاٹ دیا جائے۔ رافع الحنک (levator palati) خط وسطی کی طرف کو آتا ہوا حنک کو ترچھے رخ میں اوپر نیچے کی اور اندر کی طرف کو عبور کرتا ہے اور یہ مقنعہ (velum) کی زیریں سطح کی نسبت بالائی سطح کے زیادہ نزدیک واقع ہوتا ہے۔ ناشر الحنک (tensor palati) خطینی زائڈ (hamular process)

کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے اور خط وسطی کی طرف کو تقریباً افقی رخ میں چلا جاتا ہے (شکل ۲۴)۔
خطیفی زائیدہ اوپر کی پھجلی ڈاڑھ کے عین پیچھے اور اسکے اندر کی طرف کو حنک الرخو میں سے محسوس
کیا جاسکتا ہے۔ جب مخالمی گرد عظم جسمیں موخر حنکی عروق ہوتے ہیں درز کی دونوں اطراف پر
حنک الصلب پر سے اوپر اٹھایا جاتا ہے جس سے کہ حنک کے افقی صفحہ کا موخر کنارہ منکشف ہو جاتا
ہے تو عملیہ کن انفی جانب پر حنکی صفاق اور اسکے اوپر کی غشائے مخالمی کو عظم الحنک سے ملحدہ کر دیتا،

181



شکل ۲۴۔ حنک الرخو کے عضلات پیچھے سے۔

(بلیک وے: Blakeway)

اور اس امر کی احتیاط رکھنا ہے کہ موخر حنکی قنال اور حنکی عروق تک نہ پہنچے۔ جب صفاق کاٹ دیا
جاتا ہے تو ناشتر الحنک (tensor palati) کا فعل کسی حد تک معطل ہو جاتا ہے۔ رافع الحنک
(levator palati) کے کاٹنے کا بہترین مقام وہ ہے جہاں یہ حنک الرخو کی بالائی سطح میں
غشائے مخالمی کے ایک اٹھے ہوئے ٹکڑن کے اندر سے داخل ہوتا ہے۔ اسکا عصب اسکے بالائی
سرے میں داخل ہوتا ہے اور اس لئے یہ سرے سے بچ جاتا ہے (بیری اور لیگ: Berry and
Legg)۔

چونکہ مناسب سکلم کا انحصار زیادہ تر حنک الرخو کے کافی بڑا اور پکھلا رہونے پر ہے

جس سے کہ انہی بلعوم مرضی کے موافق منہ کی طرف سے بند ہو سکتا ہے اسلئے درز دار حنک پر عملیہ کرتے وقت اس ضرورت کو پورا کرنے کی ضرور احتیاط کرنا چاہئے۔ حنک الصلب کے اندر کے مقبب کو مقنعہ (velum) کے صرفہ سے نہ بند کرنا چاہئے۔

حنک الرخو کی رسد خون، داخلی فکی ثریان کی نزولی حنکی (descending)

(palatine) شاخ صعودی بلعومی (ascending pharyngeal) شریان، اور وجہی (facial) شریان کی صعودی حنکی (ascending palatine) شاخ سے حاصل ہوتی ہے۔ یوخالذکر عرق مقنعہ (velum) تک عضلہ رافع الحنک (levator palati) کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور مذکورہ بالا طریق عمل میں اُس عضلہ کی تراش میں اس کا کاٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔

حنک الرخو کے عضلات کو مختلف اعصاب رسد پہنچاتے ہیں بلع الحنک

(levator palati)، عضلہ لہاتیہ فردیہ (azygos uvulae) اور عضلہ حنکیہ بلعومیہ (palato-pharyngeus) کو عضلات بلعوم کے ساتھ شوکی معین (spinal accessory) سے اور عضلہ حنکیہ لسانیہ (palato-glossus) کو عضلات زبان کیساتھ تحت اللسانی (hypo-glossal) سے اور عضلہ ناشرہ حنکیہ (tensor palati) کو عضلہ ناشرہ طبلیہ (tensor tympani) کیساتھ پانچویں عصب کی تیسری قسمت سے اذنی عقدہ (otic ganglion) کے راستہ رسد پہنچتی ہے۔

بلعوم

(PHARYNX)

بلعوم کا طول تقریباً ۵ انچ ہوتا ہے۔ یہ ایک جانب سے دوسری جانب کو آگے سے پیچھے کی نسبت بہت زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔ اور عظم لامی کے قرن اعظم کی نوک کے لیول پر یہ بعض بڑے ہوتا ہے۔ یہاں اسکی پیمائش ۲ انچ ہوتی ہے۔ جہاں یہ مری سے مغز حلقی (cricoid cartilage) کے لیول پر ملتا ہے وہاں یہ تنگ ترین ہوتا ہے اور اسکا قطر ۳ انچ سے بھی کم ہوتا ہے۔ بلعوم

اتنی بڑی فضا نہیں ہے جتنی کہ یہ فرض کی جاتی ہے۔ کیونکہ (یہ یاد رکھنا ضروری ہے) زمانہ حیات میں اسکو بہت ترچھے رخ میں دیکھا جاتا ہے اسلئے اس کے پیش پس ابعاد کے متعلق بہت مغالطہ خیز خیالات پیدا ہو گئے ہیں۔ دانتوں کی محراب سے لیکر مری کی ابتدائیک کا فاصلہ تقریباً ۶ تا ۷ انچ ہوتا ہے۔ اور اس پیمائش کو اجام غریبہ کے کالئے وقت یاد رکھنا چاہئے۔ بلعوم میں جو اجسام غریبہ داخل ہو جاتے ہیں انکے حلقہ بنی غضروف کے لیول پر اٹک جانے کا سب سے زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اور یہ مقام بالغ میں انگلی کی پہنچ سے ذرا آگے ہوتا ہے۔ بلعوم میں اجام غریبہ کے اٹک جانے کی روئاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہف بہت اتساع پذیر ہے۔ اور اس میں بڑی بڑی چیزوں کے کچھ عرصہ تک موجود رہنے کی گنجائش موجود ہے۔ بلعوم کی دیواریں کھوپری کے قاعدہ اور اوپر کے چھ عنقی فقرات سے علاوہ رکھتی ہیں۔ اطلس (atlas) کی محراب اور حنک الصلب تقریباً ایک ہی خط میں ہوتے ہیں۔ اور محور (axis) اوپر کے دانتوں کی آزاد کور کی سیدھ میں ہوتا ہے۔ بلعوم کا انتہائی سراچھے عنقی فقرہ کا متناظر ہوتا ہے۔ جہاں تک مقدم سطح کا تعلق ہے بالائی فقرات کا امتحان منہ میں سے کیا جاسکتا ہے۔ جب بلعوم کے قریب کی ہڈیوں میں مرض نمودار ہوتا ہے تو متحر حصے اس کہف میں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اطلس (atlas) اور محور (axis) کے حصے منہ میں سے باہر نکل چکے ہیں۔ نیز قذالی اور وتدی ہڈیوں کے مقابلہ بڑے بڑے ٹکڑے بھی اسی طرح خارج ہو چکے ہیں۔

بلعوم کی غشائے مخاطی عرق دار ہوتی ہے اور باسانی ملہب ہو جاتی ہے اور ایسے التهابات اسلئے کہ انکے حنجروہ کی استری غشائیں پھیل جانے کا امکان ہوتا ہے، خاص طور پر خط ناک ہونے میں۔ سوجنہ نما کبھی شکلوں (aryteno-epiglottic folds) اور بلعوم کے اس حصے کو انکے قرب وجوار میں ہوتا ہے زیر مخاطی بافت خاص طور پر ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے۔ اور بھیجی حالتوں میں حنجروہ کا بالائی روزن بعض اوقات تقریباً بند ہو جاتا ہے۔

بلعومی عطفہ (pharyngeal diverticulum) گاہے گاہے اس کی

موضع دیوار سے اس کے زیر ترین حصہ پر جہاں یہ مری سے مل جاتا ہے یعنی حلقہ غضروف (cricoid cartilage) اور چھٹے عنقی فقرہ کے لیول پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں یعنی بلعوم کے تنگ ترین حصہ پر کوئی بڑا سالتہ پیچھے کی طرف کو دب سکتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ممکن ہے کہ

تحتانی مضیق (inferior constrictor) اور سرلوی (cesophageal) عضلات کے درمیان کوئی کمزور جگہ موجود ہو اس حالت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عضلہ میں سے غشائے مخاطی کا قفق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اپنے مشمولات کے دباؤ سے نیچے کی طرف کو بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ نہیں بلکہ عام طور پر بایں جانب پیدا ہوتا ہے اور انجام کار یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جس نذیر ورم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسکا منہ بالائی سرلوی دہنہ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسلئے غذا اور تشخصی ذراؤں ہر دو کا رجحان مری کی نسبت اس عطفہ میں داخل ہونے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے عطفات کے مشمولات بہت بدبودار ہوتے ہیں۔ لہذا عملیہ کرتے وقت اس جیب کو اکثر دو مراحل میں علیحدہ کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلہ میں تاچہ نکشف کر لیا جاتا ہے اور زخم میں سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور دوسرے میں آتنا عرصہ گزرنے کے بعد اسے دور کر دیا جاتا ہے جتنا کہ اریبی بافت کے پیدا ہونے اور اتصالی استویوں کے بند ہو جانے کے لئے کافی ہو اس طرح انتشار سرائت جو نیچے کی طرف گردن یا شاید منصف ہائے مدری میں ہو جائے رک جاتا ہے۔

184

بلعوم کی غشائے مخاطی میں بہت سی غدہ آسا بافت (adenoid tissue) منقسم

ہوتی ہے۔ اور التهاب بلعوم (pharyngitis) کے مختلف اقسام میں بھی بافت التهاب کا ابتدائی محل ہوتی ہے۔ انفی بلعوم (nasopharynx) کی چھت میں غدہ آسا بافت کا ایک نمایاں اجتماع یعنی بلعومی لوزہ (pharyngeal tonsil) پایا جاتا ہے (دیکھو شکل ۲۸ صفحہ ۱۲۱)۔ یہ دبیر غشائے مخاطی میں مدفون ہوتا ہے اور ناک کے فاصل کے قاعدہ سے لیکر کھوپری کے قاعدی زائده کے نقطہ وسطی تک پہنچتا ہے۔ لوزہ کے مرکز پر ایک ششاق یا انخفاس کا نشان ہوتا ہے جو غشائے مخاطی کے دو یا تین ٹکٹوں سے جنہیں غدہ آسا بافت با فراط موجود ہوتی ہے گھرا ہوتا ہے۔ تقریباً دسویں سال میں یہ اپنی اعظم جسامت تک پہنچتا ہے۔ جانب پر یہ ان گوشوں کی طرف چلا جاتا ہے جو یوسٹیکین (Eustachian) نلیوں کے پیچھے واقع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ان گوشوں کے اوپر تک چلا جاتا ہے اور اس طرح مذکورہ نلیوں کے آزاد فتح کو بند کر دیتا ہے۔ غدہ آسا بافت کے اس مطروح میں بعض اوقات بیش پرورشی تغیر واقع ہو جاتا ہے اور وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جو ”غده آسا روئیدگی“ (adenoid vegetations) یا ”پس انفی بالیدوں“ (post-nasal growths) کے نام سے موسوم ہے۔ ان بالیدوں سے بہر اپن پیدا ہو سکتا ہے اور بعض اوقات

موخر منخرین بھی بند ہو جاتے ہیں۔ انکو عملیہ سے دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی رسد چھوٹی چھوٹی شریانوں سے آتی ہے جو داخلی فکی شریان (ویدیوسی: Vidian) اور جنیجی جنکی (pterygo-palatine) اور صعودی بلعومی (ascending pharyngeal) سے نکلتی ہیں۔ انکی وریدیں بلعومی ضغیرو سے ملتی ہیں اور انکے عروق لطف پس بلعومی غد میں سے ہو کر عمیق عسقی غد میں جا کر خالی ہوتے ہیں۔

بلعومی دیواروں کی باہر کی جانب کے ساتھ کی بافت ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے اور یہ انتشار انصبا کی مساعدت کرتی ہے۔ چنانچہ یہ مشاہدہ میں آچکا ہے کہ بلعوم کے حاد التهاب میں انصبا بمری کے ساتھ ساتھ منتشر ہوتا ہوا موخر منصف تک پہنچ جاتا ہے اور نیز ذایا فرام تک بھی بڑھ جاتا ہے۔


185

بلعوم کے پیچھے جو ڈھیلی ڈھالی بافت موجود ہوتی ہے اسیں پس بلعومی خراج کی

دوا اہم قسمیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ شکل ۹۴ صفحہ 201 کے متعلق اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ گردن کی ایک بلند تر لیول پر کی تراش ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ بلعوم کے پیچھے کچھ فضائی بافت موجود ہے جس میں عروق لطف اور لمفی غد موجود ہوتے ہیں اور اسکے پیچھے پیش فقری ردا اور پیش فقری عضلات اور عسقی عمود کی ہڈیاں ہیں۔ پس بلعومی خراج خاص کر بچوں میں پیش فقری ردا کے آگے کی لمفی بافت میں پیدا ہو سکتا ہے یا اور بلعومی دیوار کو آگے کی طرف کو دھکیل دیتا ہے جس سے حنک الرخو مخفض ہو جاتا ہے اور یا بھر نمودار ہو جاتا ہے۔ ایسا خراج بالعموم حاد اور غیر تدرئی ہوتا ہے اور ہڈی سے اسکا تعلق نہیں ہوتا۔ اسکو منہ میں سے کھول کر اسکا تخلیک کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ سانس کے ذریعہ سے پیپ کے اندر نہ جانے کے متعلق احتیاط کی جائے۔ خراج کی دوسری قسم شوک کے تدرئی مرض سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پیش فقری ردا کے پیچھے واقع ہوتی ہے۔ چونکہ خراج کو عفونت دار منہ میں سے کھولنے سے اس میں مخلوط سرائت کا پیدا ہونا یقینی ہوتا ہے جس سے شوک کی مرض شدید ہو جاتا ہے اسلئے دہنی راستہ ہرگز اختیار نہ کرنا چاہئے۔ مولہ بالاشکل کو بار دگر دیکھنے سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس قسم کے خراج کو عضلہ قصیہ حلیمہ (sterno-mastoid) کے پیچھے شکاف دینے اور اس عضلہ اور سباتی خلا (carotid sheath) اور پیش فقری ردا کو آگے کی طرف کو کھینچنے کے بعد چھٹی یا پچھری کی ٹونٹی داخل کرنے سے خالی کیا جاسکتا ہے (اور بعد میں بند بھی کیا جاسکتا ہے)۔

بہت سی اہم ساختیں بلعوم کی جانی دیوار سے علاقہ رکھتی ہیں اور ان میں سے زیادہ اہم

داخلی سباتی (internal carotid) شریان عصب تائبہ (vagus) لسانی بلعومی (glosso-pharyngeal) اور تحت اللسانی (hypo-glossal) اعصاب ہیں (شکل ۳، صفحہ ۱۸۴)۔ داخلی سباتی شریان بلعوم کے اتنی نزدیک ہوتی ہے کہ منہ میں انکلی ڈال کر اسکا نبضان محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ اور گردن کی دوسری عمیق ساختیں بعض اوقات ایسے اجسام غریبہ سے جو منہ کے اندر کی طرف سے بلعوم میں سے عنقی بافتوں میں داخل کئے جائیں زخمی ہو سکتی ہیں۔ داخلی وراچی (internal jugular) ورید بلعوم سے خاص کر اسکے بالائی حصہ میں



شکل ۳۵۔ حلقوم کے ستونوں اور لوزہ کی تصویر۔


کچھ فاصلہ پر ہوتی ہے (شکل ۳، صفحہ ۱۴۸)۔ زائدہ ابریہ (جس حالت میں کہ یہ نمایاں ہو) اوپر نیز متعظم ابری لائی (stylo-hyoid) رباط بھی لوزہ کے مین پیچھے بلعوم کی جانب پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ایک سے زائد واقعات میں متعظم رباط غلطی سے جسم غریب تصور کر لیا گیا ہے اور اس کے استیصال کی کوشش کی جا چکی ہے۔

186

لوزہ (شکل ۳۵ و ۳۶) مقدم و مؤخر حنکی محرابوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ باہر کی طرف یہ فوقانی مضیق (superior constrictor) عضلہ سے تعلق رکھتا ہے (شکل ۳، صفحہ ۱۴۸)۔ اور جہاں تک اسکی سطح کا تعلق ہے یہ نیچے کے جڑے کے زاویہ کا ملاحظہ ہوتا ہے۔ جب اس میں بیش پرورش واقع ہو جاتی ہے تو اس تودہ کا رجحان خط وسطی کی جانب بڑھنے کی طرف ہوتا ہے

جہاں اسے کوئی مزاحمت پیش نہیں آتی اور اس کے خارجی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گردن کا وہ تودہ جو اکثر غلطی سے کلانی یافتہ لوزہ تصور کر لیا جاتا ہے کلانی یافتہ غد سے جو عظم لامي کے قرن اعظم کی نوک پر اور داخلی وراجی (internal jugular) ورید کے اوپر واقع ہوتے ہیں بنا ہوتا ہے۔ یہ غد لوزی عروق لمف وصول کرتے ہیں اور جب لوزی عوارض میں یہ تقریباً ہمیشہ کلانی یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ امر کہ جب غرقہ غد و تدرن زدہ ہوتے ہیں تو پہلے پہل

187



شکل ۴۶۔ لوزہ اور اسکے کیسہ اور تونہائے حلقوم میں سے افقی تراشش۔

انہی غد میں کلانی واقع ہوتی ہے لوزہ کے ابتدائی سرایت کا ایک عام محل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

لوزہ بلعومی دیوار سے اتنی مضبوطی سے چسبیدہ ہوتا ہے کہ یہ بلعومی عضلات کے حرکات متاثر ہوتا ہے (شکل ۴۶)۔ چنانچہ گلنگے کے فعل کے دوران میں فوقانی مضیق عضلا اسکو اندر کی طرف کو حرکت دیتا ہے اور بخلاف اسکے عضلا ابریہ بلعومیہ (stylo-pharyngeus) سے یہ باہر کی جانب کو کھینچ سکتا ہے۔ غد تک جس آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے اسکا انحصار بشرطیکہ دوسری حالتیں مساوی ہوں اس امر پر ہے کہ عضلا ابریہ بلعومیہ (stylo-pharyngeus) سے یہ کس حد تک کھینچ سکتا ہے۔

اور مقدم تنکی محراب جو اسکو کسیدر پوشیدہ کرتی ہے کتنی نمایاں ہے۔ جس بچہ کی مقدم تنکی محراب نمایاں ہو اور عضلہ تنکیہ لسانہ (palato-glossus) جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ کئی نمایاں ہو اور اسکا عضلہ ابریلومبیہ (stylo-pharyngeus) طاقتور ہونے کی گواہی دے (guillotine) بعض اوقات بہت عرصہ تک کارگر نہیں ہوتا۔ تاہم لوزہ سالم معہ منقسم کسیدہ کے نکالا جاسکتا ہے اور اسے نکالنا بھی اسطرح چاہئے جس حد تک لوزہ ستونوں کے لیول سے اوپر بڑھا ہوتا ہے اس سے اسکی حقیقی جسامت ظاہر نہیں ہوتی (پانی بس: Pybus)۔

لوزہ کی شکل اختلاف پذیر ہوتی ہے اور یہ اکثر تین تودوں میں منقسم ہوتا ہے۔ اکثر اکثر التعلہ طاقت جات کے علاوہ اسکے بالائی حصہ میں جہاں مقدم اور موخر ستون تنک الرخوسے ملتے ہیں ایک گوشہ یا جیب — لوزی گوشہ (tonsillar recess) — بھی ہوتی ہے۔ یہ گوشہ اُس پہلی تنوی درز کا جس میں لوزہ نے نمودار یا تھا بقیہ حصہ ہوتا ہے (سکب ہٹ: Secombe Hett)۔ مقدم ستون سے غشاء مخاطی کا ایک واضح اور باریک شکن جیمچے کی طرف کوجا کر لوزہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ مثلیہ مثلثی (plica triangularis) (شکل ۴۵) — اور ایک اور شکن بھی بعض اوقات لوزی گوشہ کے اوپر سے ستونوں کو لادیتا ہے (مثلیہ ہلالی: plica semilunaris) — لوزہ فوقانی مضیق (superior constrictor) سے ایک باریک لینی کسیدہ کے ذریعہ سے علحدہ ہوتا ہے (شکل ۴۶)۔ اس کے عروق لف عضلہ مضیق کو مشتب کرتے ہیں۔ لوزہ کی دو بڑی قسمیں سلیم کیجا سکتی ہیں: مدفون (embedded) جس میں غدہ آسافات میں ستونوں کے لیول کے نیچے زیادتی واقع ہو جاتی ہے اور منظر (projecting) جس میں یہ زیادتی زیادہ تکشف حصہ میں پائی جاتی ہے۔ (ایس۔ ہٹ: S. Hett)۔ کلانی یافتہ لوزہ اکثر بلعوم میں بخونی تخلیل کرتا ہے اور اس کے آزاد دسے کا رقبہ اس کے قاعدہ یعنی مدفون حصہ سے زیادہ ہوتا ہے لہذا لوزہ کو گلوٹین (guillotine) کے حلقہ میں داخل کرنے کے لئے حلقہ کو منظر لوزہ پر نیچے سے اوپر کی طرف کو پور دیا جائے اور پھر اسے اس طرح پھرا دیا جائے کہ چاقو زیادہ انتصابی سمت میں آجائے۔

عاذر (quinsy) میں فوق لوزی گوشہ میں خراج بن جاتا ہے اور تنک الرخوس سے یہ نہایت موثر طریقہ سے کھولا جاسکتا ہے۔

جب لوزہ بیش پروردہ ہو جائے تو بہرے پن کی بھی شکایت کی جاتی ہے۔ یہ بہرے پن یوسٹیکین نیلوی (Eustachian tube) کے کلانی یافتہ تودہ کے بلا واسطہ دباؤ سے بند ہو جاتے

پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے دباؤ کا پیدا ہونا تشریحی نقطہ نگاہ سے ناممکن ہے۔ مگر عظیم الجسامتہ لوزہ تک لوزہ میں خلل انداز ہونے کی وجہ سے نالی کے انفتاح پر اثر کرتا ہے اور اس کی وساطت سے عضلہ ناشتر الحنک (tensor palati) بھی متاثر ہو جاتا ہے جو یوسٹیکین (Eustachian) نلی کو کھلا رکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسی حالتوں میں بہرا پن دباؤ کے اثرات سے پیدا ہونے کی بجائے غالباً پیش پرورشی عمل کے استری غشائیک پہنچ جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ لوزہ کے دور کرنے کے کچھ عرصہ بعد تک بھی اس میں کچھ اصلاح نہیں ہوتی۔

لوزی بافت متعدد طاقیات کے ارد گرد زیادہ تر مجتمع ہوتی ہے (شکل ۴۶)۔ ان گوشہ جات میں مجوس سر حلی ساختوں کے تحلیل ہو جانے سے سانس بدودار ہو جاتا ہے جیسا کہ لوزہ کے کلانی یافتہ ہونے کی حالت میں اکثر پایا جاتا ہے اور الہتاب کے حملہ کو بھی جس کے ایسے لوزہ پر ہونے کا احتمال ہوتا ہے شاید یہی تحریک دیتا ہے۔ ان طاقیات میں بعض اوقات حصیات بھی بنجاتے ہیں اور ان سے شنجی کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں سانی (بلعومی - glosso-pharyngeal) عصب درآر سونی کو تنفسی مرکز تک لیجا جاتا ہے۔

لوزہ کثیر العروق ہوتا ہے اور اس کو خون وہی شریان کی لوزی اور حکی شاخوں سے اور داخلہ فکی (internal maxillary) کی نزولی حکی (descending palatine) شاخ سے اور سانی شریان کی شاخ ظہر اللسانی (dorsalis linguae) سے اور صوبی لہوی (ascending pharyngeal) سے آتا ہے۔ لہذا لوزہ کو دور کرنے کے عمل میں اکثر بہت سانسزف واقع ہوتا ہے۔ داخلہ سباتی (internal carotid) شریان بلعوم کے قریب واقع ہوتی ہے۔ مگر اس غدہ سے کسی قدر پیچھے ہوتی ہے (شکل ۴۷، صفحہ ۱۴۸)۔ یہ عرق در حقیقت جسم مذکور سے تقریباً ۱/۲ انچ پیچھے ہوتا ہے اور لوزہ کے استیصال کے دوران میں اس کے زخمی ہونے کا نسبتاً کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ داخلہ وداچی (internal jugular) ورید لوزہ سے معتد بہ فاصلہ پر واقع ہوتی ہے۔ وہی شریان اپنے عنقی درجہ میں لوزہ کے قریب واقع ہوتی ہے۔ اہم عنقی ساختوں میں سے سانی بلعومی (glosso-pharyngeal) عصب لوزہ سے قریب ترین ہوتا ہے۔ مزید برآں صوبی بلعومی عرق بھی اس سے قریبی علاقہ رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ عرق چوٹا سا ہوتا ہے مگر اسکا جریان خون ہلک ثابت ہو چکا ہے۔

لوزہ میں اکثر خصیئت بالیدیں مثلاً سر حلی سلعات اور لمفی لحمی سلعات بھی پیدا

ہو جاتے ہیں۔ ایسے سلعات منہ میں سے دور کئے جا چکے ہیں، مگر ان کا تدارک عضلہ قصیہ حلیہ (sterno-mastoid) کی مقدم کو رکے ساتھ ساتھ گردن میں شکاف دینے سے زیادہ مناسب طور پر کیا جاسکتا ہے (عملیہ چیور: Cheever's operation)۔

بائیں گردن

زیر چانوی خط میں جلد ڈھیلی اور باریک ہوتی ہے۔ لہذا منہ کے نزدیک ترقیعی عملیات میں یہ دامن بنانے کے لئے کارآمد ہوتی ہے۔ عضلہ منتشرہ (platysma myoides) اوپر کی طرف جہڑے سے چسپیدہ ہوتا ہے اور عقی جلد سے بخوبی ملا ہوتا ہے۔ زیر جلدی شحم کی مقدار گردن کے مختلف حصوں میں بہت مختلف ہوتی ہے۔ فوق لامی خط میں اس میں نوکے بافراط پائے جانے کا امکان ہوتا ہے اور اس سے ایک منتشر شحم سلعی مطروح پیدا ہو جاتا ہے۔ جو غبغبہ (double chin) کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح کے ایک منتشر شحمی تغیر کے زیر قذالی خط میں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے اور مختص المقام کیسہ بند شحمی سلعات میں کم اور گردن اور فوق ترقوی خط جات میں واقع ہونے کا بہت میلان پایا جاتا ہے۔ یہ سلعات زیر فکی اور سباتی (carotid) منتلتوں میں نادر الوقوع ہیں۔

گردن کی گڈی پر جلد موٹی اور منضم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیسلوں (furuncles) اور شب چراغوں (carbuncles) میں جو اس محل پر خاص کر ذیابیطس اور التهاب گردن کے مریضوں میں پائے جاتے ہیں آتنا شدید درد ہوتا ہے۔

سطحی تشریح - عظمی نقاط - مندرجہ ذیل مناظر لیول خاص کر شعاع نگاری کی عکسی تصویروں کے پڑھنے کے سلسلہ میں دلچسپی رکھتے ہیں:-

عظم لامی (hyoid bone) چوتھے عنقی فقرہ اور لسانی ثمریان کے خارجی سبباتی (external carotid) سے ٹپکنے کے مقام کی متناظر ہوتی ہے۔

درقی غضروف کا بالائی کنارہ چوتھے فقرہ کے بالمقابل مشترک سبباتی (common carotid) کے دو شاخوں میں تقسیم ہونے کے لیول کو ظاہر کرتا ہے۔

حلقی غضروف (cricoid cartilage) ان مقامات کا متناظر ہے:۔ چھٹے عنقی فقرہ کا بالا اور اس مقام کا جہاں مشترک سبباتی ثمریان عضلہ کمنٹیہ لامیہ (omo-hyoid) کو عبور کرتی ہے اور فقری ثمریان کے فقری ثمریانی سوراخ (vertebrarterial foramen) میں داخل ہونے کے مقام کا اور شے سے نیک (Chassaignac) کے سبباتی درنہ کے لیول کا جس کے بالمقابل مشترک سبباتی ثمریان کو زرف کی فوری ضرورت میں مضبوط کیا جاتا ہے (sternum) کا بالائی حاشیہ دوسرے اور تیسرے ظہری فقرات کے درمیانی قوس کے لیول پر ہوتا ہے۔

192

گردن کی پشت پر ایک وسطانی طولی میزاب ہوتا ہے جو قفائینہ (inion) سے لے کر ان فرازات کے درمیان سے جو ہر ایک جانب کے عضلہ منخرسہ (trapezius) اور عضلہ مرکبہ (complexus) سے بنتے ہیں نیچے کی طرف کو آتا ہے۔ اس کے بالائی حصہ میں گہرا دباؤ ڈالنے سے محور (axis) کا شوک ظاہر ہوگا اور اسکے نیچے وہ حید ظاہر ہوتا ہے جو تیسرے چوتھے پانچویں اور چھٹے عنقی فقرات سے بنتا ہے مگر شوک جات بالعموم فرداً فرداً تمیز نہیں کئے جاسکتے۔ گردن کی جڑ پر فقرہ مرتفعہ (vertebra prominens) کا شوک عام طور پر بہت نمایاں ہوتا ہے۔

اطلس (atlas) کا مستعرض زائده زائده حلیہ (mastoid process) کی نوک کے عین نیچے اور سامنے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ شوکی معین (spinal accessory) عصب اس زائده کے اوپر سے یا اس کے نیچے سے گزرتا ہے فوق ترقوی حمزہ (supraclavicular fossa) کے بالائی حصہ میں گہرا دباؤ ڈالنے سے ساتویں عنقی فقرہ کا مستعرض زائده شناخت کیا جاسکتا ہے۔ عضیل گردن کی افقی تراش میں جو چھٹے عنقی فقرہ کے لیول کے قریب سے لیگیٹی ہو اسی فقرہ کا تمام جسم تراش کے مقدم نصف میں دکھائی دیتا ہے۔

خط وسطیٰ۔ زیر ذقنی (submental) خط میں عظم لامی (hyoid bone) کا جسم

اور قرن اعظم محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اور اس سے ایک انگلی کی چوڑائی بھر نیچے درقی غضروف اور

اس سے نیچے حلقی (ericoid) غضروف، ملحق درقی فضا (crieo-thyroid space) اور قصبہ (trachea) شناخت کئے جاسکتے ہیں۔ قصبہ جوں جوں نیچے اترتا جاتا ہے عمقی ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ قص کے بالائی کنارہ پر سطح سے تقریباً ۱ انچ دور ہوتا ہے فتحة المزمار (rima glottidis) درقی غضروف کے مقدم حاشیہ کے وسط کا تناظر ہوتا ہے۔

193

غده درقیہ (thyroid gland) تا وقتیکہ کافی یافتہ نہ ہو بالتحقیق شناخت نہیں کیا جاسکتا۔ اسکی خاکنائے (isthmus) قصبہ (trachea) کے دوسرے تیسرے اور چوتھے حلقوں کو عبور کرتی ہے۔

مقدم و داجی وریدیں (anterior jugular veins) خط وسطی کی ہر ایک جانب پر عضلات قصیلمیہ (sterno-hyoid muscles) پر سے اترتی ہیں۔ یہ زیر چانوی خط میں شروع ہوتی ہیں اور ترقوہ کے اندرونی سرے کے عین اوپر روا کو منتقل کرتی ہیں اور عضلہ قصبیلمیہ (sterno-mastoid) کے مبداء کے نیچے سے گزر کر خارجی داجی (external jugular) میں ختم ہو جاتی ہیں۔ مقدم درقی وریدیں قصبہ (trachea) کے سامنے خاکنائے کے نیچے واقع ہوتی ہیں۔

گردن کی جانب (شکل ۲) - عضلات - عضلہ قصبیلمیہ

(sterno-mastoid muscle) خاکسکر دبلے اشخاص میں اور جبکہ یہ فعل کر رہا ہو کیلیاں خصوصیت رکھتا ہے۔ مریض کے ٹھڈی کو دوسری جانب اور نیچے کی طرف کو پھرانے سے جبکہ منحن کاٹا اسکی حرکت کی مزاحمت کر رہا ہو یہ عضلہ نمایاں کیا جاسکتا ہے۔ اسطرح یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آیا کوئی زیر بحث ورم اس عضلہ کے نیچے سے گزرتا ہے یا اوپر سے، اور آیا یہ اس سے آزاد ہے یا اس سے چسپیدہ۔ ایک رابطہ شاخ جو داجی ورید سے آتی ہے عام طور پر اس عضلہ کے مقدم کنارہ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اور مقدم و داجی ورید سے گردن کے نیچے کے حصہ پر مل جاتی ہے۔ اگر اس عضلہ کے قسمی اور ترقوی حصوں کے درمیانی وقفہ میں سے جو بالعموم بخونی نمایاں ہوتا ہے ترقوہ کے عین قریب سے ایک سوئی جھونک دیجائے تو یہ دائیں جانب پر اس مقام کو چھوٹگی جس پر لاسمی شریان و شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے اور بائیں جانب پر یہ سبائی عرق (carotid vessel) کے پار ہو جائے گی۔ دوشکمی عضلہ (digastric) کا موخر عظم اس خط کا تناظر ہوتا ہے جو زائده طلیہ (mastoid process) سے عظم لامی (hyoid bone) کے مقدم حصہ تک گھنیٹا ہے۔

عضلہ کتفبیہ لامیہ (omo-hyoid) کا مقدم شکم اس ترچھے خط کی متابعت کرتا ہے جو عظم لامی شکل ۴۷۔

104

یہ تصویر گردن کی جانب اور
سامنے کی طرف کی جانگاری
ظاہر کرتی ہے۔

(ہیٹزمن: Heitzmann)

کے مطابق)۔

۱۔ ایس افینی شریان ۲۔ وجہی

عصب ۳۔ عضلہ قصیہ علیہ

۴۔ قذالی شریان ۵۔ داخلی

سباتی شریان ۶۔ شوکی معین

عصب (عضلہ قصیہ علیہ سے

گزرتا ہے) ۷۔ داخلی وداجی

ورید ۸۔ عضلہ ابریہ لامیہ


۹۔ عینقی ضغیرہ ۱۰۔ لسانی شریان

۱۱۔ جبل شارکی ۱۲۔ نزولی

تحت اللسانی عصب ۱۳۔ عصب

تائیہ ۱۴۔ صعودی عینقی شریان

۱۵۔ ڈایا فرامی عصب



۱۶۔ عضلہ ضغیرہ ۱۷۔ عضلہ مختلف الاضلاع مقدم ۱۸۔ تحتانی درقی شریان ۱۹۔ فقری شریان ۲۰۔ مستعرض

منفی شریان ۲۱۔ فوقی کتفی شریان ۲۲۔ درقی مجری شریان ۲۳۔ زیر ترقوی شریان ۲۴۔ زیر ترقوی ورید ۲۵۔

ترقوہ ۲۶۔ عضلہ قصیہ لامیہ ۲۷۔ قصبہ ۲۸۔ مشترک سباتی شریان ۲۹۔ درقی غدہ ۳۰۔ عضلہ کتفبیہ لامیہ

۳۱۔ عضلہ قصیہ درقیہ ۳۲۔ فوقانی درقی شریان ۳۳۔ ظم لامی ۳۴۔ دوکبی عضلہ (مقدم شکم) ۳۵۔ عضلہ جانیہ لامیہ

۳۶۔ زیر ذقنی شاخ وجہی شریان کی ۳۷۔ تحت اللسانی عصب ۳۸۔ عضلہ لامیہ رائیہ ۳۹۔ وجہی شریان ۴۰۔ خاز

سباتی شریان ۴۱۔ عضلہ ابریہ بلعومیہ ۴۲۔ اندرونی کفی شریان ۴۳۔ سطحی صدغی شریان

اگلے حصہ سے نیچے کی طرف سباتی شریان (carotid artery) کے خط کو حلقی غضروف (cricoid cartilage) کے بالمقابل قطع کرتا ہوا کھینچا جائے۔ اس کا موخر شکم پتی گردنوں میں خاص کر جبکہ یہ فعل کر رہا ہو تو قود سے عین اوپر اور اسکے تقریباً متوازی گزرنا ہوا شناخت کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ عضلہ قصبیہ (sterno-mastoid) اور عضلہ مختلف الاضلاع مقدم (anterior scalene muscle) کے موخر کناروں کا رخ بالکل ایک سا نہیں ہوتا مگر پھر بھی یہ ایک دوسرے کے تقریباً متناظر ہوتے ہیں۔

- 195 عضلہ قصبیہ (sterno-mastoid) کی عصبی رسد شو کی معین (spinal accessory) (accessory) عصب اور دوسرے اوزنیرے غنتی اعصاب سے حاصل ہوتی ہے (صفحہ 198)۔
تدرن زدہ غد کا اور خا مسکران غد کا استیصال کرتے وقت اس کو ضرر پہنچ جاتا ہے جو داخلی وراجی ورید پر جڑے کے زاویہ کے پیچھے اور نیچے واقع ہوتے ہیں جہاں شو کی معین عصب (spinal accessory) کے گرد غدی التهابی بافت (periadeninitic tissue) میں پس جس جانے کا احتمال ہوتا ہے۔

کم عمر بچوں میں بعض اوقات اس عضلہ میں ایک محکم سلعہ پایا جاتا ہے اور یہ اس دموی سلعہ کے تعقیب کا نتیجہ ہوتا ہے جو بوقت پیدائش اسکے ریشوں کی دریدگی سے پیدا ہو جاتا ہے۔

عروق مشترک سباتی شریان (common carotid artery) اس خط سے

نظا ہر کی جاتی ہے جو قصبی تر قوی جوڑ سے لیکر چاند کے زاویہ اور حلی زائدہ کے درمیان فاسلہ کے نقطہ وسطی تک کھینچا جائے۔ یہ عروق درقی غضروف کے بالائی کنارہ پر دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ اس نقطہ سے $\frac{1}{2}$ انچ اوپر بھی تقسیم ہوتا ہے عضلہ کتفیہ لامیہ (omo-hyoid) اس کو حلقی غضروف (cricoid cartilage) کے بالمقابل یعنی چھ معنی فقرہ کے لیول پر عبور کرتا ہے۔ اور تقریباً اسی مقام پر اس شریان کو وسطی درقی ورید بھی کاٹی ہوئی گزرتی ہے۔ داخلی وراجی ورید (internal jugular vein) کا خط بڑی شریان کے خط سے عین باہر کی طرف ہوتا ہے۔ شریان اور ورید دونوں عضلہ قصبیہ (sterno-mastoid) کے مقدم کنارہ کے نیچے واقع ہوتی ہیں اور عمومی سباتی غلاف (general carotid sheath) میں بند ہوتی ہیں، جو عمومی غنتی ردا سے حاصل ہوتا ہے (دیکھو صفحہ 202)۔ اس غلاف میں مشترک

سباتی شریان (common carotid artery) (جو اپنے اصلی غلاف میں بند ہوتی ہے) داخلی و داجی ورید (internal jugular vein) اور عصب تائبہ (vagus) موجود ہوتے ہیں۔ موخر الذکر شریان اور ورید کے درمیان اور پیچھے سے نیچے کی طرف کوجاتا ہے۔ نزوی تحت اللسانی عصب (descendens hypo-glossi nerve) غلاف کی مقدم دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف کوجاتا ہے اور اسکے پیچھے عضلہ عنقیہ طویل (longus coli) پر یعنی مشارکی جبل (cervical sympathetic cord) واقع ہوتی ہے۔

چوتھے عنقیہ فقرہ کے لیول پر یعنی درقی غضروف کے بالائی کنارے پر مشترک سباتی شریان خارجی سباتی اور داخل سباتی شریانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ قبل الذکر موخر الذکر سے وسطانی اور مقدم تعلق رکھتی ہے اور نیز شاخوں کی موجودگی سے یہ اس سے تیز کیجا جاتی ہے۔


عظم لامی (hyoid) کے قرن اعظم کے لیول پر لسانی شریان (lingual artery) خارجی سباتی (external carotid) سے نکلتی ہے۔ فوقانی درقی (superior thyroid) کا مبداء اس سے نیچے اور وجہی شریان (facial artery) کا اس سے عین اوپر ہوتا ہے۔ فوقانی درقی (superior thyroid) آگے کی اور نیچے کی طرف کو خم کھا کر درقی غضروف کی بالائی کور کی طرف چلی جاتی ہے۔ لسانی شریان عضلہ لامیسانیہ (hyoglossus) (جو اوپر ہوتا ہے) اور عضلہ ذقنیہ لامیسانیہ (genio-hyo-glossus) (جو گہرا ہوتا ہے) کی درمیانی بین فضا کی طرف براہ صے پیشتر عظم لامی (hyoid) کے قرن اعظم کے موخر سرے سے اوپر ہمیشہ ایک چنبر بناتی ہے۔ اس مقام پر تحت اللسانی عصب (hypo-glossal nerve) جو عضلہ لامیسانیہ (hyo-glossus) سے اوپری ہوتا ہے، شریان کے محل وقوع کے لئے رہنا کام دیتا ہے (شکل ۳۸ صفحہ ۱۵۱)۔

وجہی شریان (facial artery) بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ مگر اسکا عمومی ممر گردن میں اُس خط سے ظاہر کیا جاتا ہے جو قرن اعظم کی نوک سے عین اوپر سے عضلہ مضغیہ (masseter) کے مقدم کنارہ تک کھینچا جائے۔ یہ زیر چانوی غدہ کے موخر قطب کے گرد گھوم جاتی ہے اور اس غدہ کو دور کرتے وقت اسکو باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قذالی شریان (occipital artery) اُس خط کی متابعت کرتی ہے جو قرن اعظم کی نوک سے لیکر نائزہ علیہ کے قاعدہ کو کاٹتا ہوا گزارا جائے۔

خارجی و داجی ورید (external jugular vein) اس خط کی متابعت کرتی ہے جو چانوی زاویہ سے لیکر ترقوہ کے نقطہ وسطی تک کھینچا جائے۔

زیر ترقوی شریان (subclavian artery) گردن کی جڑ پر ایک منحنی بناتی ہے (شکل ۲۸)۔ اس منحنی کا ایک سرا قوسی ترقوی جوڑ کا قناظر ہوتا ہے اور دوسرا ترقوہ کے نقطہ وسطی کا۔ منحنی کی چوٹی اس ہڈی سے تقریباً ۱/۲ انچ اونچی ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر یہ پہلی پسلی کے بیرونی کنارہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ بازو کی بڑی شریان کا عمومی عمر زیر ترقوی کے

197



شکل ۲۸۔ نیکل عضدی ضغیرہ، زیر ترقوی اور سباتی شریانوں کی وسطی ترسیموں کا قناظر ہے۔

ابتدائی منحنی کے بعد ایک خط سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو ترقوہ کے وسط سے غمراہی زاوہ (coracoid process) کے پاس سے گزرتا ہوا پیش مرفعی ضغیرہ کے نقطہ وسطی تک کھینچا جائے جبکہ بازو دھڑ سے زاویہ قائمہ پر مبعوث ہوا اور ہاتھ میں بطور ح۔ عضلہ مختلف الاضلاع مقدم (scalenus anticus) زیر ترقوی شریان کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلے حصہ تک جراحی نقطہ نگاہ سے مشکل سے رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسکے سامنے چوڑی واسطی ح۔ داجی ورید (internal jugular vein) عصب تاہیہ (vagus nerve) اور مشارکی کا ایک چنبر واقع ہوتے ہیں۔ دائیں جانب پر باز گرد جنبری عصب (recurrent laryngeal nerve) اسکے پیچھے سے چنبر بنا تا ہے! اور بائیں جانب پر صدری قنات (thoracic duct) کی ڈالنا منہا اس سے

قریبی تعلق رکھتی ہے۔ دوسرا حصہ عضلہ مختلف الاضلاع مقدم (scalenus anticus) کے پیچھے ہوتا ہے، جو اسکی متناظر وریڈ کے دوسرے حصہ کو اس سے علحدہ کرتا ہے۔ تیسرا حصہ مختلف الاضلاع مقدم (scalenus anticus) کے بیرونی کنارہ اور پہلی پسلی کے بیرونی کنارہ کے درمیان ترقوہ کے وسطی ثلث کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ خارجی و داجی وریڈ اور عضلہ کتقیہ لاسیہ (omo-hyoid) کا موضوع شکم اس سے مقدم تعلق رکھتے ہیں۔ زیر ترقوی وریڈ آگے اور نیچے ہوتی ہے اور عضلہ ضغیرہ (brachial plexus) اوپر ہوتا ہے۔ اس ضغیرہ کا سب سے نیچا کتنا اکثر اس شریان کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ مگر اس وضع میں جبیں جارحہ اس حصہ کے قرب و جوار پر عملیہ کے لئے رکھا جاتا ہے (یعنی مروڑ کر مریض کی کمر کے پیچھے کر دیا جاتا ہے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عصبی تنابھسل کر کیس قدر آگے آ جاتا ہے۔ فوری ضرورت کی حالت میں اس شریان کو ترقوہ کے اوپر سے نیچے کی اور پیچھے کی طرف دباؤ ڈالنے سے پہلی پسلی پر مضبوط کیا جاسکتا ہے جبکہ بازو اچھی طرح سے نیچے کی طرف کو کھینچا ہو۔ زیر ترقوی وریڈ شریان کے نیچے اور اس سے مقدم مستوی پر واقع ہوتی ہے، اور ساری کی ساری ترقوہ کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔

فوق کتقی (suprascapular) اور مستعرض عنقی (transverse cervical) شریانیں ترقوہ کے متوازی جاتی ہیں۔ قبل الذکر ہڈی کے عین پیچھے ہوتی ہے اور موخر الذکر اس کے عین اوپر۔

اعصاب۔ گردن کے بڑے بڑے سطحی اعصاب کا محل چھ خطوط سے جو عضلہ قصبیہ (sterno-mastoid) کے موخر کنارہ کے وسط سے کھینچے جاتے ہیں کافی اچھی طرح سے ظاہر کیا جاسکتا ہے! اس نقطہ سے جو خط آگے کی طرف کو عضلہ قصبیہ حلیہ کے طول محور کو زاویہ قائمہ پر کاٹتا ہوا کھینچا جائے وہ سطحی عنقی عصب (superficial cervical nerve) (جلدی عنقی عصب nervus cutaneus colli) کا تناظر ہوتا ہے۔ دوسرا خط جو اس عضلہ کو کاٹتا ہوا صیوان لاڈل کے نیچے تک خارجی و داجی (external jugular) وریڈ کے متوازی کھینچا جائے وہ عظیم از عصب (great auricular nerve) کا تناظر ہوتا ہے اور تیسرا خط جو عضلہ قصبیہ حلیہ کے موخر کنارہ کے ساتھ ساتھ چاندلی تک کھینچا جائے صغیر قذالی عصب (small occipital nerve) کے محرک نشاندہی کرتا ہے۔ ان خطوط کو اگر نیچے کی طرف اس طرح بڑھایا جائے کہ وہ قفس (sternum) ترقوہ کے وسطی حصہ اور اکرومی (acromian) کو کاٹتے ہوئے گذریں تو وہ فرداً فرداً مقدم سطحی

اور موضوع فوق تر قوی اعصاب کو ظاہر کریں گے۔

نخاعی معین (spinal accessory) عصب و داجی سور اخ (jugular)

(foramen) کے وسطی خانہ میں سے نکلتا ہے اور داحسلی و داجی و رید کے سامنے سے (اور بعض اوقات پیچھے سے) گزر کر اطلس کے مستعرض زائیدہ کو اوپر یا معین نیچے سے کاٹتا ہوا عضلہ قصیہ حلیہ کی عمیق سطح میں داخل ہو جاتا ہے اور اسکے موضوع کنارہ سے باہر نکل کر موضوع مثلث کو عبور کرنے کے بعد عضلہ منخرنسم (trapezius) میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا ممر یوں ظاہر کیا جاسکتا ہے :- اطلس کے مستعرض زائیدہ سے اس نقطہ تک جو عضلہ قصیہ حلیہ کی مقدم کور پر زائیدہ حلیہ کی نوک سے ۲ انچ نیچے واقع ہو۔ یہاں سے زائیدہ قصیہ حلیہ کے موضوع کنارہ کے نقطہ وسطی تک اور آگے چل کر عضلہ منخرنسم (trapezius) کی مقدم کور کے پیرین اور وسطی ایک تہائی حصوں کے مقام اتصال تک (شکل ۳۸ صفحہ ۱۵۱) عضلہ قصیہ حلیہ کو نخاعی معین (spinal accessory) عصب اور دوسرے اور تیسرے عنقی اعصاب رسد پہنچاتے ہیں اور عضلہ منخرنسم (trapezius) کو نخاعی معین عصب اور تیسرے اور چوتھے عنقی اعصاب سے رسد پہنچتی ہے۔

ڈایا فرامی عصب (phrenic nerve) چوتھے اور نیز تیسرے اور پانچویں

عنقی اعصاب سے درقی غضروف کے نقطہ وسطی کے لیول کے قریب قریب پیدا ہوتا ہے اور عضلہ مختلف الاضلاع مقدم (scalenus anticus) کے اوپر سے گر عضلہ قصیہ حلیہ (sterno-mastoid) کے نیچے سے ہوتا ہوا ترقوہ کے قصبی سرے کے پیچھے کے ایک نقطہ تک پہنچ جاتا ہے۔

عضدی ضفیہ (brachial plexus) بعض اوقات بہت دبیلے اشخاص میں

محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اسکی بالائی حد ایک خط سے ظاہر کیجا سکتی ہے جو اس نقطہ سے لیکر جو حلقی درقی فضا (crico-thyroid space) کے تقریباً مقابل ہو گردن کی جانب پر ترقوہ کے نقطہ وسطی کے ذرا باہر تک کھینچا جائے (شکل ۳۸)۔

جب ایک طرف کا عضلہ قصیہ حلیہ (sterno-mastoid) عضلہ مقابل کے شلل یا

شنجی انقباض یا کسی خلقی نقص کی وجہ سے اتوارانہ منقبض ہو جاتا ہے تو ایک عارضہ پیدا ہو جاتا ہے جو کج گردنی (wry-neck) کے نام سے موسوم ہے۔ کج گردنی میں سر کی جو وضع ہوتی ہے اس سے قصیہ حلیہ کا اثر جبکہ یہ پورا فعل کر رہا ہو صحیح صحیح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ سر ذرا آگے کی طرف کو

نمیدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھڈی تندرست جانب کی طرف پھر جاتی ہے اور ماؤف جانب کا کان قصی تر قوی (sterno-clavicular) جوڑ کی طرف جھک جاتا ہے۔ بہت سی حالتوں میں عضلہ منحرفہ (trapezius) اور عضلہ جمیہ یہ (splenius) بھی ماؤف ہوتے ہیں اور عنقی ردا میں تقبضات پائے جاتے ہیں۔ تشنجی انقباض معکوس خراش سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات یہ موزر مثلث کے عنقی غد کے التهاب میں پایا جاتا ہے۔ ایسے التهاب سے عنقی ضغیرہ کی بعض شاخوں میں التهاب پیدا ہو چکا ہے اور اگرچہ عضلہ قصیہ حلیہ کو عصبی رس زیادہ تر نخاعی معین (spinal accessory) عصب سے پہنچتی ہے، مگر اس ضغیرہ (یعنی دوسرے اور تیسرے عنقی اعصاب) سے بھی اعصاب اس تک جاتے ہیں۔ نخاعی معین (spinal accessory) عصب اوپر کے دو یا تین عمیق عنقی لمفی غد کے درمیان سے گزرتا ہے اور انکے التهاب میں یہ بعض اوقات ماؤف ہو جاتا ہے۔ مزید برآں اسی قسم کا انقباض پہلے دو عنقی فقرات کے مرض میں دوسرے عنقی عصب کی بلا واسطہ خراش سے پیدا ہو چکا ہے کج گردنی (wry-neck) کی بعض قسموں کو رفع کرنے کے لئے عضلہ قصیہ حلیہ اور عنقی ردا دونوں عضلہ کی اس چسپیدگی سے تقریباً ۱ انچ اوپر کاٹ دئے جاتے ہیں جو قص اور تر قوہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس عملیہ میں وساختوں یعنی خارجی و داجی ورید (external jugular vein) کے جو اس عضلہ کے موزر کنارہ کے پاس واقع ہوتی ہے، اور مقدم و داجی (anterior jugular) کے جو اسکے مقدم کنارہ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اور تر قوہ سے عین اوپر عضلہ کے پیچھے سے گزر کر قبل الذکر ورید میں ختم ہو جاتی ہے زخمی ہونے کا معتد بہ خطرہ ہوتا ہے۔

عنقی ردا (cervical fascia)۔ یہ انصالی بافت گردن کی ساختوں کو باندھے


رکھتی ہے اور عضلات، عروق اور اعصاب کے لئے غلافات بناتی ہے۔ یہ غلافات آپس میں اس طرح متحد ہوتے ہیں کہ مری (cesophagus)، حنجرہ (larynx)، قصبہ (trachea) اور جسم درقی (thyroid body) کی حرکتیں آزادانہ واقع ہو سکتی ہیں۔ مگر بایں ہمہ یہ ایک قسم کی مضبوطی اور جادیت بھی پیدا کرتی ہے جس سے تمام کی تمام گردن ہلائی جا سکتی ہے۔ گردن کی ساختوں کو باندھنے کے لئے بطور واسطہ کام دینے کے علاوہ عنقی ردا ایک سہارا دینے والی بافت کا کام بھی دیتی ہے، جس میں گردن کا وسیع لمفی نظام مدفون ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ سے یہ

گردن کی جڑ کی طرف کو جاتا ہے۔

عمیق عنقی ردا (۱) سطحی تہ اور (ب) زیادہ عمیق زوائد میں تقسیم کیجا سکتی ہے (دیکھو

201

شکل ۴۹)۔ سطحی تہ گردن کی ایک مکمل پوشش کا کام دیتی ہے اور سوا عضلہ منتزہ (platysma)



شکل ۴۹۔ گردن کے زیرین حصہ میں سے متعرض تراش چو عنقی ردا کی ترتیب کو ظاہر کرتی ہے۔
(انسانی)

۱۔ عضلہ منحرف - ب - قصبہ حلیہ - ج - عظم لامیہ کے خافضات - د - عضلہ منتزہ - ر - مقدم شوکی عضلہ -
س - عضلہ مختلف الاصلع مقدم - ص - سبانی شریان - ط - خارجی و داخلی ورید - ع - موخر شوکی عضلہ -
ف - قصبہ جبکہ پیچھے مری ہے اور آگے جسم رقی - پ - ف - پیش فخری ردا - چ - ق - ہ - پیش قصبی ردا -

اور بعض سطحی وریدوں اور اعصاب کے تمام عنقی ساختوں کو ڈھانپتی ہے۔ یہ فقرات کے شوکی زوائد کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور عضلہ منحرف (trapezius) کو محصور کرنے کے بعد اس کے مقدم کنارہ پر ایک مجر دتہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہاں سے موخر مثلث کو عبور کر جاتی ہے۔ عضلہ قصبیہ حلیہ کے موخر کنارہ پر پہنچ کر یہ دو تہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اس ساخت کو محصور کر نیچے بعد اسکے مقدم کنارہ پر پھر مجر دتہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ گردن کے خط اول کی

چلی جاتی ہے اور دوسری طرف کی ردا سے لمبائی ہے اور راستہ میں مقدم مثلث کو مکمل طور پر ڈھانک دیتی ہے۔ موضع مثلث میں جو حصہ واقع ہوتا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور اسکی بناوٹ چھدری ہوتی ہے اور یہ اس مثلث کی انصافی بافت سے مسلسل ہوتا ہے۔ مقدم مثلث پر یہ ردا اوپر کی طرف چاند کے زین کنارہ سے چسپیدہ ہوتی ہے۔ اس ہڈی کی پچھلی طرف پر یہ نکھی غده کے اوپر سے ہوتی ہوئی وجہ (zygoma) تک چلی جاتی ہے اور فکی ردا بناتی ہے۔ اور ایک زیادہ عمقی تہ اس غده کے نیچے سے (اسکے اور زیر چانوی غده کے درمیان سے) گزر کر کھوپری کے قاعدہ پر کے چند نقاط سے چسپیدہ ہو جاتی ہے۔ اسی زیادہ عمقی حصہ سے وہ رابطہ نمونہ پاتا ہے جو ابری چانوی (stylo-mandibular) رابطہ کے نام سے موسوم ہے۔ سامنے کی طرف پر یہ ردا عظم لامی سے چسپیدہ ہوتی ہے اور جسم درقی کے عین نیچے یہ پھر دو تہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک قص (sternum) کی سامنے کی طرف سے اور دوسری اسکی پشت سے چسپیدہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں تہیں عظم لامی کے خافضات کے سامنے واقع ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی فضا بن جاتی ہے (جو جالبی رخ میں اتنی دور تک چلی جاتی ہے کہ عضلہ قصبیہ حلیہ کے قصی سر کو محصور کر لیتی ہے) جسکا عریض ترین حصہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور جو اس مقام پر عرض میں قص کی دہانے کی متناظر ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ قصبیہ حلیہ کے قصی سر کو کھاتے وقت علیہ اس چھوٹے سے خانہ میں جو دو کوڑبلا دونوں تہوں سے بنتا ہے سرا انجام دیا جاتا ہے اور یہ معلوم کر لینا بہتر ہے کہ مقدم و واجی ورید بھی خارجی و واجی نئے کی طرف کو آتی ہوئی اسی خانہ میں واقع ہوتی ہے۔

(ب) زیادہ عمیق زوائد۔ (۱) سطحی تہ سے ایک زائدہ (شکل ۲۹۳ پ ۳۵)

عضلہ قصبیہ حلیہ کے مقدم کنارہ کے قریب سے پیدا ہوتا ہے جو عظم لامی کے خافضات کے نیچے سے گزر کر جسم درقی اور قصبیہ کی مقدم جانب کو محصور کرتا ہوا اس نلی اور بڑے بڑے عروق کے سامنے سے نیچے کی طرف کو گرد قلبہ (pericardium) کی کیفی تہ تک چلا جاتا ہے۔ (۲) پیش فخری ردا ایک تہ ہے جو پیش فخری عضلات پر بلعوم اور مری کے پیچھے سے نیچے کی طرف کو چلی جاتی ہے۔ اوپر کی طرف یہ کھوپری کے قاعدہ سے چسپیدہ ہوتی ہے اور نیچے کی طرف مری کے نیچے سے یہ صدر میں اتر جاتی ہے۔ جانب پر یہ سبائی خلاف سے لمبائی ہے اور یہاں سے یہ پھر باہر کی اور نیچے کی طرف کو عضلات مختلف الاضلاع (scalene muscles) عضلہ ذیغیرہ (brachial plexus) اور

زیر ترقوی (subclavian) عروق پھیل جاتی ہے۔ یہ ان عروق کے ساتھ ساتھ ترقوہ کے نیچے تک آتی ہے، جہاں یغلی غلاف (axillary sheath) بناتی ہے اور ضلعی غسراہی غشاء (costo-coracoid membrane) کی زیرین سطح سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔ (۳) سباتی شریان اور اسکی رنیک وریڈ اور عصب کا غلاف پیش فکری اور پیش قصبی تہوں اور قصبیہ حلیہ کے غلاف سے مسلسل ہوتا ہے (شکل ۴۹)۔ سباتی غلاف (carotid sheath) پیش قصبی تہ کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف کو چلا جاتا ہے اور اوڑھ کے غلاف اور گرد قلب سے ملکر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا قلب اور گرد قلبہ کو ایک طریقہ سے گردن سے بھی سہارا ملتا ہے۔ جب گردن پیچھے کی طرف کو گرا دیا جاتی ہے تو سباتی غلاف تنیدہ ہو جاتے ہیں اور مدداری ساختیں اوپر کی طرف کو اٹھ جاتی ہیں۔


پس بلعومی خراج کبھی کبھی غشی رداسے ایک دو تعلق رکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ غشی فقرات کے تمدنی مرض سے پیدا ہوتا ہے اور اس حالت میں یہ پیش فکری رداسے سامنے واقع ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ان لمفی غد سے پیدا ہوتا ہے جو پیش فکری رداسے اور بلعوم کے درمیان پائے جلتے ہیں۔ چونکہ یہ رداسے امتحمت پیش کرتی ہے اس لئے قبل الذکر خراج بلعوم کے درون میں خلل انداز ہونے سے پیشتر معتد بہ جسامت اختیار کر لیتا ہے۔ موخر الذکر (خراج) چونکہ اتنا محدود نہیں رہتا اس لئے یہ بلعوم کو ابتدا ہی میں زیادہ خطرناک طور پر تنگ کر دیتا ہے جو تمدنی پس بلعومی خراج پیش فکری رداسے سامنے واقع ہو اس تک جراحی رسائی بلعوم میں سے ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ شکل ۴۹ کے دیکھنے سے یہ ظاہر ہو جائیگا کہ اس خراج پر حملہ آور ہونے کا مناسب راستہ اسی شکاف میں سے ہے جو قصبیہ حلیہ کے بیرونی کنارہ کے ساتھ ساتھ دیا جائے اور سباتی غلاف کو آگے کی طرف کو باز کشیدہ کر لینا چاہئے۔

پھیپھڑے کا راس (apex of the lung) گردن کے اندر تک چلا آتا

ہے اور ترقوہ کے اندرونی نصف سے ۲ انچ اوپر تک پہنچتا ہے۔ اگر عضلہ قصبیہ حلیہ کے قصبی اور ترقوی سروں کے درمیان اور ترقوہ سے ۱ انچ اوپر ایک نقطہ لیا جائے تو وہ بالٹوں کی اکثریت میں راس کے بلند ترین مقام اور پہلی پسلی کی گردن کے محل کو ظاہر کرے گا۔ یہ ترقوہ، عضلہ مختلف الاضلاع مقدم (anterior scalene muscle) اور زیر ترقوی عروق کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ دایاں پھیپھڑے کی نسبت عام طور پر زیادہ اوپر تک جاتا ہے۔ زیر ترقوی شریان پر بے احتیاطی سے عملیات کرنے کے دوران میں پورا اکثر کھولا جائیگا۔

۱۲ فیصدی میں پائی جاتی ہیں۔ ناقص النمو عققی پسلی جنین میں ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ گران پبلیس سے علامات مقابلہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں یا ورجب پیدا ہوتے ہیں تو صرف سن بلوغ میں پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس وقت عضلانی تنش کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ پسلیاں دونوں جانب پر موجود ہوتی ہیں، لیکن انکے علامات اکثر ایک ہی طرف پائے جاتے ہیں۔ سارجنٹ (Sargent) اس قرب وجوار میں ناقص النمو پسلیوں کے پانچ اقسام تسلیم کرتا ہے؛ (۱) عام ترین قسم فقرہ کا ضلعی زائیدہ ہے جو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بغیر جوڑ کے ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف متعرض زائیدہ سے متحد ہوتا ہے۔ یہ ایک لیفی بند کی شکل میں نیچے کی طرف کو چلا جاتا ہے اور پہلی پسلی سے مختلف الاضلاعی درنہ (scalene tubercle) کے پیچھے چسپیدہ ہوتا ہے۔ (۲) ایک چھوٹی سی پسلی جو ضلعی مرکزی اور ضلعی متعرض جوڑوں کے ذریعہ سے فقرہ سے جڑی ہوتی ہے اور ایک لیفی بند کی شکل میں آگے کی طرف کو کھل جاتی ہے جیسا کہ پہلی قسم میں ہوتا ہے۔ (۳) ایک مفصل دار پسلی جو اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اپنے عضلانی حصہ پر آٹھویں عققی جوڑ کو اٹھا سکتی ہے اور ایک لیفی بند کے ذریعہ سے پہلی صدری پسلی سے متحد ہوتی ہے۔ (۴) ایک مفصل دار پسلی جس کا مقدم سرا پہلی صدری پسلی سے یا تو مل جاتا ہے اور یا اس سے ایک مفصل کے ذریعہ سے جڑا ہوتا ہے۔ ایسی پسلی کے ساتھ بعض اوقات عضلہ مختلف الاضلاع مقدم (scalenus anticus) یا عضلہ مختلف الاضلاع وسطی (scalenus medius) چسپیدہ ہوتے ہیں۔ (۵) ایک بے قاعدگی انکے برعکس پائی جاتی ہے جس میں پہلی صدری پسلی ناقص النمو ہوتی ہے اور اسکے مقدم سرے کی جگہ ایک لیفی بند موجود ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہو جانا چاہئے کہ پہلی اور پانچویں قسمن شعاع نگار (radiogram) میں ہمیشہ دکھائی نہیں دیتیں۔ ضلعی غیر گنسی حالتوں کے ساتھ عضلہ ضعیفہ کی ترکیب میں اختلافات پائے جانے کا امکان ہوتا ہے پیش بستگی (prefixation) ساتویں عققی پسلی کے ساتھ اور پس بستگی (postfixation) غیر طبعی پہلی صدری پسلی کے ساتھ پائی جاتی ہے (Wood Jones)۔ مگر ایسا کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ جو دائمی ہو اور جسے متعلق کچھ پیش گوئی کیجا سکے (رونگریٹ ٹاڈ Wingate Todd اور سارجنٹ: Sargent)۔ سامنے کی طرف کے لیفی بند سے عضلہ پسلی کی نسبت شاید زیادہ حقیقی علامات پیدا ہوتے ہیں۔ دوران تنفس میں اور بازوؤں کی حرکتوں میں اس ضعیفہ کے زیرین اجزائے ترکیب یعنی آٹھویں عققی یا سب سے نیچے کی جہل کو بار بار اقل ضرب پہنچتی رہتی ہے۔ سارجنٹ (Sargent) کی رائے کے مطابق عرقی تغیرات عروق پر دباؤ پڑنے سے

پیدا نہیں ہوتے بلکہ جس مقام پر مشار کی ریشے آٹھویں عنقی اور پہلی صدری جمل میں داخل ہوتے ہیں اس سے ذرا آگے بڑھ کر ان ریشوں کو ضرر پہنچنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ زیر ترقوی (subclavian) شریان یا تو پہلی پسلی پر واقع ہوتی ہے۔ یا لیفی بند اسے اس سے ذرا دور ہٹا کر رکھتا ہے (ٹائڈ: Todd) سارجنٹ (Sargent) نے ایسے واقعات نہیں دیکھے جنہیں یہ زائد پسلی کے اوپر سے گزرتی ہو اگرچہ ایسے واقعات کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ جب بازو لٹکتا ہو تو کبجری نبض عام طور پر



شکل ۵۱ زیر ترقوی شریان اور عضدی ضغیرہ کا عنقی پسلی سے ملا ہر کرتی ہے۔

کمزور پائی جاتی ہے مگر سارجنٹ (Sargent) کا یہ خیال ہے کہ تمام عرقی تغیرات عرقی حرکی اختلا لا سے پیدا ہوتے ہیں۔ زیر ترقوی ورید دباؤ سے بچ جاتی ہے۔ تھامس (Thomas) اور کوشنگ (Cushing) کا یہ خیال ہے کہ نقصان عظمی ارتفاع کی نسبت لیفی بند سے پہنچتا ہے۔

اس خلاف قاعدہ حالت کے بعض مریض بازو اور ہاتھ کی زندگی طرف کے ساتھ ساتھ سننا ہٹ محسوس ہونے کی نیا ہاتھ کے عضلات میں شلل واقع ہو جانے کی نیکایت کرتے ہیں۔

یہ علامات پہلے ظہری عصب پر اس مقام پر جز کا اثر ہونے سے پیدا ہوتے ہیں جہاں یہ عنقی پسلی کو مجبور کرتا ہے (تھوربرن: Thorburn) وڈ جونز (Wood Jones) نے اس امر کی طرف

اشارہ کیا ہے کہ بازو کے لٹکنے کی حالت میں پہلی صدری پسلی کے اوپر کی سطح پر کے میزاب میں زیر ترقوی شریان واقع نہیں ہوتی بلکہ عضدی ضغیرہ کا سب سے نیچے کا تنہا (آٹھواں عنقی پسلی اور پہلا ظہری) واقع ہوتا ہے۔ نیز اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ چونکہ اس مقام پر میزاب سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جہاں دوسرے ظہری عصب کا معتد بہ حصہ عضدی ضغیرہ کے سب سے نیچے کے تنے کی تعمیر میں شامل ہوتا ہے اس لئے عصبی تنے اور پسلی کا درمیانی دباؤ بھی یہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

سارجنٹ (Sargent) کے مطابق عنقی پسلی کے علامات مندرجہ ذیل ساختوں کے ضررے منسوب کئے جاسکتے ہیں۔ (۱) بدنی درون آرا عصاب (somatic afferent nerves) کے ضررے۔ مثلاً وجع العصب، جلدی اور عمقی حسی اختلالات۔ (۲) بدنی بروں آریہ ریشوں (somatic efferent fibres) کے ضررے۔ مثلاً عضلی کمزوری، لاغری اور برقی تغیرات۔ اور (۳) مشار کی ریشوں کو ضرر پہنچے۔ مثلاً دورانی تغیرات، ٹھنڈاپن، کبودیت، تہیج اور بعض فسادات الحس (paræsthesiæ)، مثلاً جھنکار اور رسن بن، ٹھنڈک یا ورم کا احساس۔ جہاں تک عضلی رسد کا تعلق ہے ہاتھ کے درونی عضلات (خاص کر عضلات مبعده و مقابلہ اہامیہ کنیرولسن: Kinneir Wilson) نہایت کثرت سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن بعض حالتوں میں کلانی کے سطحی قابضات بھی لاغرا و کمزور ہو جاتے ہیں۔ ۶۰ فیصدی واقعات میں مشترک حس پذیری میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔

پہلی صدری پسلی کے دباؤ سے پیدائندہ علامات کو جنکی طرف پہلے ایڈون بریم ویل (Edwin Bramwell) نے سلسلہ میں توجہ دلائی تھی اب بخوبی تسلیم کیا جاتا ہے اور تمہورن (Thorburn) سٹائلس (Stiles) مورلے (Morley) مرنی (Murphy) سٹاپ فورڈ (Stopford) ٹیلر (Taylor) اور دوسروں نے کامیاب عملیات سرانجام دئے ہیں۔

گلوبریڈگی اور گردن کے زخم: گردن کی جلد اتنی لچکدار اور حرکت پذیر

ہوتی ہے کہ جب اس پر سے بالخصوص کند چاقو کھینچا جاتا ہے تو اس میں آسانی سے شکن پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ گلوبریڈگی کی حالتوں میں جلد کے بہت سے کٹے ہوئے زخم پائے جاتے ہیں جو چاقو کی ایک ہی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ گلوبریڈگی کے زخم میں خواہ یہ خود کشانہ ہو یا قاتلانہ درقی لامی غشا (thyro-hyoid membrane) نہایت کثرت سے زخمی ہوتی ہے۔ کثرت وقوع کے لحاظ سے

اس کے بعد قصبہ کا اور درقی غضروف کا نام آتا ہے (دیکھو شکل ۲۸ صفحہ ۱۹۷)۔

۱۔ اگر زخم **عظم لامی سے اوپر** ہو تو مندرجہ ذیل حصے کٹ سکتے ہیں۔ (۱) مقدم

وداجی ورید (anterior jugular vein)، دوشکی عضلہ کا مقدم شکم، چانیہ لاسیہ (mylo-hyoid)، ذقنیہ لاسیہ (genio-hyoid)، ذقنیہ لسانیہ (genio-glossus) اور لاسیہ لسانیہ (hyo-glossus)، لسانی شریان، وجہی شریان کی شاخیں، تحت اللسانی (hypoglossal) اور لسانی (lingual) اعصاب، زیر چانوی غدہ، بعض اوقات زبان کا جرم بھی کٹ جاتا ہے اور منہ کا فرش بخوبی کھل جاتا ہے۔ اگر کسی واقعہ میں زبان کی چسپیدہ گیاں کٹ جائیں تو اس کے حنجرہ کے اوپر گر جانے اور اغتصاص (suffocation) کے پیدا ہونے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔

۲۔ اگر زخم درقی لامی فضا کو عبور کرے تو مندرجہ ذیل حصے کٹ سکتے ہیں۔

مقدم ووداجی ورید (anterior jugular vein)، قصبہ لاسیہ (sterno-hyoid) درقیہ لاسیہ (thyro-hyoid)، کتفنیہ لاسیہ (omo-hyoid)، درقی لامی غشا، ستھانی مضیق (inferior constrictor)، فوقانی حنجری عضب، فوقانی درقی شریان۔ اور اگر یہ عظم لامی کے نزدیک ہو تو لسانی شریان کا منہ بھی بعض اوقات کٹ جاتا ہے۔ اگر زخم گہرا ہو تو بلعوم کھل جاتا ہے اور لمبٹی (epiglottis) قاعدہ کے قریب سے کٹ جاتا ہے۔ اس جگہ کے زخموں میں لمبٹی کا کٹ جانا ہمیشہ ایک خطرناک پیچیدگی ہوتا ہے۔

۳۔ اگر زخم سے قصبہ (trachea) کٹ جائے تو مندرجہ ذیل حصے کٹ سکتے ہیں۔

مقدم ووداجی ورید، قصبہ لاسیہ (sterno-hyoid)، قصبہ درقیہ (sterno-thyroid)، کتفنیہ لاسیہ (omo-hyoid)، عضلہ قصبہ حلیہ (sterno-mastoid) کا کچھ حصہ، غدہ درقیہ، فوقانی اور تحتانی درقی شریانیں، فوقانی وسطی اور تحتانی درقی وریدیں، باز گرد حنجری عصا (recurrent laryngeal nerves) اور مری (gullet)۔

گردن کے زخموں میں بڑے بڑے عروق اکثر حیرت انگیز طریقہ سے بچ جاتے ہیں۔ کچھ تو یہ گہرے واقع ہونے کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں اور کچھ بہت حرکت پذیر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ڈھیل ڈھالی اتصالی بافت کے ماحول میں واقع ہوتے ہیں۔ مزید برآں خود کشی کرنے والا اپنا کلا

209

کاٹنے وقت سر کو پیچھے کر اگر اپنے بڑے بڑے عروق کو نسبتاً موضع مستوی پر لیجا کر نادانستہ محفوظ کر لیتا ہے۔ گلا کٹتے وقت عروق اوپر کی طرف ابھرتے ہوئے درقی غضروف کی وجہ سے اور نیچے کی طرف عضلہ قصبیہ حللیہ (sterno-mastoid) کے منقبض ہو جانے سے ایک بہت حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جو گہرے زخم حلقی درقی (circo-thyroid) نضا میں سے لگیں یا قصبہ (trachea) کے بالائی حصہ میں سے گزر جائیں وہ ان زخموں کی نسبت جو گردن کے کسی دوسرے حصہ پر اتنی ہی قوت سے لگائے جائیں بڑے بڑے عروق تک زیادہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔

بندوق کے بہت سے زخموں میں جن میں مقذوف (missile) کے


ممر سے یہ یقینی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اہم عروق کو نقصان پہنچا ہوگا یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ عروق حقیقتہً ایک طرف کو درج جاتے ہیں اور اپنی حرکت پذیری کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بچ جانے کی بہت سی مثالیں زمانہ ماضی میں درج کی جا چکی ہیں اور جنگ عظیم میں بہت سی دیکھنے میں آئی ہیں۔ زخما کے گردن کے موضوع کے سلسلہ میں یہ ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ حمل شو کی کئی اہم ترین حصہ تک پہنچنے کی طرف سے اس رضہ میں سے جو اطلس اور محور کے درمیان ہوتا ہے پہنچا جاسکتا ہے۔ اس محل پر حمل کو ایک ہی مرتبہ چاقو بھونکنے سے کاٹا جاسکتا ہے۔

عظم لامی (hyoid bone) بلا واسطہ چوٹ مثلاً گھونسا مارنے یا گلا گھونسنے سے

لوٹ سکتی ہے۔ بعض اوقات ان اشخاص میں شکستہ پائی گئی ہے جن کو چھانسی دگنی تھی۔ کس بعض اوقات ہڈی کے جسم میں واقع ہوتا ہے مگر قرن اعظم زیادہ کثرت سے شکستہ پایا جاتا ہے۔ اس کے سر پہ یو لینز زبان ہلانے منہ کھولنے اور نگلنے میں بہت سی تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے اور یہ ایسے علامات ہیں جو آبائی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ مگر یہاں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ عظم لامی کو ایک طرف دوسری طرف کو ہلانے پر تکنیک طبی طور پر محسوس ہوتا ہے اور اسے کمرے کے لئے ہرگز کافی شہادت تصور نہ کرنا چاہئے۔ درقی لامی غشا اور عظم لامی کی موضع سطح کے درمیان ایک درجہ واقع ہوتی ہے۔ جب یہ کلاں ہو جاتی ہے تو یہ گردن کے دوری سلعہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

حنجرہ (larynx) اور قصبہ (trachea)۔ حنجہ کا محل گردن میں عمر سے متاثر

ہوتا ہے۔ بالغ میں حلقی غضروف (cricoid cartilage) چھٹے عنقی فقرہ کے زیرین حصہ تک ملتی ہے۔ تین ماہ کے بچے میں یہ چوتھے عنقی فقرہ کے زیرین کنارہ تک ہوتی ہے اور چھ سال کے بچے میں پانچویں فقرہ کے زیرین کنارہ تک پہنچتی ہے۔ سن بلوغ پر یہ وہ محل اختیار کرتی ہے جس پر یہ جوانوں میں پائی جاتی ہے۔ مکیبی (epiglottis) کا اوپر کا سرا بالوں میں تیسرے عنقی فقرہ کے زیرین کنارہ کے مقابل ہوتا ہے۔



شکل ۵۲۔ وہ منظر دکھایا گیا ہے جو آرام سے سانس لینے کی حالت میں حنجرہ میں نظر آتا ہے۔
(سینٹ کلیر تھامسن: St Clair Thomson "ٹناک اور حلق کے امراض")

- ۱۔ وسطی لسانی مکیبی رباط۔ ۲۔ نشیب۔ ۳۔ مکیبی۔ ۴۔ جانبی لسانی مکیبی رباط۔ ۵۔ بطینی بند۔ ۶۔ عظم لامی کا قرن اعظم۔ ۷۔ صوتی جیل۔ ۸۔ قصبہ۔ ۹۔ لمبومی حنجرہ کی جانبی دیوار۔ ۱۰۔ سبوجی مکیبی ٹنگن۔ ۱۱۔ ربرک کی غضروف۔ ۱۲۔ صوتی زائدہ۔ ۱۳۔ ناسپاتی مناجوف۔ ۱۴۔ سٹیٹویری کی غضروف۔ ۱۵۔ مین سبوجی ٹنگن۔

حنجرہ بین سے مندرجہ ذیل حصے شناخت کئے جاسکتے ہیں (شکل ۵۲)۔ زبان کا قاعدہ اور لسانی مکیبی ٹنگن (glosso-epiglottic folds)، حنجرہ کا فوقانی روزن جس کے سامنے مکیبی ہوتا ہے، مکیبی کی گدی، طرفین پر سبوجی مکیبی ٹنگن (aryteno-epiglottidean folds) اور دو مستدیر فزات ہوتے ہیں جو قرینوں (cornicula) اور فانیگل (cuneiform) غضروفوں کے متناظر ہوتے ہیں اور پیچھے کی طرف غنائے مغالی کا سبوجی تھقہ (arytenoid commissure)۔ نیچے کی طرف اور گہرا دیکھنے سے صادق اور کاذب صوتی اجال، بطین، حنجرہ کی مقدم دیوار

حلقی غضروف کا تھوڑا سا حصہ اور قصبہ کی مقدم دیوار کا کم و بیش حصہ نظر آتا ہے۔ اگر مزمار (glottis) بہت مکمل طور پر تسبیح ہو تو دونوں شہتوں کے فتنے بھی دھندلے سے دکھائی دیتے ہیں۔

درقی اور حلقی غضروفات اور سبوجی غضروف کا بہت سا حصہ

ساخت میں ضلعی غضروفوں کی طرح زجاجی ہوتا ہے۔ موخر الذکر کی طرح پیرانہ سالی میں انکے کم و بیش متعظم ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ درقی اور حلقی غضروفوں میں تعظم تقریباً ۲۰ سال کی عمر پر شروع ہوتا ہے اور ہر ایک غضروف میں یہ عمل حلقی درقی جوڑے کے قرب وجوار میں شروع ہوتا ہے۔ سبوجی (arytenoid) بعد میں متعظم ہوتی ہے۔ جگری غضروفوں کا تعظم مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ زیادہ کلاں غضروفوں کے چوٹے مثلاً ضربوں یا گلا گھٹنے وغیرہ سے مسکور ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ درقی غضروف نہایت کثرت سے ٹوٹتی ہے اور عام طور پر خطوطی پر ہی ٹوٹتی ہے۔ درقی غضروف کا موخر فوقانی زاویہ ناشیاتی نما حفرہ (pyriform fossa) کے محل کو نکال کر کرتا ہے۔ یہ ایک عریض گوشہ ہے جو سبوجی کبھی شکلو (aryteno-epiglottic folds) سے اوپر اور باہر کی طرف کو ہوتا ہے (شکل ۵۲)۔ اس حفرہ میں اجسام غریبہ انکب جاتے ہیں اور سلطان عام طور پر واقع ہوتا ہے۔

211

فتمۃ المزمار (rima glottidis) ایک روزن ہے جو صادق صوتی اجمال اور

سبوجی غضروفوں کے صوتی زائدہ کے (جکے موخر حصہ پر اجمال چسپیدہ ہوتے ہیں) درمیان ہوتا ہے۔ ان اجمال کا طول زائدوں سے دگنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ لچکدار بافت سے مرکب ہوتے ہیں جو مطبق سرصلہ کے نیچے سے آشکار ہوتی ہے اسلئے انکی رنگت زردی مائل رمادی ہوتی ہے۔ ان اجمال کا اساس جو اتصالی بافت سے مرکب ہوتا ہے حلقی درقی غشا کا ہی پھیلاؤ ہوتا ہے جو اوپر کی طرف کو چلا جاتا ہے۔ فتمۃ المزمار حنجرہ کی اندرونی جانب کا تنگ ترین حصہ ہے اور اجسام غریبہ کے داخل ہونے اور اوزاروں کے گزارنے کے سلسلہ میں اسکے ابعاد سے واقف ہونا مناسب ہے۔ بالغ مرد میں فتمۃ المزمار کی پیمائش آگے سے پیچھے تک تقریباً ۱.۵ (۲.۳ ملی میٹر) ہوتی ہے۔ ایک جانب سے دوسری جانب تک کا عریض ترین حصہ طول کا تقریباً ایک تہائی ہوتا ہے۔ انتہائی اتساع کی حالتیں یہ قطر بڑھ کر طول کے نصف تک پہنچ جاتا ہے۔ عورت میں اور سن بلوغ سے پیشتر مرد میں مقدم

212

موضوۃ قطراء علی بیڈر ہوتا ہے۔ دوران تنفس میں فتحۃ المزمار عضلہ حلقیہ سبوجیہ (موضوۃ crico-anytenoideus posticus) کے فعل سے خوب کشادہ ہو جاتا ہے اور دوران مکلم میں موتی احبال میں عضلہ حلقیہ سبوجیہ جانبی (crico-arytenoideus lateralis) کے فعل سے مقاربت پیدا ہو جاتی ہے۔

حنجرہ کی غشاء مخاطی کی بارت اور اسکی زیر مخاطی بافت کی مقدار مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل حصوں میں یہ غشاء بیز ترین ہوتی ہے اور زیر مخاطی بافت نہایت کثیر المقدار ہوتی ہے اور انکو اسی مقدار کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے:۔ سبوجیہ کبھی شکن (aryteno-epiglottidean folds)، بطین (ventricle) کی غشاء مخاطی بطینی شکن (کا ذمبی قی احبال) اور کبھی کا تنجری رخ۔ یہ ہی حصہ ہیں جو عداد التهاب حنجرہ میں نہایت متلی اور متورم ہو جاتے ہیں۔ اور جو خطرناک حالت مزمار (glottis) کے بہج کے نام سے موسوم ہے، اسکا زیادہ تر انحصار اس ڈھیل ڈھالی بافت میں انصباب کے نمودار ہو جانے پر ہوتا ہے جو سبوجیہ کبھی شکنوں میں پائی جاتی ہے۔ سبوجیہ کبھی شکنوں کی غشاء مخاطی کے ڈھیل ہونے کی وجہ سے سبوجیہ (arytenoid) غصرو نوں میں آزادانہ حرکت واقع ہو سکتی ہے اور حنجرہ کا بالائی روزن مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ غشاء مخاطی صادق موتی احبال سے مضبوطی سے پیوستہ ہوتی ہے اور مطبق مرحلہ سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور حنجرہ کے بقیہ حصہ کا استر قصبہ کی طرح ہدب دار مرحلہ سے بنا ہوتا ہے۔ پوشش کی نوعیت اور اسکی رگ رگ کے لئے معرار ہونے کی وجہ سے صادق موتی احبال سرطان کا غیر معمولی محل نہیں۔

حنجرہ کا استیصال - خط وسطی پر شکاف دینے سے سالم حنجرہ دور کیا جاسکتا ہے۔

اس شکاف میں عضلہ منتشر (platysma)، ردا اور مقدم و داجی رید (anterior jugular vein) کاٹ دیا جاتی ہے۔ حنجرہ اپنے علاقہ جات سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور مندرجہ ذیل ساختیں کاٹی جاتی ہیں۔ قصبہ درقیہ (sterno-thyroid)، درقیہ لایمہ (thyro-hyoid) 'ابر یہ بلعومیہ (stylo-pharyngeus) 'حنکیہ بلعومیہ (palato-pharyngeus) اور تحتانی مضیق عضلات فوقانی اور تحتانی درقیہ (thyroid) شریانوں کی حنجری شاخیں، فوقانی اور تحتانی حنجری عصاب لایمہ کبھی (hyo-epiglottic) اور لسانی کبھی (glosso-epiglottic) رابطات۔ اسکے بعد حنجرہ قصبہ سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور نیچے سے بذریعہ تقطیع کاٹ دیا جاتا ہے۔ مری اور بلعوم کو علیحدہ

کرتے وقت قبل الذکر نالی میں سوراخ ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔

حنجرہ میں سے بالیدیں درقیہ شگافی (thyrotomy) کے عملیہ سے دو کریہائی ہیں۔

درقیہ کے جناحین کو خط وسطی پر ملحدہ کر کے ایک دوسرے سے دور بٹا دیا جاتا ہے اور اس طرح حنجرہ کی اندرونی جانب معرا کر لیا جاتا ہے۔ ۵۴ سال سے اوپر کے مریضوں میں یہ غضروف خط وسطی پر متعظم ہو جاتی ہے اور اسے باریک آری سے کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ صوتی احوال خط وسطی کی ہر ایک جانب پر درقیہ غضروف کے مقدم کنارہ کے نقطہ وسطی کے قریب چسپیدہ ہوتے ہیں اور ان سے صین اوپر بلعینی شکن یا کاذب صوتی احوال اور کلبی کی ڈنڈی مثبت ہوتی ہے۔

اجسام غریبہ اب درقیہ شگافی (thyrotomy) کی نسبت عام طور پر شعبہ بین نیلوں (bronchoscopic tubes) سے نکالے جاتے ہیں۔

حنجرہ کے بالائی نصف کے لمفی عروق فوقانی حنجری عروق کی متابعت کرتے ہیں اور

بالائی عمقی معقی غدد سے مل جاتے ہیں۔ ایک جھوٹا سالمی غده جو ثانوی سرطانی مطروح کا پہلا محل ہوتا ہے لامی ہڈی کے قرن کے نیچے درقیہ لامی (thyro-hyoid) غشا پر واقع ہوتا ہے (شکل ۵۵)۔ حنجرہ کے زیرین نصف کے عروق لمف تحتانی درقیہ عروق کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور ان عروق لمف میں سے گزرتے ہیں جو قصبہ کی جانب پر واقع ہوتے ہیں۔

قصبہ شگافی (tracheotomy) اور حنجرہ شگافی (laryngotomy)۔

قصبہ کا طول تقریباً ۱۲ انچ ہوتا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ عرض ۲ تا ۱ انچ ہوتا ہے۔ اسکے ارد گرد بہت ہی ڈھیلی ڈھالی القسانی بافت ہوتی ہے، جسکی وجہ سے نالی میں معتد بہ حرکت پذیری پائی جاتی ہے۔ قصبہ کی حرکت پذیری بچوں میں بالغوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور قصبہ شگافی کی دقتوں میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طریق کار میں قصبہ کو غده درقیہ کی خاکنائے سے اوپر یا اسکے نیچے یا اسکے اندر سے خط وسطی میں دو تین حلقے کاٹ کر کھولا جاتا ہے۔ قصبہ جوں جوں نیچے اترتی ہے سطح سے دور ہوتی جاتی ہے اور اہم تر ساختوں سے تعلق پیدا کرنی جاتی ہے۔ اس لئے اگر دوسری حالتیں مساوی ہوں تو یہ نظر ہے کہ عملیہ جتنا اوپر سرانجام دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔

قصبہ کا طول گردن میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا جیسا کہ بعض اوقات پہلے پہل معلوم ہوتا ہے۔ اور قص سے اوپر عام طور سے سات یا آٹھ سے زیادہ قصبی حلقے (جنکی کل تعداد سولہ سے بیس تک ہوتی ہے) نہیں پائے جاتے۔ حلقے غضروف اور قصبی کٹاؤ کا درمیانی فاصلہ بہت اختلاف پذیر ہوتا ہے اور اسکا انحصار گردن کے طول، مریض کی عمر اور سر کی وضع پر ہوتا ہے۔ اگر ایسی حالت میں جبکہ سر عمود فقری پر آسانی سے ٹکا ہوا ہو قص سے مین اوپر قصبہ کا ۲ انچ حصہ مبرا کر لیا جائے تو سر کی مکمل بسط کر دگی کی حالت میں قصبہ کا ۳ انچ حصہ اوپر کی طرف گردن میں کھینچ آئے گا۔ ٹیلو (Tillaux) کے مطابق بالغ میں حلقے غضروف اور قص کا تمام درمیانی فاصلہ اوسط میں تقریباً ۲ ۳/۴ انچ (۷ سنٹی میٹر) ہوتا ہے۔ ۳ اور ۵ سال کے درمیان کی عمر کے بچہ میں یہ کل فاصلہ تقریباً ۱ ۱/۴ انچ (۴ سنٹی میٹر) ہوتا ہے۔ ۶ اور ۷ سال کے درمیان کی عمر کے بچہ میں یہ تقریباً ۲ ۱/۲ انچ (۵ ۱/۲ سنٹی میٹر) ہوتا ہے، اور ۱۰ اور ۸ سال کے درمیان کی عمر کے بچوں میں یہ تقریباً ۲ ۱/۴ انچ (۶ سنٹی میٹر) ہوتا ہے۔ تراش پر قصبہ کے ابعاد بہت اختلاف پذیر دکھائی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی عمر کے مختلف افراد میں یہ مختلف ہوتے ہیں۔ گوٹرسینٹ (Guersant) یہ بیان کرتا ہے کہ بالوں کے لئے قصبہ شگافی کی فیلیوں کا قطر ۱۲ ملی میٹر سے ۱۵ ملی میٹر تک ہونا چاہئے۔ اور ۱۸ مہینہ سے کم عمر بچوں کے لئے انکا قطر تقریباً ۴ ملی میٹر ہونا چاہئے۔

قصبہ شگافی (tracheotomy) کا عملیہ سہرا انجام دیتے وقت یہ ضروری ہے کہ سر جقدر ممکن ہو کھینچے کی طرف کو گردا دیا جائے اور ٹھنڈی کو قصبی کٹاؤ کی مین سیدھی میں لکھا جائے تاکہ گردن کے خط وسطی کے تعلقات مصئون رہیں۔ سر کی مکمل بسط کر دگی سے جراح کو عملیہ کے لئے نہ صرف زیادہ گنجائش ہی مل جاتی ہے، بلکہ قصبہ بھی سطح سے قریب تر ہو جاتی ہے! ورنہ کوتاہنے سے یہ بہت کم حرکت پذیر ہو جاتی ہے۔

215

گردن کے خط وسطی میں قصبہ پر حلقے غضروف سے قص تک شگاف دیتے وقت مندرجہ ذیل حصے سامنے آتے ہیں:۔ جلد کے نیچے مقدم و داجی وریدیں پائی جاتی ہیں۔ یہ وریدیں قاعدۂ خط وسطی کی دونوں جانب پر کچھ فاصلہ پر واقع ہوتی ہیں اور سوائے ایک بڑی مستعرض ورید کے جو میاں و جہی فضا میں قص کے بالائی کنارہ پر واقع ہوتی ہے کسی اور ذریعہ سے مربوط نہیں ہوتیں بعض اوقات

المطالب علم کو اس امر کی یاد دہانی کجائی ہے کہ ۱۲، ۵ ملی میٹر = ۱/۴ انچ اور اسلئے ۴ ملی میٹر تقریباً ۱/۴ انچ۔

قصبہ شنگافی کے رقبہ کے عین سامنے بہت سی رابطہ شاخیں موجود ہوتی ہیں، یا قصبہ کے سامنے وریڈوں سے تقریباً ایک مضغیرہ بنجاتا ہے، یا ایک ہی وریڈ ہوتی ہے جو خط وسطی کا متبع کرتی ہے۔ اسکے بعد عسفی ردالمطی ہے جس میں عضلات قصبہ لاسیہ (sterno-hyoid) اور قصبہ یقیہ (sterno-thyroid) بند ہوتے ہیں۔ طرفین کے عضلات کے درمیان کا فرج معین نما ہوتا ہے اور یہ اس طرح واقع ہوتا ہے کہ قصبہ عضلی ریشوں کو تقسیم کرنے کے بغیر ہی معرا کیا جاسکتا ہے۔ درقی غدہ کی خاکنائے بالعموم قصبہ کے دوسرے تیسرے اور چوتھے حلقوں کو عبور کرتی ہے بعض اوقات اس سے اوپر اور فوقانی درقی وریڈوں کے درمیان ایک مستعرض ربطی شاخ پائی جاتی ہے۔ خاکنائے کے اوپر ایک وریڈی مضغیرہ پایا جاتا ہے جس میں سے تحتانی درقی وریڈیں نکلتی ہیں اور خاکنائے کے نیچے یہ وریڈیں قصبہ کے سامنے زیر ترین درقی شریا (thyroidea ima artery) کے ساتھ پائی جاتی ہیں (جبکہ یہ شریان موجود ہوتی ہے)۔ تحتانی درقی وریڈ بعض اوقات ایکہ احد تنے کی شکل میں پائی جاتی ہے جو خط وسطی پر واقع ہوتا ہے۔ شیرخوار بچہ میں دو سال کی عمر سے پہلے پہلے غدہ تیموسیہ (thymus) قصبہ کے سامنے ایک اختلاف پذیر فاصلہ تک پھیلا ہوتا ہے۔ گردن کی عین جڑ پر قصبہ کو لاسمی (innominate) اور بائیں سباتی (left carotid) شریانیں اور بائیں لاسمی وریڈ عبور کرتی ہیں اور آخوکار فوقانی درقی شریان کی غیر طبعی شاخیں بھی بعض اوقات ہوا کی نالی کے بالائی حلقوں کو عبور کرتی ہیں۔ غدہ درقی کی خاکنائے کے زخمی ہونے کے خطرہ کے سلسلہ میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ قصبہ شنگافی سرانجام دیتے وقت یہ بغیر کسی زحمت کے پیش آنے کے کاٹی جاسکتی ہے۔ دوسری وسطی سیبونیوں کی طرح غدہ درقیہ کی خاکنائے کے خط وسطی کی عقیقیت بھی نسبتاً کم ہوتی ہے، گو اس میں سے خون استقدر بہتا ہے کہ حابس الدم چمکیوں کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ غدہ درقیہ کی ایک جانب دوسری جانب سے محض جوڑی طور پر ہی مشروب کیجا سکتی ہے (یعنی ایسے اشرب سے جو خاکنائے کو عبور کرے) شیرخوار بچوں میں قصبہ شنگافی کی دقت کا انحصار گردن کے چھوٹا ہونے، زیر جلدی شحم کی مقدار، قصبہ کے گہرا واقع ہونے، اسکی جسامت کی چھوٹائی اور اسکی بہت سی حرکت پذیر ہونے اور دبائے سے اسکے باسانی مہبوط ہوسکے پر ہوتا ہے۔ اگر اٹھکی سرسری طور پر داخل کیجائے تو شیرخوار بچہ کی قصبہ کی طرف سے کوئی مزاحمت پیش نہیں آتی۔ اسکی حرکت پذیر ہونے اس قسم کی ہوتی ہے کہ بے احتیاطی سے یہ باسانی ایک طرف کو ٹل سکتی ہے اور اس لیے ناخوابہ کار عملیہ کن جلدی میں جو بعض اوقات لازم ہوتی ہے مری یا فقری ستون کو بھی پھیلنے لگتا ہے۔ مزید برآں بچہ میں

بالغ کے مقابلے میں بڑے بڑے عروق قصبہ کو زیادہ بلند لیول پر عبور کرتے ہیں۔ اور ایسے خدہ تیموئید سے بھی جو نامناسب طور پر نمایاں ہو سیکندردقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں ایک شیرخوار بچہ میں قصبہ شنگائی کی نلی کے سرے سے جسکا دباؤ قصبہ کے سامنے کے رخ پر پڑتا تھا ایک قرصہ پیدا ہو گیا تھا جو لاسمی شریان میں کھل گیا تھا (برٹش میڈیکل جرنل صفحہ ۷۷۷)۔ نلکی (cannula) داخل کرتے وقت اگر قصبی زخم کم ہو جائے تو یہ باسانی عنتی روکے نیچے کی ڈھیل ڈھالی بافت میں گھس جاتی ہے اور خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ ہوا کی نلی ہی میں ہے۔

حنجہ شنگائی (laryngotomy) میں ہوا کی گدگاہ کو حلقی در (crico-thyroid) غشائیں ایک مستعرض شگاف دیکر کھولا جاتا ہے۔ حلقی در قی غشائی انتہائی بلندی۔ بخوبی نمویافتہ بالغ موضوعات میں تقریباً ۱/۲ انچ ہی ہوتی ہے۔ اور بچوں میں یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس میں سے نلکی داخل نہیں کیجا سکتی۔ حلقی در قی شریانیں اس فضا کو حلقی غصروف سے عین اور عبور کرتی ہیں۔ اور انکو کاٹنے سے اجتراز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انکی جسامت عام طور پر بہت ہی غیر اہم ہوتی ہے اور یہ کوئی تکلیف نہیں دیتیں۔ مگر گاہے گاہے یہ عروق عظیم الجسامت بھی ہوتے ہیں اور ایسے واقعات کا اندراج کیا جا چکا ہے جن میں ان عروق سے خطرناک زف ہی نہیں بلکہ منکک زف بھی واقع ہو چکا ہے (ڈرہیم: Durham)۔ جب نلکی داخل کیجاتی ہے تو یہ قصبہ میں جلنے کی بجائے پیمصل کر حلقی در قی غشا اور مخاطی استر کے درمیان باسانی چلی جاتی ہے۔ چونکہ حلقی در قی غشا اوپر کی طرف مہوتی احوال سے تسلسل رکھتی ہے اسلئے یہ مناسب ہے کہ اس میں سے جو شنگاف دیا جائے وہ در قی کی بجائے حلقی کے زیادہ نزدیک ہو، ورنہ احوال کے ڈھیلے ہو جانے اور آوازیں تغیر آجانے کا امکان ہوتا ہے۔

217


اجسام غریبہ اکثر دوران نفس میں سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں۔ اور حنجہ فوقانی روزن یا فتق المر بار (rima) میں اٹک سکتے ہیں۔ یا یہ لطین (ventricle) میں چلے جاتے ہیں۔ یا قصبہ میں پھنس جاتے ہیں اور یا کسی شعبہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شعبہ میں داخل ہونے والا جسم غریب عام طور پر دائیں شعبہ ہی کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ اسکا روزن بائیں نلی کے روزن کی نسبت قصبہ کے مرکز کی زیادہ سیدھے میں ہوتا ہے۔ سانس کے ساتھ در کشیدہ اجسام غریبہ کے خطرہ کا انحصار اتنا اس میں کافی انداز پر نہیں ہوتا جو ان سے پیدا ہوتا ہے، جتنا کہ یہ مزار کے اس تشنج پر ہوتا ہے جسکو یہ اجسام معکوس خواش سے پیدا کرتے ہیں۔ مگر بعض اوقات جسم غریب لطین (ventricle)

میں زیادہ تکلیف دینے کے بغیر ہی کچھ عرصہ تک پڑا رہتا ہے۔

درقی جسم (thyroid body) - اس جسم کا ہر ایک لختہ اپنے اپنے عظیم ترین حصہ پر

۲ انچ لمبائی ۱ انچ چوڑائی اور ۳ انچ موٹا ہونا چاہئے۔ جب درقی غدہ ان پھیلاؤ سے واضح طور پر متجاوز ہو تو اسے کلانی یافتہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسکا وزن عام طور پر ۱ اور ۲ اونس کے درمیان ہوتا ہے۔ اسکی تینوں سطحوں میں سے (شکل ۵۳) مقدم سطح تحتانی لامی عضلات سے ڈھکی ہوتی ہے۔

218



شکل ۵۳ - انتہائی تراش جو درقی جسم کے تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔

اور اندرونی سطح حنجروہ اور قصبہ پر منکبن ہوتی ہے اور بیرونی یا موخر سطح باقی غلاف کو لپو شیدہ کرتی ہے۔ اسکے نمایاں موخر کنارہ کا زیرین حصہ بازگہ حنجری عصب (recurrent laryngeal nerve) اور مری سے مس کرتا ہے۔ ہر ایک لختہ درقی غضروف کے تقریباً وسط سے لیکر قصبہ کے چھٹے حلقہ تک پھیلا ہوتا ہے۔ عورتوں میں مردوں کی نسبت یہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اور دایاں لختہ بائیں کی نسبت بالعموم بڑا ہوتا ہے۔ ان امور کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے کہ درقی کلانیال (گھینگا) عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ہر حالت میں پہلے پہل انکے زیادہ تر دائیں جانب پردیکھے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ چونکہ خاکائے (isthmus) قصبہ و حنجروہ سے مضبوطی سے منضم ہوتی ہے اسلئے نکلنے کے دوران میں یہ اوپر نیچے حرکت کرتی ہے۔ اور یہ امر گھینگے کے

دوسرے عقی سلعات سے تشخص کرنے میں نہایت ہی عظیم الامہیت ہے۔ عقی ردا کا ایک مضبوط زائدہ (ہیری: Berry) کا تعلیقی رباط) اس غدہ کو حلقہ غرضوف کی ہر ایک جانب سے باندھ دیتا ہے اور قبل اسکے کہ اسکامل طور پر علحدہ کرنا ممکن ہو اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ جب غده درقیہ کلانی یافتہ ہو جاتا ہے تو یہ جانبین پر قصبہ میں بد شکل پیدا کر دیتا ہے اور اسے تنگ کر دیتا ہے۔ جس سے ”نیام“ (scabbard) کا سامنظر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب کلانی سرمت کے ساتھ واقع ہوتی ہے تو اس حالت کے رونما ہونے کا اور زیادہ امکان ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا جسم قصی لامی (sterno-hyoid) قصی درقی (sterno-thyroid) اور کٹنی لامی (omo-hyoid) عضلات سے اپنی جگہ پر جما رہتا ہے۔ درقی جسم کی موضی بیرونی سطح بڑے بڑے عروق کے غلاف کے ساتھ مس کرتی ہے اس لئے جب یہ غده کلانی یافتہ ہو جاتا ہے تو اس میں سے ان عروق کے نمبانات باسانی منتقل ہوتے رہتے ہیں (شکل ۵۳) مزید برآں پیچھے کی طرف یہ عام طور پر بلعوم کے یرین حصہ اور مری کے بالائی حصہ کو مس کرتا ہے اور اس رخ میں جو کلانیاں واقع ہوتی ہیں ان سے اور نیز اس مداخلت سے جو ابتلاع میں حنجرہ کی حرکت میں واقع ہوتی ہے اس تکلیف کی توجیہ ہو سکتی ہے جو گلنے کے دوران میں گھسکے میں اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔

219

درقی غده کی خاکنائے اس عطفہ سے نمونپاتی ہے جو مضغہ میں بلعوم کی اگلی دیوار سے زبان کے چانوی اور لامی حصوں کے درمیان سے بروز کرتا ہے (شکل ۵۶ صفحہ 231) زبان کا سوراخ (foramen caecum) اس نقطہ کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے یہ عطفہ بلعوم سے پیدا ہوا تھا۔ اس سوراخ سے بعض اوقات ایک قنات نکلتی ہوئی پائی جاتی ہے (درقی لسانی: thyro-glossal) جو عظم لامی کے قریب کے معین غدی نو دوں کو جاتی ہے۔ اس ہڈی کے قرب و جوار میں معین غدے اور چھوٹے چھوٹے دویرے جن کا استر مرحلہ سے بنا ہوتا ہے اکثر پائے جاتے ہیں۔ یہ غدے معین نام نہاد ہرم یا وسطی نختہ کے اس ابتدائی عطفہ کی گردن کا باقی ہوتے ہیں۔ عظم لامی کے لیول کے نیچے وسطی غنچہ (median bud) تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہرمی نختہ وائیں یا بائیں قسمت کا قائم مقام ہوتا ہے اور کبھی خط وسطی میں واقع نہیں ہوتا۔ ہرم (pyramid) جو عضلہ رافعہ درقیہ (levator thyroideæ) کے ذریعہ سے عظم لامی کے ساتھ تقریباً ہمیشہ ملا ہوتا ہے امتحان کردہ موضوعات میں سے ۹ فیصدی میں موجود ہوتا ہے (سٹرکیسن: Streckeisen)۔ جانبی نختہ چوتھی مثالی درزوں سے نمونپاتے ہیں (شکل ۵۶)۔ وسطی عطفہ گاہے گاہے جانبی درزوں میں سے

ایک کے ساتھ متحد ہونے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ اس حالت میں خاکنائے کا کچھ حصہ غائب ہوتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے معین درقی اجسام اکثر موجود ہوتے ہیں۔

غده درقیہ کے ذلول سے یا مرض سے اس کے تباہ ہونے سے جسم کا ایک عمومی عارضہ پیدا

ہو جاتا ہے جو مخاطی اذیمیا (myxoedema) کے نام سے موسوم ہے۔ یہ عارضہ قمائت

(cretinism) سے خاص کر جہانتک اس کے گھینگے کے مریضوں میں پائے جانے کا تعلق ہے قریباً
مشابہت رکھتا ہے۔ مخاطی اذیمیا (myxoedema) عملیہ سے تمام غده کا استیصال کر دینے کے بعد
نمودار ہوتا ہے اور یہ بندروں میں غده کے تجزیاتی ازادہ پیدا کیا جا چکا ہو مخاطی اذیمیا (myxoedema)
کا ایک نمایاں خاصہ زیر جلدی بافتوں کا ورم ہے جو زیر جلدی بافتوں میں ایک مخاطین نما جسم کے
اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔

220

عرق صرکی اعصاب درقیہ تک عنقی مشار کی سلسلہ کے یزیرین حصہ کے راستہ سے
پہنچتے ہیں اور اسی راستہ سے اعصاب اوپر کی طرف کو آنکھ تک جاتے ہیں (دیکھو صفحہ 68) ایرا
معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعصاب مرکزی طور پر غالباً نخاع مستطیل سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ بعض حالتوں میں
درقیہ کی کلافی کے ساتھ آنکھ کا بروز بھی پایا جاتا ہے (مخوطی گھینگہ: exophthalmic goitre)۔
ایشر (Asher) اور فلیک (Flack) نے یہ دریافت کیا ہے کہ جسم درقی کے اندرونی افسراز میں
حجری اعصاب کے میجان سے زیادتی پیدا کی جا سکتی ہے۔

غده درقیہ کے عروق لمف کثیر التعداد ہیں اور یہ عمیق عنقی اور فوقانی منصفی
(superior mediastinal) لمفی غدد کو جاتے ہیں۔


عرقی رسد۔ فوقانی درقی شریان غده میں جانبی لختہ کے راس پر پہنچتی ہے اور زیادہ تر
اسکی مقدم سطح پر منقسم ہوتی ہے۔ تحتانی درقی شریان اس لختہ کے یزیرین حصہ میں اسکی موخر جانب پر داخل
ہوتی ہے۔ غده کے استیصال میں اس عرق کو باندھتے اور غده کے یزیرین حصہ کو چھڑاتے وقت باز گرد
حجری عصب (recurrent laryngeal nerve) کو ضرر پہنچنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اگر یہ
کٹ جائے یا بندش میں آجائے تو حنجرہ کے وہ جملہ عضلات جو اس طرف ہوتے ہیں سوائے عضلہ حلقیہ
درقیہ (crico-thyroid) کے مشلول ہو جاتے ہیں۔ زیر ترین درقی مشریان (thyroidea)
(innominate) جو جسم درقی کیلئے ایک زائد عرق ہوتا ہے اور جو عام طور پر لاسمی (innominate)

سے پیدا ہوتی ہے اور تھبہ کی اگلی جانب پر اوپر کی طرف کو جاتی ہے ہر دس موضوعات میں سے ایک میں پائی جاتی ہے۔

221

نزد درقے (parathyroids) چھوٹے چھوٹے بیض نما اور جلی ہوئی مٹی (terra-cotta) کی رنگت کے اجسام ہوتے ہیں، جنکی جسامت میٹر کے چھوٹے چھوٹے دانوں کے برابر ہوتی ہے۔

انکے ترکیبی غلیات عظیم الجسامت اور کثیر الاضلاع ہوتے ہیں اور انکا خلیہ مائیکسین (eosine) سے سہل التوشیہ ہوتا ہے اور یشبک عائد میں مجتمع ہوتے ہیں۔ تمام یا اکثر نزد درقیوں کو دور کر دینے یا انکو ضرر پہنچنے سے ٹکڑ پیدا ہو جاتا ہے اور کیلسیم کے تحول میں نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر ایک طرف بالعموم دو ہوتے ہیں۔ ایک جسم درقی کے جانبی غتہ کے زیر قطب کے پیچھے اور دوسرا عثمانی درقل (inferior thyroid) کی انتہائی شناخوں کے نیچے ہیں۔ فارکسٹھ (Forsyth) کا یہ بیان ہے کہ جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے انکی جسامت گھٹتی جاتی ہے۔



مری (oesophagus) یا غذا کی

شکل ۵۴۔ مری اور اسکے تعلقات۔ نلی (gullet) (شکل ۵۴) چھٹے عنقی فقرہ کے مقابل

یعنی حلقی غضروف (cricoid cartilage) کے زیرین کنارے کے پیچھے شروع ہوتی ہے۔ اور ڈایا فرام کو دسویں ظہری فقرہ کے مقابل منقبت کرتی ہے۔ اس مقام کی نشان دہی کم پر نویں ظہری فقرہ کے منراکب شکوک سے ہوتی ہے۔ اس شکوک کے ذرا بائیں طرف سماع الصدر رکھ کر میال معدہ میں داخل ہوتا ہوا سنا جاسکتا ہے۔

چھوٹے سے زیر ڈایا فرامی ممر کے بعد جو تقریباً پانچ کے قریب ہوتا ہے، یہ معدہ میں گیارہویں ظہری فقرہ کے تقریباً بالائی حصہ کے لیول پر کھلتی ہے۔ غذا کی نالی میں تین خم ہوتے ہیں۔ ایک مقدم موضع جو شکوک عمود کا منظر ہوتا ہے اور دوسرے دو جانبی ہوتے ہیں۔ خط وسطی پر سے

یہ شروع ہوتی ہے، اور گردن کی حرکت بائیں جانب کو ذرا سی منحرف ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں سے پانچویں ٹھہری فقرہ تک یہ خط و سطی تک بتدریج واپس آ جاتی ہے! اور انجام کار یہ پھر بائیں طرف کو مڑ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ڈایا فرام کو منقبت کر نیچے لائے آگے کی طرف کو بڑھتی ہے۔ باوجود ان خنواؤں کے ماہرین استوار اور سیدھی معدہ میں منہ سے معدہ تک گذار سکتے ہیں۔ اسکی لمبائی ۹ سے ۱۰ انچ تک ہوتی ہے۔ غذا کی ملی میں تین تنگ حصے ہوتے ہیں۔ ایک اسکی ابتدا پر ہوتا ہے، اور ایک وہاں ہوتا ہے جہاں بایاں شعبہ اسکو عبور کرتا ہے، اور تیسرا وہاں ہوتا ہے جہاں یہ ڈایا فرام میں سے گزرتی ہے۔ انہی تین تنگ مقامات پر اجسام غریبہ کے اگلنے کا سب سے زیادہ احتمال ہوتا ہے اور اکل اشیا کے نکلنے سے پہلے تصفیقات نمودار ہوتے ہیں، اور سرطان کے پیدا ہونے کا سب سے زیادہ امکان بھی یہیں ہوتا ہے۔ بوجی (bougie) گذارتے وقت یہ مقامات سامنے کے دانتوں سے ۷، ۱۱، ۱۲ انچ اور ۱۷ انچ کے فاصلہ پر پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ طعام بیریم سلفیٹ (barium sulphate meal) کے کھلانے کے بعد شعاعی ترسیم میں دیکھا جاتا ہے، پہلا بچاؤ وچھے غشی فقرہ کے سایہ کے مقابل اور دوسرا چھٹے ٹھہری فقرہ کے سایہ کے مقابل اور تیسرا دسویں ٹھہری فقرہ کے لیول پر پایا جاتا ہے۔ مری کی ابتدا اور انتہا پر تنگی پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان مقامات کا عضلی نظام عاصری نوعیت کا ہوتا ہے۔ اور غذا گزارنے کے وقت کے علاوہ ان مقامات پر دروند بند رہتا ہے۔ بعض حالتوں کے زیر اثر مری نیچے کمرے کے عاصری تشنج کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اجتماع غذا کے باعث مری میں تساع واقع ہو جاتا ہے۔ مری کے کھلا ہونے کی حالت میں ان مقامات میں سے ہر ایک کا قطر ۱/۲ انچ (۱۳ ملی میٹر) سے ذرا زائد ہوتا ہے اور باقی مقامات پر تقریباً ۳/۴ انچ (۷ تا ۲۱ ملی میٹر) ہوتا ہے۔ زور سے اتساع کرنے سے اوپر کے دونوں تنگ حصے ۱۸ تا ۱۹ ملی میٹر تک اور نیچے کا حصہ ۲۵ ملی میٹر اور باقی غذا کی نالی تقریباً ۱ ۱/۲ انچ (۳۵ ملی میٹر) کے قطر تک تسع کی جا سکتی ہے۔

مری کے علاقہ جات میں سے مندرجہ ذیل امور کی مثالیں جراحی مزا و دست میں دیکھنے میں آتی ہیں:- غذا کی ملی تقریباً تمام ممر میں فقری عمود کی سامنے کی طرف سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ گردن میں قصبہ اسکے عین سامنے ہوتا ہے۔ صدر میں بایاں شعبہ، بائیں شعبتی غد و گرد قلب اور بایاں بطین اسکے سامنے ہوتے ہیں اور دونوں اعصاب تائیہ (vagi) اسکے ارد گرد ایک ضغیرہ بنادیتے ہیں۔ بائیں شعبتی غد و کلانی یافتہ ہونے کی حالت میں بعض اوقات غذا کی ملی پر دباؤ ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے منغم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ یہ اس میں

مختص المقام لینت پیدا کر دیتے ہیں اور عطفات کی پیدائش کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ صدری قنات (thoracic duct) صدر کے بالائی حصہ میں پیچھے سے گذر کر غذا کی نلی کی بائیں جانب پر آ جاتی ہے۔ اور اونچے کے حصہ میں اور طہ جو پہلے مری کی بائیں جانب ہوتا ہے، بتدریج اسکی پھیل جانے پر پہنچ جاتا ہے۔ مزید برآں یہ کسی حد تک دونوں پلوراؤں سے بھی تعلق رکھتی ہے مگر دائیں جانب کی غشا سے اسکا تعلق خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ اخیر میں باز گرد خجری (recurrent laryngeal) عصب اسکے اور قصبہ کے درمیان اوپر کی طرف کو جاتا ہے (دیکھو شکل ۲۲ صفحہ 264)۔

مری کی حسی عصبی راسد زیادہ تر جیل کے پانچویں نہری قطعہ سے آتی ہے (ہنڈ Head: غذا کی نلی کے سرطان یا احتراقات کی حالت میں درو اس قطعہ کی جلد سے منسوب ہوتا ہے) (دیکھو شکل ۸۵ صفحہ 390)۔

جو اجسام غریبہ غذا کی نلی میں پھنس جاتے ہیں ان سے تقرحات کے پیدا ہونے کا بہت احتمال ہوتا ہے جو بعض اوقات ہم پہلو حصوں مثلاً اور طہ، قصبہ یا شعبہ میں کھل جاتے ہیں۔ غذا کی نلی کا سرطان جب پھیلتا ہے تو ہم پہلو حصوں پر اسکے حملہ آور ہونے اور خا صکر قصبہ یا شعبہ جات میں کھل جانے کا امکان ہوتا ہے۔ پلورا تک پھیلنے کی حالت میں یہ بالعموم دائیں پلورا پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ یہ غشا غذا کی نلی سے زیادہ قریبی تعلق رکھتی ہے۔ غذا کی نلی کا سرطان کبھی کبھی اس طرح پھیلتا ہوا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سے جسم درنی گرد قلبہ اور شش ماؤف ہو گئے ہیں۔ اور ایک حالت میں بین ضلعی شریان اور دوسری میں دائیں زیر نرقوی (subclavian) کھل گئی تھی۔

مریوی تشوہات (oesophageal malformations) - نوزائیدہ

میں مری کا بالائی حصہ بعض اوقات کورانہ ختم ہو جاتا ہے اور نیچے کا حصہ ایک فتح سے شروع ہوتا ہے جو قصبہ کے دو حصوں میں منقسم ہونے کے مقام میں یا اسکے قریب واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ دودھ پہلے حنجرہ اور قصبہ سے گذر کر ہی معدہ میں جاسکتا ہے۔ دم گھٹنے یا عنقونی ذات الریہ سے موت جلد ہی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت اس فاصل کے سوؤ نموکا نتیجہ ہوتی ہے جو آخر میں قصبہ اور مری کو علیحدہ

کرتا ہے۔ غشاء کے مخاطی کے فشاری عطفات (pressure diverticula) گاہے گاہے موثر جانب پر مری اور بلعوم کے مقام اتصال پر مری کے بالائی عاصی کے سین اور پرونا ہو جاتے ہیں۔ یہ بلعومی جیبوں (pharyngeal pouches) کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں۔ اور عضلہ مضیقہ تحتانیہ (inferior constrictor) کے زیریں کنارہ اور ان عاصی ریشہ جات کے درمیان بروز کرتے ہیں جو مری کے بلعومی دہنہ کو گہرے ہوتے ہیں۔ یہ عطفات اس لئے حلقی غضروف (cricoid cartilage) کے مقابل پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ جیب کا قعر مری کے بالائی سرے اور عمود شوکی کے درمیان واقع ہوتا ہے اس لئے جب یہ غذا سے پُر ہوتا ہے تو مری کی ابتدا کو لازمی طور پر مضبوط کر دیتا ہے۔ شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ برین سرے کے قریب مقدم دیوار سے چھوٹے چھوٹے جری عطفات (traction diverticula) پیدا ہو جاتے ہیں۔

224

پھنسنے ہوئے اجسام غریبہ بالعموم مری بین (oesophagoscope) میں سے

دور کئے جاتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی جب یہ آلہ حاصل نہیں ہو سکتا مری شگافی (oesophagiotomy)

کرنا لازم ہوتا ہے۔ غذا کی نلی تک عام طور پر بائیں جانب سے رسائی کی جاسکتی ہے کیونکہ یہ اسی طرف کو زیادہ نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ شگاف عضلہ قصیہ حلیہ (sterno-mastoid) اور قصبہ کے درمیان اسی رخ میں دیا جاتا ہے جس میں مشترک سباتی (common carotid) کے باندھنے کے لئے دیا جاتا ہے۔ درقی غضروف کی چوٹی سے لیکر قصی ترقوی مفصل تک کاٹ دیا جاتا ہے۔ عضلہ کتفیہ لامبیہ (omo-hyoid) کو یا تو باہر کی طرف کھینچ لیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عروق، عجزہ یا ورغده درقیہ ایک طرف کو کھینچ لئے جاتے ہیں اور اس امر کے متعلق ضرور احتیاط کرنا چاہئے کہ نہ تو یہ ساختیں زخمی ہوں اور نہ درقی عروق صدری قنات (thoracic duct) یا باز گرد عصب (recurrent nerve) ہی کو نقصان پہنچے۔ جب غذا کی نلی مبرا ہو جاتی ہے تو اسے انتصابی شگاف سے کھولا جاتا ہے۔ جب کبھی اس نلی کے حلقی حصہ سے کسی عطفہ یا سرطان کی علحدگی مقصود ہو تو اس تک اسی طرح رسائی حاصل کیجا سکتی ہے۔ صدری حصہ تک بائیں جانب پچھلی طرف سے کئی ایک پسلیاں دور کرنے اور مری تک پورا کے باہر سے رسائی کرنے سے پہنچا جاسکتا ہے (لی لیٹنٹھال: Lilienthal)۔

بڑے بڑے عرقی عروق۔ بڑے عرقی عروق کا ممر اور انکے تعلقات اور

تشریحات معہ ان عملیہ جات کے جن سے ان پر بندش لگائی جاسکتی ہے اور نیز ان طریقہ ہائے کار کے متعلق ذرا ذرا سی باتیں نہ صرف عملی جراحی کی کتابوں میں بلکہ تشریح کی بڑی بڑی انصافی کتابوں میں بھی اس تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ یہاں اس مضمون کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سباتی (carotid) اور زیر ترقوی (subclavian) شریانوں کے بڑے بڑے تعلقات شکل نمبر ۱۹۷ میں ظاہر کئے گئے ہیں۔

چونکہ عرقی اتصالی بافت ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، اس لیے اس میں انورسما پیدا ہو کر تیزی سے بڑھ سکتے ہیں اور ”دباؤ کے علامات“ بالعموم جلد ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ انکی مثالیں چہرہ اور جوارحہ اعلیٰ کا نمایاں تہج اور نیلا پن ہیں جو بڑی بڑی وریدوں پر دباؤ پڑنے سے پیدا ہوتے ہیں اور مخبری علامات ہیں جو باز گرد عصب (recurrent nerve) یا قصبہ پر دباؤ پڑنے سے پیدا ہوتے ہیں اور ڈایا فرام کا تشنج ہے جو ڈایا فرامی (phrenic) عصب پر دباؤ پڑنے سے رونما ہوتا ہے اور مشار کی کا خدر، اور دوران سراور ناقص بصارت ہیں جو دماغ کی عدم توت سے پیدا ہوتے ہیں۔

صرع کے مریضوں میں فقری شریان (vertebral artery) پر بندش لگائی جاسکتی ہے، مگر یہ امر مشتبہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ اسکے ارد گرد عرق حوکی اعصاب ہوتے ہیں جو تحتانی عرقی عقدہ سے آتے ہیں اور یہ لازمی طور پر ساتھ ہی بندھ جاتے ہیں۔ اس شریان تک عضلہ قصبہ صلبہ (sterno-mastoid) کے موخر کنارہ کے ساتھ ساتھ ترقوہ کے مین اوپرنگاف دینے سے رسائی کیجا سکتی ہے (دیکھو شکل نمبر ۱۹۷)۔ اسکے بعد سباتی درنہ (carotid tubercle) کی تلاش کیجاتی ہے اور عموداً اسکے نیچے عضلہ مختلف الاضلاع مقدم (scalenus anterior) اور عضلہ طویلہ عنقیہ (longus colli) کے درمیانی رخنہ میں شریان واقع ہوتی ہے اس طریق کار میں معتدبہ دقتیں پیش آتی ہیں۔

وریدوں میں ہوا کا دخول۔ گردن کی وریدیں تنفسی حرکات کے زیر اثر

ہیں۔ انہیں بہبوط واقع نہیں ہوتا کیونکہ یہ ارد گرد کی رداؤں سے چسپیدہ ہوتی ہیں اور اس کی

ایک عمدہ مثال اس مقام پر پائی جاتی ہے جہاں خارجی و داجی (external jugular) و رید عمقی ردا کو فوق تر قوی فضا میں منتقل کرتی ہے۔ دورانِ شہیق میں یہ عروق کم و بیش طور پر خالی ہو جاتے ہیں۔ اور دورانِ زہیق میں یہ کافی یافتہ اور تنزاد دار ہو جاتے ہیں۔ بہت کم کم کمراس آئینی حالت میں انجی جہاں سے فضا وقتاً بہت ہی بڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری و ریدیں جو صدر کی امتصاصی قوت کے زیر اثر ہیں صرف غلی و رید اور اسکی بڑی بڑی معاون و ریدیں ہیں۔ جب ان عروق میں سے کوئی ایک زخمی ہو جاتا ہے اور زخم ایک لمحہ کے لئے خشک رہتا ہے تو دورانِ شہیق میں ہوا آسانی سے اندر کھچ جاتی ہے اور اس سے دموی عروق شعریہ کی سدا بیت پیدا ہو جاتی ہے۔

گردن کی وریدوں کے اندر کے مصاریع - زیر تر قوی

(subclavian) اور انکی معاون و ریدوں میں مصاریع با فراط پائے جاتے ہیں۔ گردا خلی و داجی (internal jugular) میں صرف ایک جوڑا ہوتا ہے جو اس مقام پر واقع ہوتا ہے جہاں یہ ورید لاسمی و رید (innominate vein) میں داخل ہو کر ختم ہو جاتی ہے لاسمی ورید اور فوقانی ورید اجوف (superior vena cava) میں مصاریع نہیں ہوتے۔ جب صدر میں ورید دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے جیسا کہ بھاری بوجھ اٹھانے کی حالت میں ہوتا ہے تو صرف اعلیٰ و داجی ورید کے نہائی مصراع ہی اس دباؤ کو دماغ میں منتقل ہونے سے روکتے ہیں۔ جن حادثات میں صدر دغوتہ مضبوط ہو گیا ہو انیس سراور گردن حادثہ کے بعد کئی دنوں تک نیلے رہتے ہیں (ضربی بے تنفسی : traumatic asphyxia)۔ یہ نیلا پن غالباً و داجی مصراعوں کے کمزور ہو کر راستہ دے دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے سراور گردن کے عروق شعریہ پر اس سے زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔

جمل مشار کی کا حصہ عمقی - اگر گردن کے کسی عملیہ کے دوران میں جمل مشار کی

جو فوقانی و وسطیٰ اور تحتانی عمقی عقدوں کو ملاتا ہے کٹ جائے یا کسی بندش میں شامل ہو جائے تو واضح علامت کا ایک سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے جو زیادہ تر اسی طرف کی آنکھ اور مجر میں دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ یاد ہو گا کہ جو عصبی ریشہ جات عینیہ کے متبع عضلہ اوپر کے پوٹے کے غیر محظوظ جفنی عضلہ مجر کے غیر محظوظ عضلہ اور چہرہ کے عرقی غد کو رسد پہنچاتے ہیں اور نیز چہرہ، زبان اور گردن کی

اور منصفی (mediastinal) غدد کے ساتھ مسلسل ہو جاتا ہے۔

یہ غدد اکثر کلائی یافتہ اور ملتبہ ہو جاتے ہیں اور لمفی نظام کے اسی حصہ میں لمفی غدد کی تدریجی کلائی نہایت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غدد میں جو الہابی عوارض پائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ثانوی قسم کے ہوتے ہیں اور اطراف جسم کے ان حصوں کے اختلالات کا نتیجہ ہوتے ہیں جن سے یہ فرداً فرداً لف وصول کرتے ہیں۔ لہذا یہ مناسب ہو گا کہ بعض غدد کے تعلقات کو اطراف جسم کے بعض حصوں سے منسوب کر لیا جائے۔

چاندلی۔ مونو حصہ = قذالی اور پس اذینی غدد۔ جبہ اور جداری حصہ جات = پیش اذینی غدد (شکل ۵۵)۔

مزید آں چاندلی کے عروق غدد کے سطحی عنقی گروہ میں بھی داخل ہوتے ہیں۔
چہرہ اور گردن کی جلد = زیر چانوی۔ پیش اذینی اور سطحی عنقی غدد۔

229

اذن خارجی = سطحی عنقی غدد۔

نیچے کالِب = زیر چانوی اور فوق لامی غدد۔

کہفہ دہن = زیر چانوی غدد اور عمیق عنقی غدد (بالائی گروہ)۔

نیچے کے جڑے کے مسوڑے = زیر چانوی غدد۔

زبان۔ مقدم حصہ = فوق لامی اور زیر چانوی غدد۔ مونو حصہ = عمیق عنقی غدد (بالائی گروہ)۔

لوزین اور حنک = عمیق عنقی غدد (بالائی گروہ)۔

بلعوم۔ بالائی حصہ = پیش اذینی اور پس بلعومی غدد۔ زیرین حصہ = عمیق عنقی غدد (بالائی گروہ)۔

خنجرہ۔ مجر اور منہ کی چھت = عمیق عنقی غدد (بالائی گروہ)۔

انفی حفرہ جات = پس بلعومی غدد۔ عمیق عنقی غدد (بالائی گروہ)۔ ان حفرہ جات کے

مونو حصہ کے بعض لمفی عروق پیش اذینی غدد میں داخل ہوتے ہیں۔

عین عقی غدد کے دور کرنے میں متعدد بافتوں کے زخمی ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ یہ غد اکثر داخل و داجی (internal jugular) ورید کے ساتھ مضبوطی سے منضم ہو جاتے ہیں۔ بالاترین غد شوقی معین (spinal accessory) عصب کو گھیرے ہوتے ہیں۔ سطحی عقی اعصاب زیریں عقی عقی گروہ کے غد میں سے گزرتے ہیں۔ صدری قنات (thoracic duct) بائیں ترقوی حفرہ کے غد کو علیحدہ کرنے کے دوران میں زخمی ہو چکی ہے۔


صدری قنات (thoracic duct) گردن میں۔ اگر ترقوہ کے

بالائی کنارہ پر اسکے قصی سرے سے ۱ انچ کے فاصلہ پر ایک نقطہ مقرر کیا جائے تو یہ داخل و داجی اور زیر ترقوی وریدوں کے درمیانی زاویہ کی نشان دہی کرے گا جس پر یا جس کے نزدیک صدری قنات ختم ہوتی ہے۔ ان ۴۰ اجسام میں سے جن پر ایف۔ جی۔ پارسنس (F. G. parsons) اور پی۔ ڈبلیو۔ جی۔ سارجنٹ (P. W. G. Sargent) نے تحقیق کی ہے، ۳۵ میں یہ قنات داخل و داجی ورید کے انتہائی سرے پر ختم ہوتی ہوئی پائی گئی۔ ان واقعات میں سے تقریباً نصف میں قنات کا آخری حصہ منقسم ہو گیا تھا۔ اس کے کثیر دودھنہ جات ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی تعداد چار تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اختتام پر یہ قنات مختلف الاضلاع مقدم (scalenus anticus) اور ڈیافرامی (phrenic) عصب پر سے باہر کی طرف کو اپنے مقام دخول سے اوپر خم کھاتی ہے جہاں اس میں بالعموم مصاریع ہوتے ہیں۔ اس قنات کی بندش سے قاعدۂ ناموافق علامات پیدا نہیں ہوتے، اور یہ اس کے اور صدر کی دائیں جانب کیے عروق لف کے درمیان آزاد تنفس موجود ہونے اور مجسود ویدوں (azygos veins) کے ساتھ رابطہ رکھنے کا نتیجہ ہے (لیف: Leaf)۔ جب یہ قنات بائیں شریک باتی (common carotid) اور زیر ترقوی (subclavian) شریانوں کے پیچھے سے گردن میں داخل ہونے کے لئے اوپر کی طرف چڑھتی ہے تو یہ پیچھے کے پورے کس کرتی ہوئی جاتی ہے۔ دائیں جانب میں قنات صدری (thoracic duct) کا قائم مقام دایاں لٹمی تنا ہوتا ہے۔ ان دونوں بڑے بڑے لٹمی مجاری کے معاونوں میں صدر میں آزاد راہ ور ربط پایا جاتا ہے۔

خیشومی ناسور (branchial fistulae)۔ کبھی کبھی گردن میں بعض خلقی ناکو

پائے جاتے ہیں جو خیشومی درزی انخفاضات میں سے کسی نہ کسی ایک کے جزوی طور پر برقرار رہنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انخفاضات جنین میں خیشومی محرابوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں اور ان محرابوں کی

231



شکل ۱۵۔ گردن کی مختلف جنبشیں باقی بقیہ ساختوں کے محل اور تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۔ لوزو۔ جب۔ لوزی ناچ کا بقیہ حصہ (دوسرے درزی گوشہ سے)۔ ج۔ سہاتی جسم خارجی اور داخلی سہاتی
شریانوں کے درمیان۔ ۲۔ تیوسہ کی ڈنڈی (تیسری درز)۔ ہ۔ عینتی جوف (جو بائیں جانب پر دوسری درز کے گوشہ سے
متحد ہے)۔ م۔ عینتی تیوسہ۔ ص۔ مشترک سہاتی۔ ص۔ درقی اور درقی لسانی قنات کا وسطی حصہ۔ ط۔ وسطی درقیہ کا
زیر لانی حصہ۔ ع۔ جانی درقیہ کی ڈنڈی جو چوتھی درز سے پیدا ہوتی ہے۔ ق۔ تیوسہ مدریں۔

تعداد بالعموم پانچ بیان کی جاتی ہے پہلی نیچے کے جبرے اور مٹتی (malleus) کے لئے بنیاد کا کام
دیتی ہے۔ دوسری سے زائکدہ ابیریہ (styloid process) ابیری لامی (stylo-hyoid) رابطہ

اور عظم لامی کا قرن اصغر نمونہ پاتا ہے۔ تیسری سے عظم لامی کا جسم اور اس کا قرن اعظم بنتا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں عظم لامی کے نیچے کے گردن کے غضروفوں اور نرم حصوں کے ٹکڑوں میں حصہ لیتی ہیں۔ پہلی درز پہلی اور دوسری محرابوں کے درمیان ہوتی ہے۔ "عنقی خیشومی ناسور بہت باریک قناتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور گردن کے اگلے حصہ کی ایک یا دونوں جانب پر چھوٹے چھوٹے دھنوں میں کھلتے ہیں۔ اور یہ جیچھے کی اور اندر کی یا بیچھے کی اور اوپر کی سمت میں بلعوم یا مری کی طرف کو جاتے ہیں۔" (پیجٹ: Paget)۔ انکا طول ۱۱ انچ سے لیکر ۲۱ انچ تک ہوتا ہے اور انکا قطر حیوانات کے سخت بال اور معمولی سلائی کے قطر کے درمیان درمیان ہوتا ہے۔ عنقی ناسور کا دھنہ بالعموم قصی ترقوی منفصل کے عین اوپر واقع ہوتا ہے اور عنقی جوف (cervical sinus) کا قائم مقام ہوتا ہے (شکل ۵۶) جو ایک نشیب یا جیب ہوتی ہے جو جنین کی گردن کے نموکے دوران میں بنتی ہے اور یہ جوف خیشومی اور حثوی درزوں کے مشترک دھنہ کا کام دیتا ہے جن میں لوزہ تیموسہ اور جانبی درقہ جات نمونہ پاتے ہیں۔ یہ ناسور اوپر کی طرف کو چڑھتا ہوا مشترک سباتی شریان کی دو شاخ کی طرف چلا جاتا ہے جہاں یہ بعض اوقات جسم سباتی (جو تیسری درز سے پیدا ہوتا ہے) سے یا لوزی گوشہ سے (جو دوسری درز سے پیدا ہوتا ہے) ربط پیدا کر لیتا ہے۔ اس سے یہ امر ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ صرف انہی تاجی ساختوں اور بروں بالیدوں کے حصے باقی رہ سکتے ہیں۔ ایسے بقیہ حصے عنقی دو بروں کے لئے بنیاد کا کام دیتے ہیں۔ مزید برآں گردن کے بعض ادمہ نما دویرے اور بعض کثیر دویری عنقی سلعات بھی جو "گردن کے قیلہ مانیہ" کی ایک شکل میں نمودار ہوتے ہیں انہی خیشومی بقایا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ناسوروں کے منہ پر یا اس مقام پر جہاں یہ بالعموم واقع ہوتے ہیں بعض اوقات جلد کے تسے نمودار ہو جاتے ہیں جن میں کبھی کبھی غضروف بھی ہوتا ہے۔ انکو مستزاد اذن (supernumerary auricles) کہتے ہیں۔ کیونکہ انہا ناسوروں سے وہی تعلق ہوتا ہے جو اذن خارجی کا پہلی حثوی درز سے ہوتا ہے۔

حنجرہ کا بطن جیسا کہ طبعی طور پر بہت سے بندروں میں پایا جاتا ہے بعض اوقات مستطول ہو کر ایک تاجہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو درقی لامی غشا میں سے گزر جاتا ہے اور اس طرح گردن کے حنجری خطہ میں ایک عنقی ہوائی دوبرہ (cervical air-cyst) یا تاجہ (sac) بن جاتا ہے۔

حصہ دوم

صدر

باب ہفتم

چھاتی اور اس کے احتشاء

صدری دیواریں

233

چھاتی کی دونوں طرفیں شاذ و نادر ہی متشاکل ہوتی ہیں۔ دائیں طرف کا محیط بالعموم زیادہ ہوتا ہے اور اس امر کے متعلق یہ خیال کیا گیا ہے کہ اسکی وجہ جوارح اعلیٰ کا غیر مساوی استعمال ہے۔


پاٹ کے مرض (Pott's disease) میں جبکہ ظہری خط ماؤف ہوا اور عمود فقری آگے کی طرف کھ

بہت خمیدہ ہو گیا ہو تو صدر میں بہت بدشکلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مقدم موخر قطر زیادہ ہو جاتا ہے۔ قفس (sternum) آگے کی طرف کھ نکلتا ہے اور عمود فقری کو خمیدہ کرنے سے یہ بھی خمیدہ کیا جاسکتا ہے۔ پسلیاں دب کر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جسم میں بعض اوقات استدر قصر واقع ہو جاتا ہے کیونچہ کی پسلیاں حرقنی عرف (iliac crest) پر متر اکب ہو جاتی ہیں۔

کبوتر سینگلی (pigeon-breast) کی بدشکلی میں قص اور غضروف سامنے کی طرف

کو اس طرح ابھر آتے ہیں کہ چھاتی کی مقدم موخر پیمائش بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور پسلیوں اور انکے غضروفوں کے خط اتصال کے ساتھ ساتھ ایک عمیق تجویف پیدا ہو جاتی ہے۔ ضلعی غضروفی اتصال

پر جب صدور کے نیچے بیٹھ جانے ہی سے یہ ابھار پیدا ہوتا ہے۔ بچوں میں اور خاصاً مسکساحت زدہ بچوں میں صدر بہت نرم اور لمبکدار ہوتا ہے۔ اور اگر ہوا کے داخل ہونے میں کوئی مستقل رکاوٹ ہو جو درجہ جیسی کہ بہت کٹانی یا فتمہ لوزین سے ہوتی ہے تو صدری دیواریں کچھ عرصہ کے بعد اس انتظام کی وجہ سے جو ان پر دوران شہیق میں اثر انداز ہوتا ہے دب جاتی ہیں۔ صدر کا کمزور ترین حصہ ہر ایک طرف ضلعی غضروفی خط کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور ایسے واقعات میں جب دور اسی مقام پر ہی واضح طور پر دیتے ہیں۔



284

شکل ۵۵ ان تغیرات کو ظاہر کرتی ہے جو صدر میں التواء کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں۔

(ریڈارڈ Redard: کے مطابق)

شوکی انحناء کا انحداب دائیں جانب کو ہے اس لفظا پسلیوں میں انکے زاویوں پر حاو غم پایا جاتا ہے مقرر (بائیں) طرف پر پسلیوں کا زاویہ کم ہلا ہے۔

چھاتی کے تشوہات شوکی عمود کے ظہری حصہ کے غیر طبعی انحناءوں کا نتیجہ ہوتے ہیں پسلیاں فقرات سے ضلعی فقری اور ضلعی عسری رابطات کے زریعہ سے مضبوطی سے مربوط ہوتی ہیں

لہذا فقرات کی وضع کے متغیر ہونے سے ضلعی سلسل میں بھی تغیرات واقع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ظہری خط میں تسیم (kyphosis) پیدا ہو جاتا ہے تو شوکہ کا بالائی حصہ اوپر کی پسلیوں اور قص کے ساتھ ہی آگے اور نیچے کی طرف کو جھک جاتا ہے۔ اس سے صدر کا مقدم موخر قطر بڑھ جاتا ہے مگر انتصابی اور مستعرض پیمائشیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب ظہری خط میں جانبی انحناء پیدا ہو جاتا ہے تو اس طرف کی پسلیاں جس طرف کو خم واقع ہوتا ہے لازمی طور پر مضبوط ہو جاتی ہیں اور طرف مقابل کی پسلیاں کھل جاتی ہیں۔ التواء فقری (scoliosis of the spine) میں نہ صرف جانبی انحناء

بنجائا تا ہے۔ بلکہ فقرات بھی ساتھ ہی گھوم جاتے ہیں۔ فقری اجسام عمود کی محذب جانب کی طرف کو چلے جاتے ہیں اور انکے شوک زوائد انکھ کی منفرع طرف کو آجاتے ہیں (شکل ۵)۔ منفرع طرف کی پسلیاں مستعرض زوائد کے دھکیلنے کی وجہ سے آگے کی طرف کو چلی جاتی ہیں اور انکے زاوے کھل جاتے ہیں اور چھاتی کی طرف پیچھے کو چپٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب (محذب) پر زاویہ بیکہ نمایاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ پسلیوں کے فقری سرے پیچھے کی طرف کو چلے جاتے ہیں اور آگے کی طرف سے یہ اندر کی طرف کو جھک جاتی ہیں۔ اس طرح چھاتی کا مستعرض قطر ترچھا ہو جاتا ہے (شکل ۵)۔ منفرع جانب پر بین ضلعی فضا میں تنگ ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پسلیاں بعض اوقات ایک دوسری سے مس بھی کرتی ہیں اور محذب جانب پر فضا میں وسیع ہو جاتی ہیں۔ صدری احتشاک کی شکل لازمی طور پر تراب ہو جاتی ہے اور ان کا محل تبدیل ہو جاتا ہے۔

235

قص (sternum)۔ قص کی اوپر کی کور دوسرے اور تیسرے ٹھری فقرات کے درمیان کی قرص کی متناظر ہوتی ہے۔ اور خجری قصبی مفصل دسویں ٹھری فقرہ کے وسط کا متناظر ہوتا ہے۔ جنین میں تکمیل میعاد پر قص کی اوپر کی کور پہلے ٹھری فقرہ کے وسط کے مقابل ہوتی ہے۔ (Symington: سمنگٹن) اسکی مقدم سطح پر ایک مستعرض حید یا زاویہ (زاویہ کوڈرک (angulus Ludovici) بالعموم محسوس کیا جاسکتا ہے جو یہ انقص (manubrium) اور جسم قص کے مقام اتصال کا متناظر ہوتا ہے اور دوسری ضلعی غضروف کی سیدھ میں ہوتا ہے۔ قصبی مفصل غضروفی (sternal synchondrosis) پر تنفسی حرکت ایک معتد بہ درجہ تک ہوتی ہے۔ صرف بہت بوڑھے آدمیوں ہی میں اس مفصل میں عظمی اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسکا ایک نمایاں زلائی کہنہ ہوتا ہے جسکے ارد گرد مضبوط لیفی اور لیفی غضروفی رباطات موجود ہوتے ہیں۔

اس ہڈی میں کسر شاذ و نادر ہی واقع ہوتا ہے کیونکہ یہ نرم اور اسفنجی ہوتی ہے اور پکدار پسلیاں اور انکے غضروفات اسکو کمائیوں کے ایک سلسلہ کی طرح مہارادیتے ہیں۔ بوڑھے آدمیوں میں جب غضروفات متعظم ہو جاتے ہیں اور چھاتی زیادہ استوار ہو جاتی ہے تو کسر کے واقع ہونے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ قص عمود فقری کی چوٹوں میں نہایت کثرت سے نکسہ پایا جاتا ہے اگرچہ سادہ بلا واسطہ ضرب سے بھی اس میں کسر واقع ہو سکتا ہے۔ یہ ہڈی

عمود فقری کو زور سے پیچھے کی طرف یا اسکو دفعہ آگے کی طرف کو جھکانے سے ٹوٹ جاتی ہے۔
 قسمی یدی (sterno-manubrial) متفصل (قسمی مفصل غضروفی: sternal synchondrosis) میں خلج بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ان چوٹوں میں ید القص بالعموم علی حملہ رہتا ہے، مگر قص کا جسم پسلیوں کے ساتھ ایسے آگے کی طرف کو متقل ہو جاتا ہے۔

تقریباً اور اسفنجی ساخت کی وجہ سے قص میں بہت سے عوارض مثلاً بوسیدگی اور مصغبتی گرد عظمی التهاب (gummatous periostitis) کے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ ہڈی میں تقابلی نرمی یہاں تک پائی جاتی ہے کہ قاتلانہ زخموں کی حالت میں چاقو اس میں سے گذر گیا ہے۔ اس ہڈی کی شکل اور اسکا محل بھی دباؤ سے متغیر ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض اوقات ان اہل حرفہ میں دیکھنے میں آتا ہے جو ایسی خدمتوں پر مامور ہوتے ہیں جنہیں اوزاروں وغیرہ کو چھاتی سے دانا پڑتا ہے۔

بعض اوقات قص کے وسط میں خاص قسم کے سوراخ پائے جاتے ہیں جنہیں سے منصفی خراج باہر نکل آتے ہیں اور سطحی خراج صدر کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سوراخ دائیں اور بائیں قسمی سلاخوں کے ناقص اتحاد کا نتیجہ ہوتے ہیں جن سے کہ قص طیار ہوتا ہے۔ جن واقعہ کے متعلق ای گرو (E. Groux) نے اطلاع دی ہے اس میں انتصابی رخ میں ہڈی کے دو حصے علیحدہ علیحدہ پائے گئے تھے، اور رزخ عضلی جہد سے وسیع کیا جاسکتا تھا اور قلب جو صرف نرم حصوں سے پوشیدہ تھا معا ہو جاتا تھا۔ ایک اور واقعہ میں جبکا اندراج ڈگلس (Douglas) نے کیا ہے صرف نیچے کا حصہ ہی متحد تھا۔ قص کا بالائی حصہ انتصابی رخ میں کاٹا جا چکا ہے اور ہر ایک نصف تنظر پسلیوں کے ساتھ ان ساختوں تک رسائی حاصل کرنے کے لئے جو فوقانی منصفی موجود ہوتی ہیں آگے کی اور باہر کی طرف کو اٹایا جا چکا ہے۔

پسلیاں اتنی ترچھی واقع ہوتی ہیں کہ ایک سسلی کا مقدم مرا کسی دوسری پہلی

موجودہ سے کیوں پر ہوتا ہے جو تعدادی ترتیب کے لحاظ سے اس سے کچھ نیچے واقع ہوتی ہے چنانچہ سامنے کی طرف سے دوسری پسلی پچھلی طرف سے پانچویں پسلی کی متناظر ہوتی ہے اور ساتویں کا منہلی دسویں کا متناظر ہوتا ہے۔ اگر جسم کے گرد گت کے تحتانی زاویہ کے لیول پر ایک افقی خط کھینچا جائے جبکہ بازو جسم کے اطراف پر ہوں تو یہ خط سامنے کی طرف قص کو

پچھلے غضروف کی چسپیدگی پر اور یا پچھلی پسلی کو حلی خط پر اور نویں پسلی کو عمود فقری پر کاٹیں گے۔ دوسری پسلی کو ایک استعرض حید نظر کرنا ہے جو نقص پر ہوتا ہے اور جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے (زاویہ ٹوڈوک (angulus Ludovici) عضلہ صدر کیبرہ (pectoralis major) کاریں کنارہ یا پچھلی پسلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور عضلہ فشتار کیبرہ (serratus magnus) کا پہلا سرئی تشرشر جھٹی پسلی کا تناظر ہوتا ہے۔ ساتویں پسلی سب سے لمبی ہوتی ہے اور پہلی سب سے چھوٹی۔ سب سے زیادہ ترجیحی پسلی نویں ہوتی ہے۔ جب بازو اپنی طرف پر لٹکا ہوتا ہے تو کتف کاریں زاویہ ساتویں پسلی کو پوشیدہ کئے ہوتا ہے۔

237

پسلیاں لچکدار اور بہت خمیدہ ہوتی ہیں اور چونکہ یہ بہت سے رباطات کے ذریعہ پچھلی طرف مود سے اور آگے کی طرف دب جانے والے غضروفوں سے چسپیدہ ہوتی ہیں اسلئے یہ کمائی کے خواص سے ایسی چوڑیوں کی مزاحمت کرتی ہیں جن سے کس واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پسلی میں بالواسطہ ضرب سے کس واقع ہو سکتا ہے، مثلاً آجت لینے کی حالت میں پیٹے کے جسم پر سے گزر جانے سے۔ ایسی حالت میں قوت کا رجحان ہڈی کے دونوں سروں کو قریب لانے اور خم کو بڑھانے کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ ٹوٹتی ہے تو یہ اصلی خم کی چوٹی پر سے یعنی اپنے وسط کے قریب سے ٹوٹتی ہے۔ قطعاً باہر کی طرف کو شکستہ ہوتے ہیں اور پورا کے منقبت ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جب سلی بلا واسطہ ضرب سے ٹوٹتی ہے تو ضرر اس مقام پر واقع ہوتا ہے جہاں چوٹ لگی ہو۔ ہڈی اندر کی طرف کو ٹوٹتی ہے اور ہڈی کے خم کا رجحان بڑھنے کی بجائے کم ہونے کی طرف ہوتا ہے اور مٹکڑوں کے پورا کو دریدہ کرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔

جو پسلیاں اکثر ٹوٹتی ہیں وہ چھٹی ساتویں اور آٹھویں ہیں کیونکہ معمولی حالات تحت یہ سب سے زیادہ معرا ہوتی ہیں۔ جس پسلی میں کس سب سے کم واقع ہوتا ہے وہ پہلی ہے جو تر قوہ کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے۔ سن رسیدہ اشخاص میں پہلی پسلی کی غضروف اکثر ٹکس پائی جاتی ہے اور اس میں گاہے گاہے کس بھی واقع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ۵۰ سال سے زائد عمر کے اکثر اشخاص میں پہلی پسلی کی غضروف کم و بیش حد تک ٹکس اور متعظم ہوتی ہے اور اسلئے اس قسم کی پسلیوں کی لچک اور حرکت پذیری میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ پیرانہ سالی میں غضروفوں میں تعظم واقع ہونے کی وجہ سے سن رسیدہ اشخاص میں یوں کی نسبت

کسور زیادہ کثیر الوقوع ہیں۔ پسلی میں کسر واقع ہونے کے بعد قصر واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ہڈی آگے اور پیچھے دونوں طرف مثبت ہوتی ہے اور انتصابی غیر وضیعت کو بین ضلعی عضلات کی چسپیدگیاں مانع آتی ہیں۔ چنانچہ تا وقتیکہ متوالی پسلیوں میں کسر واقع نہ ہو کوئی بدیہہ بدشکلی رونما نہیں ہوتی۔ یہ ہڈیاں **عضلمی فعل** کی شدت سے بھی ٹوٹ چکی ہیں مثلاً کھانسنے کے دوران میں اور شدید دفاعی کوششوں کے دوران میں جیسی کہ وضع حمل میں عمل میں آتی ہیں۔ ایسی مثالوں میں یہ ہڈیاں شاید پہلے ہی سے مذبول یا کسی مرض سے کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔

کساحت میں پسلیوں اور غضروفوں کے مقام اتصال پر تغیرات واقع ہوجاتے ہیں جو عظمی ارتفاعات کے بننے کا باعث ہوتے ہیں۔ ان ارتفاعات سے دونوں طرف کی پسلیوں کے متاثر ہونے کی صورت میں ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے ”جو کساحتی سیم“ (rickety rosary) کے نام سے موسوم ہے۔ ضلعی غضروفی اتصالات جن پر یہ کلانیاں واقع ہوتی ہیں لمبی ہڈیوں کے برابری خطوں کے متناظر ہوتے ہیں اور یہ وہ خطوط ہیں جن پر طول میں اصلی بالیدگی واقع ہوتی ہے۔

بین ضلعی فضا میں پیچھے کی نسبت آگے زیادہ چوڑی ہوتی ہیں! اور نیز

بالائی پسلیوں کی درمیانی فضا میں نیچے کی پسلیوں کی درمیانی فضاؤں سے زیادہ چوڑی ہوتی ہیں۔ سب سے چوڑی فضا تیسری ہے۔ پھر دوسری ہے اور پھر پہلی۔ ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں بین فضا میں پسلیوں کے زاویوں کے سامنے کی طرف بہت تنگ ہوتی ہیں۔ فضا میں شہیق میں چوڑی ہو جاتی ہیں اور زیریں تنگ! اور جسم کو مقابل جانب کی طرف جھکانے سے زیادہ چوڑی کیجا سکتی ہیں۔

پلورائی کہف کا نزل بالعموم چھٹی یا ساتویں فضا میں یا تو قص اور عمود فقری کے

یا مقدم اور موخر بغنی خطوط کے عین درمیانی مقام پر کیا جاتا ہے۔ ساتویں فضا کتف کے زاویہ کے تعلق سے آسانی شناخت کیجا سکتی ہے۔ جب بازو طرف جسم کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ زاویہ اس فضا پر ذرا سا تراکب کرتا ہے۔ اگر کسی یریں فضا کا انتخاب کیا جائے تو بالخصوص دائیں جانب پر ڈایا فرام کے زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آٹھویں یا نویں فضا منتخب

کیجائے تو شکاف کتف کے زاوئے کے خط کے عین باہر دیا جاتا ہے۔ مبزل کو دوران شہیق میں جبکہ فضا چوڑی ہو جاتی ہے داخل کرنا چاہئے اور بین ضلعی عروق کو بچانے کے لئے اسے حتی الامکان فضا کے یزین کنارے کے قریب رکھنا چاہئے۔ پسلیوں کے زاویوں کے پیچھے سے کسی فضا میں سے چھاتی کا بزل غیر ممکن العمل ہے کیونکہ اس مقام پر دیوار صدر پر عضلات کا ایک موٹا غلاف موجود ہوتا ہے۔ نیز بین ضلعی شریان جس کا ممر متناظر پسلیوں کے مقابلہ میں زیادہ تر چھا ہوتا ہے فضا کے اس حصہ کے وسط کو عبور کرتی ہے۔ زاویہ کے اگلی طرف بین ضلعی عروق اُس پسلی کے تحتانی کنارہ کے حید میں واقع ہوتے ہیں جس سے فضا کی بالائی حد بنتی ہے۔ ورید شریان کے عین اوپر واقع ہوتی ہے اور عصب اسکے عین نیچے واقع ہوتا ہے۔ مگر اوپر کی چپ ریا پانچ فضاؤں میں عصب ابتدا میں شریان سے اونچا ہوتا ہے۔

گرد قلبہ (pericardium) کا بزل سوئی کو خنجر ہی قص (xiphisternum)
اور ضلعی حاشیہ کے درمیانی زاویہ کے راس میں سے اوپر کی اور ذراسی بائیں جانب کی سمت میں داخل کرنے سے بہترین طور پر کیا جاسکتا ہے۔

پیمپ بین ضلعی عضلات کی دونوں تہوں کے درمیان کی ڈھیلی ڈھالی یافت کے
ساتھ ساتھ بآسانی جاسکتی ہے۔ چنانچہ فقرات کے یا پسلیوں کے موخر حصوں کے مرض میں جو تقبج پیدا ہوتا ہے اس میں پیمپ بعض اوقات بین ضلعی فضاؤں کے ساتھ ساتھ قص تک پہنچ جاتی ہے اور اس طرح مرض کے اصلی محل سے معتد بہ فاصلہ پر آکر نکل جاتا ہے۔

پسلیوں کا دور کرنا۔ پلورائی کہفہ میں کشادہ فتحہ بنانے کے لئے ایک یا دو

پسلیوں کے کچھ حصہ کا استیصال کیا جاسکتا ہے۔

طویل المدت و بیلہ (empyema) کے بعض مریضوں میں جن میں ایک کھلاجہ
موجود ہو صدر کی عظمی دیوار کا وہ تمام حصہ جو قاع کہفہ کی بیرونی حد کا متناظر ہوتا ہے دور کر دیا جاتا ہے تاکہ کہفہ میں ہبوط واقع ہو سکے اور اس سے یہ بند ہو سکے۔ یہ موثر الذکر تدبیر کو لین الصدر (thoracoplasty) کے نام سے موسوم ہے۔ بعض اوقات نو پسلیوں تک کو اگلی طرف سے خضرو فوں سے لیکر پچھلی طرف کو انکے زاویوں کے پیچھے کسی مقام تک دور کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اوپر کی پسلیوں کا جزئی استیصال (resection) نہایت ہی مشکل ہے۔ مگر بہت سی حالتوں میں

اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ پسلیاں شروع ہی میں دوسری پسلی تک معہ اسکے دورہ کر دی جائیں۔

پسلی دور کرتے وقت ہڈی مکشط (rugine) کے ذریعہ سے گردِ عظمہ سے بالکل معصرا کر لی جاتی ہے اور استیصال زیر گردِ عظمی ہوتا ہے۔ اس طریقہ سے بین ضلعی عروق جو فیضی میزاب میں ایک مجری میں سے جو گردِ عظمہ کے چھٹنے سے بنتا ہے گزرتے ہیں معرا نہیں ہوتے، اور اگر بعد میں انکو کاٹنے کی ضرورت ہو تو ان پر باسانی قابو حاصل کیا جاسکتا ہے، جبکہ پسلیاں راستہ میں حائل نہیں ہوتیں۔

داخلی پستانی شریان (internal mammary artery) قصبہ کے

کنارہ کے متوازی گزرتی ہے اور اس سے تقریباً ۱۱ انچ کے فاصلہ پر ہوتی ہے۔ اگر یہ زخمی ہو جائے تو بعض اوقات ایسا زرف واقع ہوتا ہے جو جلد ہی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس عرق پر پہلی تین بین ضلعی فضاؤں میں آسانی سے اور چوتھی یا پانچویں فضاؤں میں کبھی مشکل سے قابو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دوسری فضا میں سے اس تک نہایت آسانی سے رسائی کی جا سکتی ہے اور پانچویں فضا سے نیچے کی کسی ایک فضا میں سے اسکو قابو میں نہیں لایا جاسکتا۔ یہ عرق صدری دیوار کی تمام ساختوں سے سوائے پلورا کے اونچے حصہ میں سوائے عضلہ مثلثہ قصیہ (triangularis sterni) کے گہرا واقع ہوتا ہے۔

پستان اس مقام پر جبکی نشاندہی بعد ازاں حملہ سے ہوتی ہے سر حملہ کے

ایک ٹھوس انغماد کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ جنینی زندگی کے تقریباً چھٹے مہینے میں اولین پستانی غنچہ میں سے زیر جلدی بافت کے اندر تمام سستوں میں شاخیں نکل آتی ہیں، جن سے اس بافت کے بستہ ہونے سے پستانی کیسہ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پستان کی فضائی بافت میں نمودار ہونے کے دوران میں سہلکیں کیسہ کے پس پستانی حصہ سے شروع ہو کر بین لٹکل فضاؤں میں سے ہوتی ہوئی زیر جلدی بافت تک چلی جاتی ہیں اور اس طرح جلد تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسلئے سر لٹکل پستان کے معہ اس کیفیت کے جو اس سے نتیجہ پیدا ہوتی ہے ایک طرف تو ماتحت روائتک اور دوسری طرف سطحی فضاؤں (ایسٹلے کوپر Astley Cooper) کے

نام نہاد "تعلیقی رباطات" تک پھیلنے کا احتمال ہوتا ہے۔ لہذا مدداری ردا کے ساتھ انضمام موجود ہونے کے امارات کے پائے جانے اور نیز جلد کے چپکنے کی جو اکثر اس مرض کا امتیازی خاصہ ہوتے ہیں توقع کیا جاسکتی ہے۔ چونکہ حلیفیت (scirrhous) کی وجہ سے جو کہ اس بے خاشا خلوی بالیدگی کو جو سرطان کا لازمی خاصہ ہے روکنے کے لئے قدرت کی طرف سے ایک کوشش ہے اندر کی طرف کو کھینچ جاتا ہے اسلئے اس سائنٹ (حلمہ) میں بعض تغیرات کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے مثلاً باز کشیدگی، لیول کی تبدیلی اور سمت کے تغیرات۔

پستان کے نیچے ردا ہوتی ہے جو عضلہ مدداریہ کبیرہ (pectoralis major) اور عضلہ نشراریہ کبیرہ (serratus magnus) کے کچھ حصہ اور نیز عضلہ مستقیمہ بطنیہ (rectus abdominis) اور عضلہ موربہ (external oblique) کے مبادی کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ عضو اس عظیم لمفی مدار سے جو دھڑ کو ڈھکے ہوتا ہے قریبی تعلق رکھتا ہے اور یہ امر سرطان کے انتشار پر بحث کرنے اور اس کی بیخ کنی کے لئے عملیہ ترتیب دینے کے لحاظ سے نہایت ہی عظیم الٰہمیت ہے۔ اس لمفی مدار کا اور خاکر قوق السری حصہ کا جسکی مسیلیت اوپر کی سمت میں بغل کی طرف ہوتی ہے مطالعہ ایک ساتھ کرنا چاہئے۔ عورت میں پستان ایک عریض قرص کی شکل کی ہوتی ہے اور اوپر کی طرف سے دوسری پسلی سے لیکر نیچے کی طرف چھٹی پسلی تک اور قفسی حاشیہ سے لیکر وسط بغلی خط تک پھیلی ہوتی ہے (سٹائلز: Stiles)۔ لہذا یہ زیادہ تر عضلہ مدداریہ کبیرہ (pectoralis major) کے اوپر واقع ہوتی ہے مگر اس غدہ کا پورا ایک تہائی حصہ عضلہ نشراریہ کبیرہ (serratus magnus) کے اوپر لیکن ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ عضلہ موربہ خارجہ بطنیہ (oblique externus abdominis) اور عضلہ مستقیمہ بطنیہ (rectus abdominis) کے مبادی پر مترکب بھی ہوتی ہے۔ لہذا ان عضلات کو یا انکے مبادی رداؤں کو سرطان زدہ پستان کو دور کرتے وقت ضرور ملحوظ کر دینا چاہئے۔ علاوہ ازیں اس عضو کے الہاب میں یا اس کے استیصال کے بعد ان عضلات کو آرام دینے کی تدبیریں ضرور اختیار کرنا چاہئیں۔ مزید برآں پستان اگرچہ عمومی طور پر ایک قرص کی شکل میں پھیلی ہوتی ہے مگر اس سے محیطی زوائد بھی نکلے ہوتے ہیں اور انیس سے سب سے زیادہ قابل ذکر بغلی دُم ہے جو عضلہ مدداریہ کبیرہ (pectarolis major) کے بیرونی حاشیہ کے ساتھ ساتھ بغل کی طرف چلی جاتی ہے۔

یہ عضو ۱۲ تا ۲۰ بے قاعدہ لمبائیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ جو افراد کے مجوس ہو جانے کی حالت میں حملہ سے نصف قطروں کی شکل میں باہر کی طرف کو جاتے ہوئے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ ہر ایک ٹھنک کی اپنی اپنی قنات ہوتی ہے جو حملہ کی چوٹی پر الگ الگ کھلتی ہے۔ مگر اس سے پیشتر ہر ایک قنات متسع ہو کر ایک انتفاخ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پستان کی صحیح صحیح نسبیات بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ عمر اور زمانہ رضاعت و حیض کی فعالیت کے لحاظ سے اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ نوجوان بالغ عورت میں اس میں معینی غدہ کے امتیازی خواص موجود ہوتے ہیں اور اسکی برآر قناتوں کا استر عمودی یا کجی سر حملہ کا ہوتا ہے۔ مگر فعالیت کے درمیانی وقتوں میں اور تیس سال کی عمر کے بعد ایسا نمونہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، جس سے ایسے انحطاطی تغیرات ظاہر نہ ہوتے ہیں جو اس عارضہ میں پائے جاتے ہیں جو بالعموم مزمن التهاب پستان (chronic mastitis) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انقطاع الطمث کے بعد اور ساکت حالت میں اس عضو کا زیادہ تر حصہ چربی پر مشتمل ہوتا ہے۔

242 پستان کے نیچے ایک ڈھیلی ڈھالی پس پستانی بافت ہوتی ہے جس سے یہ غدہ صدری غلاف سے ڈھیلے طور پر مربوط ہوتا ہے۔ اس میں بعض اوقات پس پستانی خراج پیدا ہو جاتا ہے جو ایک تکیہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پستان اس پر متکثر رہتا ہے۔

علمہ مردوں اور نوجوان باکرہ عورتوں میں چوتھی بین ضلعی فضا میں ضلعی غضروفی


اتصال سے تقریباً ۱۲ انچ کے فاصلہ پر واقع ہوتا ہے۔ مگر رضاعت کے بعد پستان الٹک جاتی ہے اور پھر علمہ سے بین ضلعی فضاؤں کے لئے بطور رہنما کے کام نہیں لیا جاسکتا۔ علمہ انتصاب پذیر اور عقلی بافت پر مشتمل ہوتا ہے اور تیسرے اور چوتھے شوکی اعصاب کی جلدی شاخوں سے اسے رسد بکثرت پہنچتی ہے۔ اسکے ارد گرد ایک طون بالیزہ ہوتا ہے جس میں جراثیم منکمری (Montgomery's follicles) پائے جاتے ہیں اور یہ دہنی غدہ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں یہ چکنہٹ پیدا کرنے کے اغراض سے تبدیل شدہ صورت میں پائے جاتے ہیں اور دراصل میں یہ کلانی یافتہ ہوتے ہیں۔ بالیزہ کے نیچے لمفی عروق کا ایک گھنا جال ہوتا ہے۔ اس کے قرب وجوار کی جلد طون اور حساس ہوتی ہے اور اس میں درد غیر شفاقت اور تسلمات پیدا ہو جاتے ہیں۔

جن مجاری لمف سے پستان کی مسلیت ہوتی ہے وہ سرطانی پستان کو اصولی

قاعدوں سے دور کرنے کے لئے عملیہ ترتیب دینے میں نہایت عظیم الٰہمیت ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل گروہوں میں مترتب ہیں۔ (۱) گرد لختکی (perilobular) 'سنیوں اور لختکوں کے ارد گرد۔ (۲) گرد قناتی (periductal) 'قنوات لبنیہ (lactiferous ducts) کے ارد گرد۔ (۳) بین لختی (interlobar) جو درون لختی فاصل میں واقع ہوتے ہیں اور (۴) پس پستانی جال کو (۵) سطحی پستانی جال سے جو کیسہ کے مقدم حصہ میں واقع ہوتا ہے ملاتے ہیں۔ اگر سرطان بین لختکی فاصل پر حکم آور ہو تو انہیں انقباض واقع ہو جاتا ہے جو بافتی تعامل اور لیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور انکی جلدی چسپید گیوں کی وجہ سے جلد میں انخفاضات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ عمل گرد قناتی عروق پر حکم آور ہو تو حملہ باز کشیدہ ہو جاتا ہے۔ پستانی لمفی نظام لمفی عروق کے اس زیر جلدی جال سے تعلق رکھتا ہے جس تک سرطان کے پہنچنے سے مرض کی وہ قسم پیدا ہو جاتی ہے جو **صدری سرطان** (cancer en cuirasse) کے نام سے مشہور ہے۔ صدری ردا اور عضلہ کے مجاری لمف کے جو ربط پستان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، انکے ذریعہ سے سرطان پستان ان ساختوں تک جلد پھیل جاتا ہے۔ اور پھر سرطان عمقی محل کی ساختوں کے ساتھ مضبوطی سے مثبت ہو جاتا ہے اکثر عروق لمف پستان سے صدری غدود (pectoral glands) میں جاتے ہیں جنکی مقدار سچے سے آٹھ تک ہوتی ہے اور جو بغل کے مقدم کنارہ کے ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ نیزہ مرکزی بغلی گروہ (central axillary set) میں بھی جاتے ہیں۔ انکی تعداد بارہ سے پندرہ تک ہوتی ہے اور یہ بغل کے بالوں کے گچھے کے نیچے اور بغلی ورید کے اندر کی طرف واقع ہوتے ہیں (شکل ۵۸)۔ عروق لمف ان دو گروہوں سے عمیق بغلی غدود (deep axillary glands) میں جاتے ہیں جو بغلی عروق کے سامنے کی اور اندر کی طرف کے ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ ان غدود کو جو بغلی ورید کے ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں مناسب طریقہ سے دور کرنا ناممکن ہوتا ہے تا وقتیکہ ضلعی خرابی (costo-coracoid) غشا کا تمام خطہ متاثر نہ کر لیا جائے۔ لہذا سرطان پستان کے لئے جو اصولی عملیہ سرانجام دیا جائے اس میں عضلات صدری صغیرہ (pectoral minor muscles) کی برآوردگی ہمیشہ شامل ہونا چاہئے۔ عمیق بغلی عدد کارین عمیق عمقی غدود سے تسلسل قائم ہوتا ہے اور اسی راستہ سے سرطان کا بھجان زیادہ تر

منتشر ہونے کی طرف ہوتا ہے مگر پستان کے اندرونی قطعہ میں سے بھی عروق لمف نکلتے ہیں اور مقدمہ میں منسلکی غد میں جو اوپر کی چار بین فضائی فضاؤں میں واقع ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نیز گاہ بگاہ چند عروق قیفائی غدہ (cephalic gland) تک بھی جاتے ہیں جو عضلہ والیہ (deltoid) اور عضلہ صدریہ کبیرہ (pectoralis major) کے درمیانی فرجہ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

243



شکل ۵۸ - پستان اور بغلی کے لمفی عروق اور غدہ۔

(پوائے ریئر Poirier سے ترمیم کردہ۔)

ہینڈلے (Handley) نے دریافت کیا ہے کہ سرطان پستان میں نیچے کی طرف عروق لمف میں منتشر ہونے اور برعکس مثلث تک پہنچ جانے کا ایک رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ عروق ڈایا فرام کے اوپر اور نیچے کے عروق لمف سے ملنے کے لئے دیوار شکم کو منتقل کرتے ہیں۔ اس کا یہ بیان ہے کہ اسی ربط کی وجہ سے سرطان پستان کے واقعات میں جگر ثانوی مطروحات کا ممل ہوتا ہے۔ جب طبعی مجاری سرطان حلا سے منسود ہو جاتے ہیں تو لمف دور کے راستوں سے جاتا ہے زیر کتفی غدہ (subscapular glands) بھی جو بغل کی موخر دیوار پر زیر کتفی عروق کو گھیرے

244

ہوتے ہیں، بعض اوقات در رنجتہ ہو جاتے ہیں۔ بازو کے عروق لف کے ذریعہ سے جو مرکزی بغلی غدہ میں آکر ختم ہوتے ہیں، کندھے کے ارد گرد کی سختیں بعض اوقات عضیل بازو (brawny arm) یا جلدی کو بیچوں کی شکل میں ثانوی مطروح کا محل بن جاتی ہیں اور ایک پستان کے لمفی نظام کے دوسرے پستان کے لمفی نظام سے قصب پر سے مربوط ہونے کی وجہ سے دوسری طرف کے پستان یا دوسری طرف کی بغل میں ثانوی مطروح پیدا ہو جاتا ہے۔

صدری لمفی ضغیروں کو علیحدہ علیحدہ نظامات تصور نہ کرنا چاہئے۔ زیادہ صحیح خیال یہ ہے کہ تمام دھڑ پر عروق لف کی ایک مشبک صدار یا انکا ایک جال موجود ہوتا ہے۔ دونوں فوق مری حصوں کی سیلیت فروا فروا دائیں اور بائیں بغلوں کی طرف ہوتی ہے اور زیر مری حصوں کی جنگا سوں کی طرف ہوتی ہے مگر اپنے کناروں پر ہر ایک لمفی میدان اپنے قریبی میدانوں سے رابطہ رکھتا ہے۔

245

بین ضلعی زراعتی (intercosto-humeral) عصب بغلی غدہ کے مرکزی گروہ کو متغیب کرتا ہے۔ جب ان غدہ پر سرطان کا حمل ہوتا ہے تو اس عصب کے مضبوط ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے اور اس سے بازو کی موخر جانب پر کہنی کے اوپر درد پیدا ہو جاتا ہے جو اس عصب کے انتہائی سرے سے منسوب ہوتا ہے۔ عضدی ضغیرہ (brachial plexus) کے مختلف حصے بھی بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں یا بغلی ورید یا عروق لف مسدود ہو جاتے ہیں اور بازو نتیجتاً متورم اور متہیج ہو جاتا ہے۔

شریانوں کے مندرجہ ذیل گروہ اس غدہ کو رسد پہنچاتے ہیں اور اس عضو کے

استقریصال کے دوران میں کاٹے جاتے ہیں۔ (۱) جانبی (طویل) صدری، جناحی صدری (alar thoracic)؛ (۲) اکرومی صدری محور (acromio-thoracic axis) کی صدری شاخیں۔ (۳) داخل پستانی شریان کی مقدم شاخیں جو دوسری تیری اور چوتھی بین ضلعی فضاؤں میں نکلتی ہیں۔ (۴) دوسری تیرہ اور چوتھی بین ضلعی شریانوں کی جانبی شاخیں۔

مستزاد حملے اور پستان میں بھی پائی جاتی ہیں اور یہ بالعموم ایک خط میں

بغل اور جنگا سے کے درمیان درمیان ملتی ہیں۔ تمام پستانوں کے مضغی مرحلہ حیات میں اس محل پر

ایک برنارڈی پستانی حید موجود ہوتا ہے۔ آدمی میں یہ سوائے ایک مقام کے غائب ہو جاتا ہے۔ مگر گاہے گاہے کوئی منفرد حصہ برقرار بھی رہ جاتا ہے اور اس سے آئندہ جیکر پستان بن جاتی ہے۔ علم جنینیات پستان کے سرین یا کمر پر واقع ہونے کی جہاں یہ کبھی کبھی پائی جاتی ہے توجہ دیکر اس سے قاصر ہے۔

صدری احشاء

(THE THORACIC VISCERA)


پھیپھڑیاں - پھیپھڑے کا راس گردن میں ترقوہ کے اندرونی نصف سے ایک انچ سے لیکر دو انچ اوپر تک پہنچا ہوتا ہے۔ بالغوں کی اکثریت میں اسکا بلند ترین حصہ ترقوہ کے قصبی سر سے ۱ انچ اوپر اور قصبی حلی (sterno-mastoid) عضلہ کے قصبی اور ترقوی سروں کے درمیانی وقفہ میں واقع ہوتا ہے (شکل ۵۹)۔ دونوں پھیپھڑوں کے اگلے کنارے قصبی ترقوی مناشل کے پیچھے سے گذر کر وسطی خط میں قصبی مفصل غضروفی (sternal synchondrosis) پر مل جاتے ہیں۔ یہاں سے دائیں پھیپھڑے کی کور قفس کے خط وسطی کے پیچھے چھپے عودانیچے کی طرف کو چھٹے غضروفی قصبی مفصل تک چلی جاتی ہے جہاں سے یہ چھٹے غضروف کے خط کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف اتر جاتی ہے۔ بائیں پھیپھڑے کی کور دائیں کی کور کے چوتھے غضروفی قصبی مفصل تک قریب رہتی ہے اور یہاں سے یہ اس خط کے ساتھ ساتھ چوتھے غضروف سے راس قلب کے نزدیک تک گھٹنچا گی ہو بائیں طرف کو چلی جاتی ہے (شکل ۵۹)۔ گاہے گاہے یہ منفرد نہیں بھی ہوتی اور گرد قلب کو قفس کی کور تک پوشیدہ کئے ہوتی ہے۔

246

بچہ میں تیموسید (thymus) کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سامنے کی طرف زیادہ فاصلہ پایا جاتا ہے۔ دایاں پھیپھڑا خط وسطی تک پہنچتا ہے مگر بائیں قفس کی صرف بائیں کور تک ہی آتا ہے (سمنگٹن: Symington) پھیپھڑے کے پیرین کنارہ کو نظر کرنے کا آسان ترین اور سب سے زیادہ صحیح طریقہ مندرجہ ذیل ہے (شکل ۵۹)۔ چھٹے قصبی غضروف کے ساتھ ساتھ

اس کے قصبی سرے سے لیکر پیچھے کے سرے تک ایک خط کھینچ دیا جاتا ہے اور پیچھے کے سرے سے یہ خط جسم کے گرد افقی رخ میں آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہو جائیگا کہ یہ خط پیچھے کی طرف وسطی خط کو گیارہویں نہری شوکہ (ضد میلانی شوکہ: anticlinal spine) پر یا اس کے نزدیک ہی کاٹتا ہے۔

پلورا کا تناظر کن رہ پھیپھڑے کے زیرین کن رہ کا متوازی نہیں ہوتا۔ یہ اس خط سے



شکل ۵۹ پھیپھڑوں اور پلورا کی سطحی نشان نگاری کو ظاہر کرتی ہے۔

247

ظاہر کیا جاتا ہے جو ساتویں قصبی غصروف کے قصبی سرے سے لیکر اسکے پیچھے کے سرے تک کھینچا جائے اور یہاں سے یہ زیر قصبی حاشیہ کے زیر ترین حصہ سے ۲ انچ اوپر تک بڑھا دیا جائے اور پھر پیچھے کی طرف وسطی خط تک کھینچ دیا جائے جسے یہ بارہویں نہری شوکہ پر یا اس کے قریب ہی کاٹتا ہے۔ اوپر کی طرف رٹوی خط اور نیچے کی طرف پلورائی خط کے درمیان ڈایا فرام چھاتی کی دیوار سے مس کرتا ہے اور ان کے درمیان صرف پلورا کا قصبی ڈایا فرامی (costo-phrenic) انعکاس ہی حاصل ہوتا ہے۔ بائیں جانب پر یہ خطوط قص سے مختلف فاصلوں پر شروع ہوتے ہیں — ۱ انچ کی رعایت پلورا کے لئے اور ۲ ۱/۲ انچ کی پھیپھڑے کے لئے دینا چاہئے (شکل ۵۹)۔ پلورا بارہویں

پسلی سے علاوہ رکھتا ہے۔ مگر گاہے گاہے یہ اس پسلی کی گردن کے نیچے پل ایچ یا اس سے زائد فاصلہ تک چلا جاتا ہے اور گردہ کے عملیہ جات میں اسکے زخمی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بچہ میں بالغ کی نسبت یہ اور نیچے تک چلا جاتا ہے۔ بایاں پھیپھڑا دائیں کی نسبت زیادہ لمبا زیادہ تنگ اور زیادہ ہلکا ہوتا ہے اور اس سے ذرا پچھلے لیول تک پہنچتا ہے۔

جو ناقب جسم پلورا پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں ہوا

پلورائی کہف میں داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے جس سے استرواح الصدر (pneumothorax) پیدا ہو جاتا ہے اور بعد ازاں یہ ہوا تنفسی حرکات سے دب کر جداری پلورا کے زخم کے راستے سے بعض اوقات زیر جلدی بافتوں میں چلی جاتی ہے اور اس سے جراحی نقاخم (surgical emphysema) پیدا ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑے کے ضررات میں جبکہ خارجی زخم پیدا نہ ہوا ہو، مثلاً جب یہ عضو کمزور پسلی سے دریدہ ہو جاتا ہے، ہوا پھیپھڑے سے نکل کر پلورائیں اور یہاں سے پلورائی زخم میں سے زیر جلدی بافتوں میں چلی جاتی ہے اور اس طرح استرواح الصدر (pneumothorax) اور نقاخم (emphysema) دونوں پیدا ہو جاتے ہیں۔

زمانہ جدید کی تیز رفتار گولیاں روئی بافتوں کو زیادہ نقصان پہنچانے یا پلورائی نقصان زیادہ زخم (دمی الصدر: haemothorax) پیدا کرنے کے بغیر پھیپھڑوں میں سوز رجاتی ہیں اور اس نتیجہ کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پھیپھڑوں میں ہوا موجود ہوتی ہے جو دب سکتی ہے اور یہ ایک لچکدار دیواروں والے کہف میں واقع ہوتے ہیں۔ اگر یہی گولی کسی ہڈی کے بتی کہف یا کمپری میں داخل ہو تو دھماکے کا اثر پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ ہڈی کا گودا یا بھیجا پچک نہیں سکتا اور ایک بند خانہ میں محسوس ہوتا ہے۔

یہ معلوم کرنا بھی مناسب ہو گا کہ نقاخم (emphysema) صدر کے بعض غیر ناقب زخموں کے آس پاس بھی پیدا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مصراعی قسم کے ہوں۔ ایسی حالتوں میں ہوا تنفسی حرکت کے دوران میں زیر جلدی بافتوں میں کھنچ جاتی ہے اور دوسری حرکت سے دب کر خلوی بافت میں چلی جاتی ہے اور زخم کی مصراعی ماہیت اسکو باہر نکلنے سے روک دیتی ہے۔ شدید عضلی جہد کے دوران میں مثلاً بچہ پیدا ہوتے وقت پھیپھڑے کے کسی ہوائی کیمیک کے پھٹ جانے سے صدر اور گردن کا وسیع نقاخم (emphysema) پیدا ہو جاتا ہے۔ جب پلورائی کہف

کہوا جاتا ہے، تو پھیپھڑوں میں کچھ لچکدار بافت کے موجود ہونے کی وجہ سے قدرے ہبوط واقع ہو جاتا ہے، مگر جس حد تک یہ واقع ہوتا ہے اس کے متعلق بہت سی غلط فہمی پائی جاتی ہے پھیپھڑے کی ہوا میں سے نصف یا دو تہائی حصہ جیسا کہ بعض حالتوں میں پایا جاتا ہے نقلی ہوتا ہے، اور یہ پھیپھڑے کے متغلی ہبوط سے خارج نہیں ہو سکتا۔ جب دیوارِ شکم کے عضلات کی زہری مساعی سے ڈایا فرام اوپر کی طرف کو اٹھاتا ہے اور پسلیاں نیچے کی طرف کو کھینچ جاتی ہیں تو صدری فضاؤں کی جسامت بعض اوقات اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ پھیپھڑے اس میں باسانی سما نہیں سکتے اور اگر مزمار بند ہو تو چھاتی کے زخم میں سے پھیپھڑے کا نشت واقع ہو جاتا ہے لیکن اگر پلورائی کھنڈ میں کوئی مصراعی سوراخ موجود ہو جس سے ہوا اندر چوسی جا سکتی ہو مگر باہر نہ نکل سکتی ہو تو ہر ایک نفسی حرکت سے پلورائی فضا میں ہوا کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد ضغطۃ الریہ اور انقباض (suffocation) جلد واقع ہو جاتا ہے۔ اگر تند رست پلورائی کھنڈ میں ہوا یا سیال داخل کر دیا جائے تو وہ جلد جذب ہو جاتا ہے۔ پلور پلورائی انصباب یا خون کی نسبت ہوا کو بہت جلد جذب کر لیتا ہے۔ اسی لئے خون یا سیال کے نکالتے وقت اس کی جگہ مصفی ہوا کا مساوی حجم داخل کرنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ جوں جوں ہوا جذب ہوتی جاتی ہے پھیپھڑے اس خلا کو پُر کرنے کے لئے جو اس طرح پیدا ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے۔ میکینٹون (Macewen) کی یہ رائے ہے کہ وہ کشش شمری جو پلورائی حشوی اور جداری تھوں کے درمیان موجود ہوتی ہے پھیپھڑے میں ہبوط واقع نہیں ہونے دیتی۔

249

پھیپھڑے کے زخموں میں خون تین سمتوں میں بہ سکتا ہے:- اس عضو کی بافتوں میں (رئوی سکند: pulmonary apoplexy)، شعبتوں میں (جس سے نفث الدم پیدا ہو جاتا ہے) اور پلورامیں (جس سے دم الصدر: hæmothorax پیدا ہو جاتا ہے)۔ کچھ مثالوں میں پھیپھڑے زخم اور پسلی کے کسر کے موجود ہونے کے بغیر بھی نشق ہو چکا ہے۔

چونکہ اسکے عروق شعریہ باریک ہوتے ہیں و نیز تمام ویدی خون کو جو قلب میں واپس آتا ہے قبل اسکے کہ یہ جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچ سکے پہلے پھیپھڑوں میں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس لئے یہ ظاہر ہے کہ قتیق الدمی (pyæmic) اور دیگر ثانوی مطروحات دوسرے اعضاء کی نسبت پھیپھڑے میں زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

پھیپھڑوں میں جو کھنڈ تدرن یا لکڑن یا تمداد (bronchiectasis)

سے پیدا ہو گئے ہوں انہیں ششخاف دینے اور انکی مسیلت کا انتظام کرنے میں کامیابی ہوئی ہے اور یہی ترکیب پھیپھڑے کے کیسیستی دویروں (hydatid cysts) میں بھی استعمال کی جا چکی ہے۔ پھیپھڑے کے گہرے ششخافوں سے جو زنف واقع ہوتا ہے وہ اس زنف سے جسکی اس قسم کے کثیر العروق عضو سے توقع کیجا سکتی ہے کم ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے تدرن میں پلورائی انفما جلد ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس طرح پھیپھڑا چھاتی کی دیوار سے مضبوطی سے چپک جاتا ہے۔ پھیپھڑے کے جس حصہ میں بڑا سا کہف ہو اس میں بہوٹ پیدا کرنے کے لئے جس سے کہف مسدود ہو کر مندمل ہو سکے یہ مشق شروع کیگئی ہے کہ انفمات کو یا تو عملیاتی زخم میں سے یا چھاتی کی دیوار میں سے چاقو یا کواکٹر کر کوٹر دیا جائے۔ اس اثنا میں اندر کا منظر دیکھنے کے لئے پلورائی کہف میں کسی دوسری بین ضلعی فضا میں سے دروں بین (endoscope) داخل کر لی جاتی ہے

پلوراکی عصبی رسد۔ پلوراکے حاد التهاب میں درد بعض اوقات بہت

شدید ہوتا ہے اور ماؤف طرف کے تنفسی حرکات میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر درد صدکہ زیرین حصہ میں ہو تو درد بید شکم میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ ان امور کی توضیح پلوراکی عصبی رسد ہی سے ہو سکتی ہے۔ ضلعی پلوراکی رسد ہم پلوئین ضلعی اعصاب سے آتی ہے جو متناظر بین ضلعی عضلات کو بھی رسد پہنچاتے ہیں۔ جب پلوراکے ماتحت حصے ملتهب ہو جاتے ہیں تو ان عضلات میں امتناع واقع ہو جاتا ہے۔ نیچے کی چھ ٹھری اعصاب دیوار شکم کو بھی رسد پہنچاتے ہیں۔ لہذا جو درد ضلعی پلوراکی میں اٹھتا ہے اسکو مریض شکم سے بھی منسوب کر سکتا ہے اور اسلئے غلطی سے بالخصوص بچوں میں حاد مرض شکم تشخیص کر دیا جاتا ہے۔ ڈایا فرامی اور منصفی پلوراکو ڈایا فرامی اعصاب سے رسد پہنچتی ہے اور ان حصوں میں جو درد پیدا ہوتا ہے وہ گردن یا کندھے سے منسوب ہو سکتا ہے۔ عقیقی پلوراکو بھی ڈایا فرامی عصب ہی سے رسد پہنچتی ہے (ایچ۔ ایم جاسٹن

-(H. M. Johnston:

قصہ سامنے کی طرف قفسی مفصل غضروفی (sternal synchondrosis)

کے انفصال کے مقابل اور پیچھے کی طرف چوتھے ٹھری فقرہ کے مقابل تقسیم ہوتی ہے۔ دونوں شعبتوں کے درمیانی زاویہ میں لمبی غد کے سلسلے موجود ہوتے ہیں اور یہ شعبتوں کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کی جڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ غد پھیپھڑوں کے التهابی عوارض میں کلانی فیتہ

ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے اوپر کے پانچویں ٹھری فقرات کی دونوں طرف صدر کی ششائی نگارش میں عمتات (opacities) پیدا ہو جاتے ہیں اور قرمہ پر نقل ظاہر ہوتا ہے (کلائیو ریویر - (Clive Riviere:-

قصبہ اور شعبتوں کے اندر کے اجسام غریبہ کی اب شعبہ بین (bronchoscope) سے تعین مقام کیا جاسکتی ہے اور یہ اسکے ذریعہ سے نکالے جاسکتے ہیں۔ جہاں قصبہ دوشاخوں میں تقسیم ہوتی ہے وہاں کی غشائے مخاطی بہت ہی حساس ہوتی ہے۔ اور ثانوی شعبتی نالیوں کے دہنہ جات اس دائری عضلی نظام کے اثر سے جوان نالیوں کی دیواروں میں موجود ہوتا ہے منقبض اور متنع ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔


پیمپچر سے کی جڑ اور شعبتوں کو صدر کی ٹھری دیوار کو کتف کے فقری کنارہ کے پیچھے کھولنے کے لئے کھنکھنایا جاسکتا ہے۔ رسل (Russell) اور فاکس (Fox) نے ایک لڑکے کا واقعہ درج کیا ہے جس میں ایک ۳ انچ لمبا پن سر کے بل قصبہ میں اتر گیا تھا اور انجام کار بائیں شعبہ کی یوین شلخ میں اٹک گیا تھا۔ انھوں نے پچھلی طرف سے آٹھویں سلی کا اتصال جزوی کیا اور پیمپچر کو آگے کی طرف کو تشکیل کرتا کہ شعبہ جڑ پر مسوا ہو جائے پن نکال لیا۔ پیمپچر سے کی جڑ کو جگہ پر قائم رکھنا ضروری ہے۔ گردِ قلبہ کے ذریعہ سے یہ ڈایا فرام کے ساتھ بندھی ہوتی ہے اور اس عضلہ کے حرکات کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ میں لڑکا علیہ کے بارہ دن بعد شفا خانہ چھوڑنے کے قابل ہو گیا تھا۔

251

قلب اور گردِ قلبہ۔ گردِ قلبہ کا محل اور اسکی وسعت صدر کی سطح پر مندرجہ ذیل

طریقہ سے ظاہر کیا جاسکتی ہے (شکل ۶۰)۔ تین نقطے مقرر کر لئے جاتے ہیں۔ (۱) لڑاسی (apical)۔ ضرب راس پر پانچویں بائیں بین ضلعی فضا میں قص سے ۳ ۱/۲ انچ کے فاصلہ پر۔ (۲) قصی یدی (sterno-manubrial)۔ دوسرے ضلعی غصہ و فوں کے فہتاؤں کے درمیان وسط پر۔ (۳) تحتانی اجوفی (inferior caval)۔ قصی سیفی (sterno-ensiform) (قصی خجری (sterno-xiphoid) نقطہ سے ایک انچ دائیں طرف اور تحتانی وریدا اجوف (inferior vena cava) کے اختتام کے عین اوپر۔ جب ان نقاط کو منحنی خطوط سے ملا دیا جاتا ہے جیسا کہ شکل ۶۰ میں دکھایا گیا ہے تو گردِ قلبہ اور اسکے مشمولات کے اوپر کے رقبہ کی فضا ندھی

ہو جاتی ہے۔ نیچے کا خط قصی خمیجی نقطہ کے نیچے سے پا ایچ یا اس سے زائد فاصلہ پر گزرتا ہے۔ اگر ایک بمزل (trocar) زائدہ خمیجیہ اور ساتویں بائیں ضلعی غضروف کے درمیان کے زاویہ میں پیچھے کی طرف کو جھونک دیا جائے تو یہ ڈایا فرام کے عین اوپر گرد قلبہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس زاویہ میں سے گرد قلبہ کی مسیلت بھی کیجا سکتی ہے اور پانچویں اور چھٹے غضروفوں کے کچھ حصہ کا



شکل ۶۰۔ گرد قلبہ اور قلب کا تعلق قص اور سپلیوں کے ساتھ۔

252 جزئی اتصال کرنے سے اس کے کہنہ کا استقصا کیا جاسکتا ہے۔ گرد قلبہ کا دایاں کنارہ گہرا واقع ہوتا ہے اور دائیں پھیپھڑے سے پوشیدہ ہوتا ہے (شکل ۶۰)۔ تندرستی کی حالت میں اس کو قص کے دائیں کنارہ سے ایک انچ سے زیادہ نہ بٹھکانا چاہئے۔

اذینوں اور بلیونوں کے علاوہ گرد قلبہ میں مندرجہ ذیل حصے شامل ہوتے ہیں۔ تحتانی اور فوقانی اجوف وریدوں کے اختتام، اور طہ صعودی اور رئوی شریان۔ ان حصوں اور اور طہ کی محراب اور اسکی شاخوں کا محل شکل ۶۰ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ قلب کی

مقدمہ سطح کا دو تہائی سے زائد حصہ دائیں بطن اور اذین سے بنتا ہے۔ لہذا قلب کی ہولوں میں یہی حصہ بالعموم منقبت ہو جاتے ہیں۔

عملیتی علاج کے لئے قلب کو چوتھے اور پانچویں بائیں منسلکی غصروں کے سروں کو ایک انچ یا اس سے زائد کاٹ دینے میں شکف کیا جاسکتا ہے۔ اس حشا کو آزادی سے پکڑا جاسکتا ہے اور اس میں ٹانگے لگائے جاسکتے ہیں۔ جراح کا کام اسکے سریع حرکات اور گرد قلب اور ڈایا فرام کے تنفس سے ہلنے کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب قلب میں زخم آجاتا ہے تو خون گرد قلب میں بہ آتا ہے جس سے اذین مضبوط ہو جاتے ہیں اور خون کا داخلی بہاؤ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح گرد قلب کے استسقاء سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر دوسری حالتیں مساوی ہوں تو بطن کا زخم اسکی دیواروں کی دبازت کے اور اسکی استعداد انقباض اور جریان خون کو بند کر دینے کی قابلیت کے موجود ہونے کے باعث اتنا جلد مہلک ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ اذین کا زخم ثابت ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لئے ایسی بہت سی مثالوں کا اندراج کیا گیا ہے کہ قلب بعض اوقات اپنے جسم میں اجسام غریبہ کو ایک بڑی حد تک برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جس کے قلب میں سے ایک سیخ ایک جانب سے دوسری جانب تک گزری ہوئی تھی بیس دن تک زندہ رہا (Ferus)۔ ایک اور واقعہ میں ایک دیوانہ نے لوہے کی ایک ۶ انچ سے زیادہ لمبی سلاخ اپنی چھاتی میں یہاں تک بھونک لی کہ وہ نظر سے غائب ہو گئی، مگر وہ جلد کے نیچے قلب سے نبضان وصول کرتی ہوئی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اسکی موت اس سے ایک سال بعد واقع ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ وصات کا ٹکڑا نہ صرف پھیپھڑوں ہی میں سے گزرا تھا بلکہ بطنی کہنہ بجا میں سے بھی گزر گیا تھا (Tillaux: ٹلو)۔ مزید برآں قلب ان اجسام غریبہ کا متحمل بھی ہوتا ہے جو اسکے گوشوں میں پڑے ہوئے ہوں۔ جنگ عظیم کے دوران میں سپاہیوں کی ایک معتدبتعداد میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دائیں بطن میں گولی یا کوئی ٹکڑا آزاد پڑا ہے مگر اسکے باوجود دیوار قلب میں کوئی زخم کسی جگہ بھی موجود نہیں ایسی حالتوں میں گولی بڑی بڑی وریدوں میں سے کسی ایک میں داخل ہو جاتی ہے اور وریدی خون کے ساتھ ہی دائیں گوشوں میں بہ کر آ جاتی ہے۔ جسم غریبہ روئی شریان میں کسی واقعہ میں نہیں گیا۔ قلب کے زخموں میں ٹانگے لگائے جاسکتے ہیں اور ٹانگا لگانے سے اس کے فصل میں صرف وقتی اختلال ہی واقع ہوا ہے۔ ٹریوٹرس (Travers) نے دائیں بطن کے ایک زخم کو ٹانگے لگائے ہیں جس میں انداز نصف کے لئے وہ میں انگلیاں ڈال سکتا تھا۔

جہاں تک چھاتی کے زخموں کا تعلق ہے، وِلپو (Velpeau) نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے جسکے صدر میں ایک پتہ پایا گیا تھا جس سے چھاتی کی پسلیوں سے لیکر عمود فقری تک عبوری تثبیت ہو گئی تھی۔ اور یہ موت سے پندرہ سال پہلے داخل ہوا تھا۔ رائل کالج آف سرجنز (Royal College of Surgeons) کے عجائب خانہ میں گاڑی کی ایک بم موجود ہے جو بائیں جانب کی پسلیوں میں گھس کر تمام چھاتی میں سے گزر گئی تھی اور دائیں جانب کی پسلیوں میں سے باہر نکل آئی تھی یہ مریض دس سال تک زندہ رہا تھا۔

گرد قلبہ کا بزل۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے گرد قلبہ کا بزل یا اسکی مسیلت

بائیں منلعی سیغی (costo-ensiform) زاویہ میں سے کیجا سکتی ہے (صفحہ 252) (شکل ۶۰)۔ جس حد تک یہ بائیں پلورا اور پھیپھڑے سے پوشیدہ ہوتا ہے وہ نہایت ہی تغیر پذیر ہے۔ اکثر حالتوں میں اسکا بزل چوتھی اور پانچویں بائیں فضاؤں میں قفس سے ایک انچ کے فاصلہ پلورا کو ضرر پہنچائے بغیر کیا جاسکتا ہے۔ داخلی پستانی (internal mammary) شریان ان فضاؤں میں قفس سے ۱/۲ انچ کے فاصلہ پر پہنچنے کی طرف کو آتی ہے اور ساتویں غضروف کے پیچھے فوقانی برمعدی (superior epigastric) اور عضل ڈایا فسرانی (musculo-phrenic) شریانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔


مناسف (mediastina)۔ مقدم منصف میں خراج یا نو علی محلہ پیدا

ہو جاتا ہے یا گردن سے پھیل کر یہاں تک آ جاتا ہے۔ علیٰ ہذا موخر منصف کے خراجات یا تو ہم پیل عمود فقری کے امراض سے یا ہم پیلو لنفی غد کے امراض سے پیدا ہوتے ہیں، اور یا مادہ کے کسی پس بلعومی یا پس ملوئی اجتماع کے نیچے کی طرف پھیلنے سے ظہور میں آتے ہیں۔ درون صدری مرض کی تشخیص کے لئے رونتجن (Röntgen) کی شعاعوں کا استعمال

کرنے سے تنفسی حرکات اور صدری احتیاج کے تعلقات کے سلسلہ میں

ہمارے علم میں بہت سی توسیع ہو گئی ہے۔ شکل ۶۱ میں (جو ڈاکٹر ہالز ڈیلی (Dr. Halls) Dally کی احتیاط سے کنجی ہوئی ایک تصویر سے لی گئی ہے، ان زیادہ اہم حصوں کا خاکہ

کینیا لگا ہے جو چھاتی کا اس محور میں امتحان کرنے سے دکھائی دیتے ہیں جو مریض کے دائیں حملہ اور بائیں کتف میں سے گزرتا ہے۔ قلب اور جگر دوران شہیق میں پیچھے اور آگے کی طرف کو اور دوران زفیر میں اوپر اور پیچھے کی طرف کو سایہ کی طرح حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ڈایا فرام نیچے کی طرف کو چلا جاتا ہے اور قلب عمود فقری سے دور ہو جاتا ہے تو مؤخر منصف جس میں اور ملہ اور مری ہوتے ہیں آپار مشع مثلث کی شکل کا دکھائی دیتا ہے۔ دوران شہیق میں



شکل ۶۱۔ صدر کی صحیح دروں نگار کش۔

(ڈاکٹر ہالس: Dr. Halls Dally کے مطابق۔)

حصوں کی وضع انتہائی شہیق کی حالت میں ظاہر کی گئی ہے اور ڈایا فرام اور جگر کی جو وضع زفیر کے دوران میں ہوتی ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے۔

بیمیں پٹے بھی صاف نظر آتے ہیں اور زیادہ شفاف ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں مقدم منصف بھی ایک صاف فضا کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ فوقانی منصف میں اور ملہ کی محراب (manubrium) سے لیکر پیچھے کی طرف کو چوتھے ٹھہری فقرہ تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جس شخص سے یہ شکل بنائی گئی تھی اس میں ڈایا فرام کی انتصابی حرکت ۳ انچ تک تھی۔ طبعی شہیق میں انتصابی حرکت ۱/۲ سے لیکر ۳/۴ انچ تک ہوتی ہے اور یہ حرکت ایک سپلی کی چوڑائی کے برابر ہوتی ہے۔

جسر دوریدیں (azygos veins) جو دراصل نیچے کی طرف سے

قطنی وریدوں سے شروع ہوتی ہیں اور مشترک حرقنی (common iliac) ہیکلوی (renal) اور ورید اجوف (vena cava) کی دیگر معاون وریدوں سے کم و بیش بلا واسطہ ربط و راہ رکھتی ہیں، فوقانی ورید اجوف (superior vena cava) کے انتہائی حصہ کے اندر کی حالتوں میں وریدی روران خون کو ایک بڑی حد تک قائم رکھ سکتی ہیں۔ ایسا کرنے میں ان کو داخلہ پستانی شریان کی رفیق وریدوں اور بر معدی (epigastric) وریدوں سے مدد ملتی ہے۔ مزید برآں بین فکری وریدیں بھی بہت کلانی یافتہ ہو جاتی ہیں اور فوقانی اور تحتانی اجوف نظاموں کے درمیان یہ نفیسی مجاری کا کام دیتی ہیں۔

ایسے سلطات (مثلاً کلانی یافتہ غدی تودے) سے جو موخر منصف میں پیدا ہوتے ہیں ان وریدوں کے دب جانے کا احتمال ہوتا ہے اور اس لئے ان بین ضلعی وریدوں کے احتقان سے جو انیس آکر شامل ہوتی ہیں چھاتی میں کس قدر تہیج پیدا ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ موخر منصف میں جو سلطات پیدا ہوتے ہیں ان سے قصبہ یا عذرا کی مانی پر دباؤ پڑنے یا عصب تانیس (vagus) یا حمل مشار کی میں خلل آنے سے تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ قصبہ اور شجبتوں اور مری کے ارد گرد جو کثیر التعداد لمفی غدود موجود ہوتے ہیں وہ اکثر تدرن کا محل بن جاتے ہیں۔ یہ ان اعضا کے ساتھ منضم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات انیس گس کر منقح ہو جاتے ہیں۔

اس مہم پر عارضہ میں جو حالت لمفیہ (status lymphaticus) کے نام سے موسوم ہے غده تیموسیہ بالعموم بہت کلانی یافتہ پایا جاتا ہے۔ یہ مقدم منصف میں واقع ہوتا ہے اور گرد قلب کے بالائی حصہ اور قلب کے بڑے بڑے عروق کے سامنے اور قص کے اس حصہ اور ان غضروفوں کے پیچھے جو پسلیوں کے تیسرے جوڑے کے اوپر واقع ہوتے ہیں متکثر ہوتا ہے۔ اسکے اطراف منصفی پلور کے انکسارات سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ کلانی یافتہ ہونے کی حالت میں یہ بڑے بڑے عروق اور قصبہ اور شجبتوں پر دباؤ ڈالتا ہے جس سے کس قدر اندر پیدا ہو جاتا ہے گریہ انداد اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اس سے فوری موت کی جو حالت لمفیہ (status lymphaticus) میں واقع ہوتی ہے توجہ ہو جائے۔ غده تیموسیہ لف آسرافت سے مرکب ہوتا ہے اور تقریباً اٹھارویں سال میں اپنی اعظم جسامت (۳۶ گرام = ۱/۲ اونس) کو پہنچتا ہے۔ اسکے بعد اسکی جسامت میں بتدریج تخفیف ہو جاتی ہے۔ مردوں میں عورتوں کی نسبت یہ تخفیف زیادہ ہوتی ہے۔ بچہ میں بوقت پیدائش اسکا وزن ۱۲ گرام ہونا چاہئے۔

اسکی ثمریائیں اور وریڈیں جو داخلی پستان (internal mammary) تختانی در (inferior thyroid) اور لائمی (innominate) عروق سے نکلتی ہیں صغیر الجسامت ہوتی ہیں۔ یہ غدہ ڈھیلی ڈھالی اتصالی بانٹ سے ارد گرد کی ساختوں سے چسپدہ ہوتا ہے۔ تر قوہوں کے سروں کے درمیان شگاف دیکر اس سے اسکو جزوی بلکہ کلی طور پر بھی علیحدہ کرنا ممکن العمل ہے۔ اس کے افعال مبہم ہیں مگر ہڈی کے نمو اور اسکی بالیدگی پر یہ بلا واسطہ اثر رکھتا ہے۔ نمو کے لئے دیکھو شکل ۵۶ صفحہ 281۔

صدری قنات (thoracic duct) کرابل (Krabbel) نے ایک اقدہ

کی اطلاع دی ہے جس میں نویں ٹھہری فقرہ کے کسر کے ساتھ صدری قنات میں بھی الشقاق واقع ہو گیا تھا۔ یہ مریض چند دنوں کے بعد مر گیا اور دائیں پلور میں ایک گیلن سے زیادہ خالص کیلوس پایا گیا۔ بالائی قطنی اور زیرین ٹھہری فقرات کے اجسام اکثر تدرن کا محل ہوتے ہیں اور اسطرح پیچیدگیوں کے راسی حصہ بھی۔ وڈجونس (Wood Jones) نے ان حصوں اور صدری قنات کے قریبی قنات کی طرف اور اس قنات کے ذریعہ سے غذا کی نالی سے تدرنی حلو کے ان مقامات منتخبہ تک پہنچ جانے کے امکان کی طرف توجہ دلائی ہے۔

257

خزانہ کیلوس (receptaculum chyli) پہلے اور دوسرے قطنی فقرات کے اجسام پر بنتا ہے۔ اور یہ قنات اس سے شروع ہو کر اوپر کی طرف زیرین ٹھہری فقرات کے سامنے سے موخر منصف میں چلی آتی ہے۔ اور گردن کی بائیں جانب پر داخلی و دہی (internal jugular) اور زیر قوی (subclavian) وریڈوں کے مقام اتصال میں داخل ہو کر ختم ہو جاتی ہے اختتام کے قریب یہ اکثر ڈلٹا (delta) کی شکل میں شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں جو تعداد میں پانچ تک ہوتی ہیں۔ التهاب باریطون کے علاج میں سموم کو منقطع کرنے کے لئے اس مقام پر صدری قنات کی مسیلیت کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ مگر ابھی تک اس طریقہ کے کارگر ثابت ہونے کے دعویٰ کی نہ تو سریری بنا پر تصدیق کی گئی ہے اور نہ نظری بنا پر۔

معدہ کے سرطان کی حالتوں میں صدری قنات کے اختتام کے ارد گرد کے لمفی غدد بعض اوقات مرض کے ابتدائی مدارج میں ہی ثانوی بالیدوں سے کلانی یافتہ ہو جاتے ہیں۔ ثانوی انتشار صدری قنات کے ذریعہ سے واقع ہوتا ہے۔

حصہ سوم جارجہ اعلیٰ باب یازدہم کندھے کا خطہ

کندھے کے خطہ کی بحث ترقوہ، کتف، ذراعیہ کے بالائی حصہ اور ان نرم حصوں پر مشتمل ہے جو انکے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، نیز کندھے کا جوڑ اور بغل بھی اس میں شامل ہیں۔

سطحی تشریح۔ ترقوہ، اکرومی زائڈ اور کتفی ثنوکہ سب کے سب زیر جلدی

ہوتے ہیں اور انکو آسانی سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں جب کہ بازو طرف جسم کے ساتھ لٹک رہا ہو ترقوہ عموماً عین افقی نہیں ہوتا۔ بخوبی نویمانہ افراد میں باہر کے سب پر یہ ذرا اوپر کی طرف کو مائل ہوتا ہے۔ عورتوں اور کمزور اشخاص میں اور ان مردوں میں جنکے شانے فراخ نہ ہوں ترقوہ بعض اوقات یا تو افقی ہوتا ہے یا اس کا بیرونی سرانچے کی طرف کو مائل ہوتا ہے۔ لیٹنے کی حالت میں چونکہ جارجہ کا وزن دور ہو جاتا ہے

اس لئے اسکا بیرونی سراقصی سرے کی نسبت اور بھی اونچا ہو جاتا ہے۔

ترقوہ کا دالی درنہ (deltoid tubercle) اگر کھلا ہو تو جلد میں سے محسوس کیا جاسکتا ہے اور غلطی سے نیچ العظم (exostosis) تصور کر لیا جاتا ہے۔ اگر وہی ترقوی مفصل ایک انتصابی خط کے مستوی میں واقع ہوتا ہے جو بازو کی سامنے کی جانب کے وسط میں سے اوپر کی طرف کو گزرتا ہے۔ اس جوڑ پر بعض اوقات اس مقام پر جو سطح ہونا چاہئے ایک فراز محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ فراز یا تو ترقوہ کے سرے کی کلائی سے پیدا ہوتا ہے اور یا اُس یعنی غضروف کے موٹا ہو جانے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے جو بعض اوقات اس جوڑ میں پائی جاتی ہے۔ بہت سی حالتوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رابطات کے کھینچ جانے کی وجہ سے ترقوہ کے اوپر کی طرف کو ذرا سا مقلوع ہو جانے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ امر یقینی ہے کہ خشک ہڈی میں ایسی کلائی شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہے جس سے اس فراز کے اکرومی مفصل پر پائے جانے کی وجہ ظاہر ہوتی ہو۔ مزید برآں ان افراد میں جنہیں عضلات بخوبی نمو یافتہ ہوں ترقوہ کا قصبی حصہ اکثر عظیم الجسامت اور ضرورت زیادہ ابھرا ہوتا ہے اور اسقدر نمایاں ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی یا مفصل میں کوئی ضرر موجود ہے درآنحالیکہ ضرر موجود نہیں ہوتا۔

259

کندھے کے اوپر کے حصہ کی گولائی اور اسکے ابھار کا انحصار عضلہ دالبہ (deltoid) کے نمو اور ذراعیہ کے بالائی سرے کے محل وقوع پر منحصر ہوتا ہے۔ عضلہ دالبہ کتنی نطاق (shoulder girdle) سے پردہ کی طرح لٹکتا ہے اور جس ہڈی کو یہ ڈھکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ باہر کی طرف کو ابھرا ہوتا ہے۔ لہذا اگر ذراعیہ (humerus) کے سر کی جمات کم ہو جائے جیسا کہ بعض منقرض کسور میں جو نشتر کچی گردن کے نزدیک واقع ہوں ہوتا ہے تو عضلہ دالبہ کم و بیش چپٹا ہو جاتا ہے اور اکرومی مقابلتہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ ذراعیہ کا جو حصہ عضلہ دالبہ کے نیچے محسوس کیا جاتا ہے وہ اسکا سر نہیں ہے بلکہ وہ اسکے حدیب جات ہیں جنہیں سے حدیبہ عظیم باہر کی طرف اور حدیبہ صغیر سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ کندھے کا اسی قسم کا چپٹا پن عضلہ دالبہ کے ذبول سے بھی پیدا ہو سکتا ہے جیسا کہ کندھے کے جوڑ کے مزمن التهاب مفصل اور بعض عضلی اسوائٹوز (muscular dystrophies) اور ارب کے پیدائشی شلل (Erb's birth palsy) میں اور گاہے گاہے التهاب رماذ الخاع مقدم (anterior poliomyelitis) میں یا بغلی (axillary) (منحن: circumflex) عصب یا پانچویں اور چھٹی عصبی جڑوں کو نقصان پہنچنے

کی حالت میں ہوتا ہے۔

اس ہڈی کے سرکا معتد بہ حصہ بغل میں اوپر کی طرف کو اٹھایاں لے جا کر محسوس کیا جاسکتا ہے اور اس سے پہلے بازو کی زور سے تعبید کر لیجاتی ہے تاکہ ہڈی کا سر جوڑ کے کیسہ کئے پرین حصہ سے مس کرنے لگے۔ ذراعیہ کے سر کا زرخ زیادہ تر داخلی یا وسطانی سر قندال کے رخ میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تعلق بلاشبہ ہڈی کی ہر وضع میں قائم رہتا ہے اسلئے یہ کندھے کی چوٹوں کا امتحان کرنے اور دست ورزی سے خلوع کی ترجیع کرنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس سر قندال سے ہڈی کے بالائی سرے کی وضع معلوم کرنے کے لئے بطور اشاریہ کام لیا جاتا ہے۔

260

لاغر اشخاص میں کتف کا خاکہ اور اسکے کنارے کم و بیش واضح طور پر شناخت کئے جاسکتے ہیں۔ مگر شعیب اور قوی العضلات افراد میں سوائے شوکہ اور اکرومی کے ہڈی کے دیگر تمام حصص تک جارحہ کی معمولی وضعوں میں رسائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس ہڈی کے فوقانی (وعلانی) زاویہ اور فخری کنارہ کو نمایاں کرنے کے لئے موضوع کے ہاتھ کو مقابل کے کندھے کی طرف جہانک ممکن ہو سکے لے جانا چاہئے۔ تحتانی زاویہ اور بغلی کنارہ کو نمایاں کرنے کے لئے کلائی کو کر کے پیچھے رکھنا چاہئے۔ کتف کے شوکہ اور اکرومی کے مقام اتصال پر جو زاویہ بنتا ہے وہ بازو کی پیمائش لینے کے لئے بہترین مقام ہے۔ فیتہ کو یہاں سے ذراعیہ کے خارجی قندال تک لے جاتے ہیں۔ کتف کا بالائی کنارہ دوسری پسلی پر اور اسکا زیرین زاویہ ساتویں پر واقع ہوتا ہے۔ اگر دیلہ (empyema) کے لئے پیچھے کی طرف کتفی خط میں کوئی عملیہ سرانجام دیا جائے تو یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ کتف نیچے سے نیچے کی وضع میں بھی فتح کو مسدود نہ کرنے پائے۔ لہذا جو پسلی قطع کیجائے وہ یا تو آٹھویں ہو یا نویں۔ فنی مزاوالت میں صحیح پسلی کی تعین اس پسلی کے معلوم کرنے سے کیجاتی ہے جو کتفی زاویہ سے عین باہر ہو جبکہ بازو طرف جسم سے لٹا ہوا ہے۔

جب بازو طرف جسم کے ساتھ لٹک رہا ہو اور ہاتھ کی ہتھیلی ماسنے کی طرف ہو تو اکرومی خارجی یا جانبی سر قندال اور کعبہ کا زائدہ ابریہ سب کے سب ایک خط میں واقع ہوتے ہیں۔

عضلہ صدریہ کبیرہ (pectoralis major) و عضلہ دالبیہ (deltoid) کے درمیان کا میزاب عموماً شناخت کیا جاسکتا ہے۔ اس میں سے قیفانی ورید (cephalic vein) اور اکرومی صدی (acromio-thoracic) شریان کی ایک بڑی شاخ گزرتی ہے۔

اس میزاب کے نزدیک اور ترقوہ کے ذرا نیچے غائی زائدہ (coracoid process)

محسوس کیا جاسکتا ہے۔ گریہ زائدہ ان دونوں عضلات کے درمیانی وقفہ میں موجود نہیں ہوتا بلکہ یہ عضلہ دلتیہ (deltoid) کے سب سے اندرونی ریشوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔

غرابی اکرومی (coraco-acromial) رباط کا محل متعین کیا جاسکتا ہے اور اگر اس کے نقطہ وسطی پر چاقو بھونک دیا جائے تو اسے ذوراسین (biceps) کے وتر سے ٹکرانا چاہئے اور اس سے کندھے کا جوڑ کھل جانا چاہئے۔ جب بازو طرف جسم کے ساتھ لٹکتا ہے اور متعین اس کے کی طرف کو ہوتی ہے تو ذوراسینی میزاب (bicipital groove) : بین درنی تجلیفہ (intertubercular sulcus) اکرومی ترقوی جوڑ کے عین نیچے محسوس کیا جاسکتا ہے۔

261

ترقوہ کے عین نیچے ایک نشیب تحت ترقوی حفرہ (infraclavicular fossa) ہوتا ہے جسکی گہرائی میں مختلف افراد میں محدبہ اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ذراعیہ کے زیر غرابی خلوع میں اور ترقوہ کے ایسے کسور میں جنہیں بد وضعی بھی ساتھ شامل ہو نیز بہت سی بالید ہائے بغل سے اور دیوار صدر کے بالائی حصہ کے بعض التہابات سے بھی پُر ہو جاتا ہے۔ زیر ترقوی اور زیر غرابی خلوع میں اس حفرہ کی جگہ ایک فزائید ہوتا ہے۔ اس خط میں ایک مقام پر جو غرابی زائدہ کے اندر کی (وسطانی) طرف واقع ہوتا ہے اور ترقوہ کے تقریباً وسطی حصہ کا متناظر ہوتا ہے بغلی شریان کے نمضانات دوسری پسلی پر محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ ترقوہ کے عین نیچے صدر یہ کبیرہ (pectoralis major) کے قسمی اور ترقوی حصوں کے درمیان کی بین فضا اکثر شناخت کی جاتی ہے۔

بغل۔ بغل کے مقدم اور موخر کنارے بہت واضح ہوتے ہیں۔ مقدم کنارہ جو

صدر یہ کبیرہ (pectoralis major) کی زیریں کور سے بنتا ہے پانچویں پسلی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ بغل کے گڑھے میں جارحہ اعلیٰ کی وضع کے لحاظ سے اختلاف واقع ہوتا ہے، بشرطیکہ دوسری تمام حالتیں یکساں رہیں۔ یہ اُن حالتوں میں عمیق ترین ہوتا ہے جبکہ بازو کو طرف جسم سے ۹۰° کے زاویہ پر اٹھایا جائے اور جب وہ عضلات جن سے اسکے کنارے بنتے ہیں حالت انقباض میں ہوں جب بازو خط افقی سے اوپر اٹھایا جاتا ہے تو یہ گڑھا زیادہ اتھلا ہو جاتا ہے اور ہڈی کا سر اس فضا میں تطیل کر آتا ہے جس سے یہ کم و بیش پُر ہو جاتی ہے اور اس حفرہ کی چوڑائی مقدم اور موخر شکلوں کے قریب آجانے سے کم ہو جاتی ہے۔ جب بازو جسم سے زاویہ قائمہ پر اوپر اٹھایا جاتا ہے تو عضلہ غرابیہ عضدیہ (coraco-brachialis) سے بغل کی ذراعیتی جانب کے ساتھ ساتھ ایک

نمایاں مریمہ بنجا تا ہے۔ اگر بازو کو طرف جسم کے ذرا نزدیک لے آئیں تو جراح کا ہاتھ بغل میں اوپر تک بخوبی جاسکتا ہے اور دیوار صدر کا استقصاؤ تیسری پسلی کی بلندی تک کیا جاسکتا ہے۔

بغلی غدد جب طبعی حالت میں ہوں تو محسوس نہیں کئے جاسکتے۔ مرکزی گروہ بغل کے بالوں کے گچھے کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ بغلی غدد کی کلانی کا امتحان کرنے کے لئے جراح کو یہ چاہئے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بالکل قریب لاکر مخروط کی شکل کا بنائے اور اسے بغل کے راس میں جتنی بلندی ممکن ہو لے جائے اور پھر اسے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف پہلے بغل کی صدری دیوار پر اور پھر اسکی مقدم اور موخر اور ذرا عینی دیواروں پر لیجائے۔ اس طریقہ سے کلانی یافتہ غدد انگلیوں میں پھنس جاتے ہیں اور محسوس کئے جاسکتے ہیں اور نہ بغل میں انگلیوں کے سرے محض گاڑ دینے سے غدد کو اوپر کی طرف دھکیل دینے کا امکان ہوتا ہے جس سے انکی کلانی شناخت نہیں ہو سکتی۔

زیر ترقوی (subclavian) شریان کے تیسرے حصہ اور بغلی (axillary) شریان اور اسکے تسلسل — عضدی (brachial) شریان — کا رخ ایک خط سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو ترقوہ کے وسط سے لیکر غرابی زائیدہ سے گزرتا ہوا پیش مرفقی حفرہ کے نقطہ وسطی تک کھینچا جائے جبکہ بازو کی دھڑ سے زاویہ قائمہ پر تبعید کی گئی ہو اور ہاتھ جت حالت میں ہو۔

صدریہ صغیرہ (pectoralis minor) کا بالائی کنارہ ایک خط سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو تیسری پسلی سے اسکے غضروف کے قریب سے غرابی زائیدہ کی نوک تک کھینچا جائے۔ جس مقام پر یہ خط بغلی شریان کے خط کو کاٹتا ہے وہ مقام اکرومی (acromio-thoracic) شریان کے محل کو ظاہر کرتا ہے۔ صدریہ صغیرہ (pectoralis minor) کا زیرین کنارہ اور جانبی یا طویل صدری (lateral or long thoracic) شریان کا محل جو اسکے کنارہ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے ایک خط سے ظاہر کئے جاسکتے ہیں جو پانچویں پسلی سے انکی غضروف کے نزدیک سے لیکر غرابی زائیدہ کی نوک تک کھینچا جائے۔

زیر کتبی (subscapular) شریان کا خط زیر کتبی عضلہ (subscapularis) کے زیرین یا جانبی کنارہ کا مظاهر ہوتا ہے جبکہ ساتھ ساتھ یہ شریان جاتی ہے۔ مگر اس کنارہ کا محل وقوع زندہ یا غیر تقطیع شدہ موضوع میں صرف اندازہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

منحن (circumflex) (بغلی : axillary) عصب اور موخر منحن (posterior circumflex) شریان ذراعیہ کو افقی خط میں عضلہ دلیہ (deltoid) کے انتصابی محور کے

نقطہ وسطی کے اوپر تقریباً ایک انگلی کی چوڑائی کے فاصلہ پر عبور کرتے ہیں۔ یہ مقام اس عصب کی مفروضہ کو فتگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ کتقی ٹھری (dorsalis scapulae) شریان (منحن کتقی circumflex scapular) بغلی کنارہ کو اس مقام پر عبور کرتی ہے جو عضلہ دالید (daltoid) کے امتصافی محور کے نقطہ وسطی کا قناظر ہوتا ہے۔

بغلی (axillary) شریان کی بڑی بڑی شاخوں کے محل وقوع کے مختلف نشانات اس حالت میں معلوم کئے جاتے ہیں جبکہ بازو اپنی طبعی وضع میں طرف جسم پر لٹک رہا ہو۔

ترقوہ (clavicle)۔ ترقوہ کے اوپر کی جلد ڈھیلے طور پر چپکی ہوتی ہے اور

ہڈی پر سے ادھر ادھر ہٹائی جاسکتی ہے۔ اس حالت سے اس امر کی توجیہ ہوسکتی ہے کہ ترقوی خطہ کی کوفٹگیوں میں جلد میں کیوں حقیقی زخم نہیں آتا اور نیز اس سے کسی حد تک جلد کے ترقوہ کے کسور میں بکھرتا منشعب نہ ہونے کی توضیح بھی ہوجاتی ہے۔

وہ تین فوق ترقوی (supraclavicular) اعصاب جو ترقوہ کو عبور کرتے ہیں تیسرے اور چوتھے عنقی اعصاب کی شاخیں ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھنا مناسب ہوگا کہ بالائی عنقی عمود فقری کے مرض میں ہنسل کے اوپر درد کا محسوس ہونا ایک نمایاں علامت ہوتا ہے۔ یہ علامت اس حالت میں ان اعصاب کی خواش سے پیدا ہوتی ہے جو انکے قنال شوکی سے نکلنے کے مقام پر واقع ہوتی ہے۔

گاہے گاہے خارجی وراجی (external jugular) اور قیفالی (cephalic) ورید کا ایک درمیانی رابطہ ترقوہ کو عبور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہ ان عملیہ جات میں جو زیر ترقوی (subclavian) شریان کے تیسرے حصہ اور عضدی ضغیرہ (brachial plexus) کو معتر کرنے کے لئے سرانجام دئے جاتے ہیں کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ رابطہ شاذ طور پر ایک سوراخ میں بھی گھورتا ہے جو خود ترقوہ میں واقع ہوتا ہے۔

ترقوہ کے نیچے بڑے بڑے عروق اور بڑے بڑے عصبی احوال پہلی پسلی پر پڑے ہوتے ہیں۔ ورید سب سے اندر کی طرف ہوتی ہے اور ہنسل اور پہلی پسلی کے درمیان کے زاویہ مادہ میں واقع ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہڈی کی بالیدیں ان اہم ساختوں پر آسانی سے دباؤ ڈال سکتی ہیں اور ورید کے اپنے محل وقوع کی وجہ سے اور نیز کم مزاحمت پیش کر نیکی باعث

عضدی ضغیرہ (brachial plexus) کے اجمال۔ ڈایا فراہمی (phrenic) عصب اور طویل صدری (long thoracic) عصب (عصب بل: nerve of Bell)۔ صدری قنات (thoracic duct) کتغیہ لامیہ (omohyoid)، مختلف الانضلاع (scalene)، قصبیہ لامیہ (sterno-hyoid) اور قصبیہ درتبیہ (sterno-thyroid) عضلات۔ اور پچیسپیٹے کا راس۔ اس ہڈی کا قصی سر لا اسمی (innominate) یا بائیں سبائی (left carotid) شریان، عصب تائم (vagus) اور بازگرد (recurrent) اعصاب، قصبہ (trachea) اور مخ (oesophagus) سے زیادہ دور نہیں ہوتا۔

ترقوہ کے تعلقات اسکے جزوی یا کلی اتیصال کے خطرات کو ظاہر کرنے کے لئے بیان کئے گئے ہیں۔ جوں جوں جراح اکرومی سرے سے قصی سرے کی طرف بڑھتا ہے عملیہ کی مشکلیں اور اسکے خطرات زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اس ہڈی کے اکرومی ٹلٹ کا اتیصال مقابلہ آسان ہے مگر قصی حصہ کا اتیصال مشکل اور خطرناک ہے۔ تمام ترقوہ کو دور کر دینے سے بازو کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

جارج اعلیٰ اور درصہ کے درمیان ترقوہ ہی صرف ایک بلا واسطہ تعلق ہے اور شدید حادثات میں جب تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو سالم جارج اعلیٰ کا بالکل الگ ہو جانا ممکن ہوتا ہے۔ بل روتھ (Billroth) اور دوسروں نے قلع جارج کے ایسے واقعات کا اندراج کیا ہے۔

ترقوہ کے کسور۔ ترقوہ جسم کی کسی دوسری اکیلی ہڈی کی نسبت زیادہ کثرت سے

ٹوٹتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جارج اعلیٰ اور درصہ کے درمیان صرف یہی ایک عظمیٰ تعلق ہے اور یہ چوٹ کے معرض اثر میں اکثر آتا ہے۔ طویل بیرم یعنی جارج اعلیٰ کے ذریعہ سے اس پر قوت کا اثر ڈالا جاسکتا ہے۔ بالواسطہ چوٹ سے جو عام کسور واقع ہوتا ہے وہ ترجہا ہوتا ہے اور اسکا محل ایک ہی ہوتا ہے یعنی یہ ہڈی کے درمیانی ٹلٹ کے بیرونی کنارہ پر ہوتا ہے۔ ترقوہ کا بیرونی ٹلٹ رباطات کے ذریعہ سے غرابی اور اکرومی زائڈوں سے اس مضبوطی سے وابستہ ہوتا ہے کہ یہ کتف کا ایک حصہ ہی تصور کیا جاسکتا ہے۔ لہذا کدھے کے بل گرنے سے صدمہ پہنچتا ہے وہ ترقوہ کے بیرونی اور وسطی ٹلٹوں کے مقام اتصال پر منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ہڈی اس مقام پر ٹوٹتی ہے جہاں یہ قوت کتف سے ترقوہ پر منتقل ہوتی ہے۔ اس محل پر مقام کسور کو

معین کرنے کے لئے غرابی اکرومی رباطات کا محل بلاشبہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جس ترقوہ پر تجربہ طولانی ضغط کا اثر ڈالا جاتا ہے وہ اس مقام پر نہیں ٹوٹتا (Bennett: -)

266

اس کے کسر میں مندرجہ ذیل غیر وضعیت پیدا ہوتی ہے۔ اندر کے ٹکڑے کی وضع یا تو غیر متغیر رہتی ہے اور یا اسکا باہر کا سرا عضلہ قصیہ جلیہ (sterno-mastoid) کے ذریعہ سے ذرا اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس عضلہ کے ہر ایک فعل میں عضلہ صدیکہ بڑا (pectoralis major) اور قصی ترقوی (معین نما: rhomboid) رباط مزاحم آئینگے۔ باہر کے ٹکڑے میں تہری بد وضعی پیدا ہو جاتی ہے۔ (۱) یہ عین نیچے کی طرف کو چلا جاتا ہے۔ اور یہ بد وضعی زیادہ جارحہ کے وزن سے عمل میں آتی ہے جبکہ عضلہ صدریہ منغیرہ (pectoralis minor) اور عضلہ صدریہ کبیرہ (pectoralis major) کے زیر ریشے اور عضلہ عریضہ ٹھریہ (latissimus dorsi) بھی مدد پہنچاتے ہیں۔ (۲) یہ ان عضلات سے جو دھڑے سے کندھے کی طرف کو جاتے ہیں مثلاً رافع الکتف (levator scapulae) عضلہ عریضہ ٹھریہ (latissimus dorsi) اور خاصکر عضلات صدریہ (pectorals) عین اندر کی طرف کو چلا جاتا ہے۔ (۳) یہ ٹکڑا اس طرح گردش کر جاتا ہے کہ اسکا باہر کا سرا اگے کی طرف کو ٹکل جاتا ہے اور اندر کا سرا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ گردش زیادہ تر دونوں عضلات صدریہ کے ذریعہ سے عمل میں آتی ہے جبکہ عضلہ فشاریہ کبیرہ (serratus magnus) (مقدم) سے خاص مدد ملتی ہے۔ موصخر الذکر عضلہ کا طبعی فعل کتف کو آگے کی طرف کو لے جانا ہے اور ترقوہ بھی جو جارحہ اعلیٰ کو دھڑے سے مناسب فاصلہ پر رکھنے کے لئے ایک بازو ہمار (outrigger) کی طرح کام کرتا ہے ساتھ ہی آگے کی طرف چلا آتا ہے اور کتف کو سیدھا رکھتا ہے اور جب یہ بازو ہمار ٹوٹ جاتا ہے تو عضلہ فشاریہ (serratus) کتف کو عین آگے کی طرف نہیں لے جاسکتا۔ اس ہڈی کا میلان دھڑ کی جانب کو جانے کی طرف ہوتا ہے اور اسلئے یہ اندر کی اور سامنے کی طرف کو حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لہذا اس کسر میں ٹکڑوں کا متراکب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ غیر وضعیت کو رفع کرنا مشکل ہوتا ہے اسلئے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سوائے فخذی کے اور کسی ہڈی میں قصر کے باقی رہ جانے کا اتنا احتمال نہیں ہوتا جتنا کہ ترقوہ کے ترچھے کسر کے بعد ہوتا ہے۔ قصر کی پائش شاذ و نادر ہی ایک انچ سے متجاوز ہوتی ہے۔ اس کسر میں جو بد وضعی پائی جاتی ہے

اسکی اصلاح مریض کے لیٹ جانے پر بخوبی کیجا سکتی ہے۔ چونکہ اس وضع میں جارح کا وزن دور ہو جاتا ہے اسلئے جو غیر وضعیت نیچے کے رخ میں موجود ہوتی ہے وہ فوراً رفع ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ کندھے کی چوٹی بھی پیچھے کی طرف کو مرکب جاتی ہے اسلئے باہر کے ٹکڑے کی غیر وضعیت جو اندر کی طرف ہوتی ہے اور اسکی گردش جو آگے کی طرف ہوتی ہے کسی حد تک دور ہو جاتی ہیں۔ بہر کیف موخر الذکر دونوں غیر وضعیتوں کا بیشتر حصہ کتف کی وساطت ہی سے دور ہوتا ہے۔ لینٹھ کی حالت میں کتف دکر صدر کے اور نزدیک آجاتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکا باہر کا سرا (اور اسکے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ ترقوہ کا باہر کا ٹکڑا بھی) باہر کی اور پیچھے کی طرف کو کھینچ جاتا ہے۔ بعض جراح کتف کے اس اہم فعل کو جوان واقعات میں غیر وضعیت کو رفع کرنے کے لئے بروئے کار لاتا ہے تسلیم کرتے ہوئے کتف کو دھڑ سے مضبوطی سے پٹیوں کے ذریعہ سے باندھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی بازو کو اوپر اٹھا دیتے ہیں۔

بلا واسطہ چوٹ سے جو کسور واقع ہوتے ہیں وہ بالعموم مستعرض ہوتے ہیں اور ہڈی کے ہر ایک حصہ میں واقع ہو سکتے ہیں۔ جب یہ وسطی ثلث میں واقع ہوتے ہیں تو ان میں وہی غیر وضعیت پائی جاتی ہے جسکا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے۔ جب کسر مخروط نما (conoid) اور شبیہ منصرف (trapezoid) رباطات کے درمیان واقع ہوتا ہے تو کوئی غیر وضعیت ممکن نہیں ہوتی۔ اور جب یہ ان سے باہر واقع ہوتا ہے تو باہر کے ٹکڑے کا باہر کا مرا عضلات صدریہ (pectorals) اور عضلہ منشاریہ (serratus) کی وجہ سے آگے کو چلا جاتا ہے اور اسس کا اندر کا مرا عضلہ منصرف (trapezius) کی بدولت ذرا اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ اس کسر میں باہر کے ٹکڑے کی کوئی عمومی غیر وضعیت نیچے کی طرف کو نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ اس رخ میں حرکت نہیں کر سکتا تا وقتیکہ کتف بھی اٹھ جائے نہ جائے اور کتف غرابی ترقوی رباطات سے ترقوہ کے اندر کے ٹکڑے سے وابستہ رہتا ہے۔

ترقوہ صرف عضلہ فعل کی شدت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پوئے لین (Polailon) نے الملاح کردہ واقعات کے محتاط تجزیہ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو عضلات ہڈی کو توڑتے ہیں وہ عضلہ دالبیہ (deltoid) اور عضلہ صدریہ کبیرہ کا ترقوی حصہ ہیں۔ یہ کسی حالت میں بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ کسر عضلہ قصبیہ حلیہ (sterno-mastoid) سے واقع ہوتا ہے۔ جن حرکتوں سے یہ کسر بالعموم واقع ہوتا ہے وہ جارح کی آگے کی طرف کی یا اوپر کی طرف کی شدید حرکتیں ہیں۔ یہ عام طور پر ہڈی کے

وسط میں واقع ہوتے ہیں اور انہیں سوائے دونوں ٹکڑوں کے آگے کی طرف کو یعنی اول الذکر دونوں عضلات کے ریشوں کے رخ میں حرکت کر جانے کے کوئی غیر وضعیت موجود نہیں ہوتی۔

ترقوہ میں خیز راس کسر (green-stick fracture) جسم کی کسی دوسری ہڈی کی نسبت زیادہ کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ منسل کے ٹوٹنے کے نصف واقعات درحقیقت ۵ سال کی عمر سے پہلے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

اس ہڈی کے تعلقات کی طرف رجوع کرنے سے یہ ظاہر ہو گا کہ شدید کسور میں جنہیں بہت سی غیر وضعیت موجود ہوا اور ٹکڑے تیز ہوں اعصاب اور عروق کو اہم متلازم ضررات (associated injuries) پہنچ جاتے ہیں (دیکھو شکل ۶۲)۔ جارحہ اعلیٰ کے شکل (جو قاعدۂ غیر مکمل ہوتا ہے) کے بہت سے واقعات کی اطلاع وصول ہوئی ہے جن میں شیلل اس ہڈی کے کسر سے پیدا ہوا تھا۔ انہیں سے بعض واقعات میں یہ علامت اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ٹکڑوں سے کسی بڑی عصبی جل کے حقیقتہً مضبوط یا مشق ہو جانے سے پیدا ہوئی تھی اور بعض میں عصب کا ضرر اگرچہ ابتدائی حادثہ ہی میں واقع ہوا تھا مگر شکستہ ترقوہ سے غیر متعلق تھا۔ عضلہ ذوراسین (biceps) عضلہ عضدیہ (brachialis) اور عضلہ عضدیہ کعبیہ (brachio-radialis) (باطمحہ طویل: supinator longus) یعنی ان عضلات کا شل جھکو بالائی (جانبی) حمل رسد پہنچاتی ہے کدے پر بھاری وزن اٹھانے سے واقع ہوا جاتا ہے۔ زیر ترقوی (subclavian) شریان اور زیر ترقوی ورید اور نیزد اخسل و داجی (internal jugular) ورید اور اکرومی صدری (acromio-thoracic) شریان کے زخمی ہونے کے واقعات کی اطلاع بھی پہنچی ہے۔ کئی ایک مثالوں میں یہ کسر پھیپھڑے کے زخم کی معیت میں اوپر کی پسلیوں کے کسر کے ساتھ یا اسکے بغیر پایا گیا تھا۔

ترقوہ میں تعظم جسم کی ہر ایک ہڈی سے پیشتر شروع ہوا جاتا ہے۔ بوقت پیدائش تمام پور غظمی ہوتی ہے مگر دونوں سرے ابھی تک غضروفی ہی ہوتے ہیں۔ اسکے قصی سرے کے لئے ایک بر بال (epiphysis) ہوتا ہے جو اٹھارویں اور بیسویں سال کے درمیان ظاہر ہوتا ہے اور پچیسویں سال کے قریب پوری سے متحد ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نخل سا ہوتا ہے اور قصی مفصل کے رباہات سے گھرا ہوتا ہے اور حادثہ میں ابھی طرح سے علحدہ نہیں ہو سکتا۔

لے سر جیتھ (Mr. Heath) (لائسٹ: Lancet) ۱۸ نومبر ۱۸۸۸ء ایک واقعہ کی اطلاع دیتا ہے جو شام

جن واقعات میں ترقوہ خلقی طور پر غائب بتایا جاتا ہے ان میں ہڈی کے اس حصہ کی جگہ جو غشتا سے بنتا ہے ایک رباطی جبل ہوتی ہے اور سروں کی جگہ جو غضروف سے بنتے ہیں عظمیٰ کر تیجے ہوتے ہیں ترقوہ کے ناقص تعظم کے ساتھ بالعموم کھوپری کی ان ہڈیوں کا غیر مکمل تعظم بھی پایا جاتا ہے جو غشتا سے بنتی ہیں اور یہ حالت جمجمی ترقوی سوء تعظم (cranio-cleido-dysostosis) کے نام سے مشہور ہے۔ اس مرض کی ڈی فٹز ویلیامس (D. Fitzwilliams) نے ۶۰ مثالیں جمع کی ہیں اور میں (سٹی-سی چائلس) نے تین اور دیکھی ہیں۔ اس مرض کے مریض ترقوہ کے زیادہ تر حصہ کے رباطی حالت پر قائم رہنے کی وجہ سے کندھے کو ایک غیر معمولی حد تک قریب لا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ترقوہ کا نقص اتنا محدود ہوتا ہے کہ یہ کمرے متاثر ہوتا ہے۔

قصی ترقوی مفصل (sterno-clavicular joint) اگرچہ صرف یہی

ایک مفصل ہے جو جارح اعلیٰ کو دھڑ سے بلا واسطہ متحد کرتا ہے مگر پھر بھی اس میں اتنی کافی لماعت موجود ہوتی ہے کہ اس میں خلع مقابلہ شاذ طور پر ہی واقع ہوتا ہے۔ اس مفصل کی حرکت کا انحصار زیادہ تر قص اور ترقوہ کے قصی سرے کے روگوں میں عدم توافق موجود ہونے پر ہوتا ہے۔ ان حصوں کا باہمی عدم تناسب بین مفصلی غضروف کی وجہ سے برقرار رہتا ہے جو صرف ترقوی سطح کے خاکہ کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس مفصل کا کہف وی (V) کی شکل کا ہوتا ہے، جسکی وجہ یہ ہے کہ ترقوہ جبکہ بازو پہلو سے قریب لٹک ہوا اپنے خانہ کو محض اس کے زاویہ زیریں پر ہی مس کرتا ہے۔ لیکن جب ہاتھ اوپر اٹھا ہوا ہو تو یہ دونوں ہڈیاں ایک دوسری کے ساتھ زیادہ قریبی طور پر مس کرتی ہیں اور کہف مفصلی صرف ایک جھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس مفصل کے مریض میں یہ پایا جاتا ہے کہ اسکی تمام حرکتوں میں سے صرف جارح اعلیٰ کا اوپر کو اٹھانا ہی ایک ایسی حرکت ہے جس سے درد ہمیشہ پیدا ہوتا ہے۔ مفصل نازل عنقی (descending cervical) عصاب کی فوق ترقوی شاخ سے رسد حاصل کرتا ہے۔

بقیہ حاشیہ معفر گد شستہ۔ فقہیہ المثال ہے۔ یہ واقعہ ایک چودہ سال کے لڑکے کا ہے جسکا ترقوہ کرکٹ میں بال کرتے ہوئے برابلی غضروف سے علحدہ ہو گیا تھا اور برابلی اعلیٰ حال رہا۔ یہ ظاہر ہے کہ جس عضلہ سے یہ حادثہ واقع ہوا وہ عضلہ مددیر کبیر ہی تھا۔

ترقوہ کی تمام وضعوں میں مقدم اور موضوع قصی ترقوی رابطات کے معتدل طور پر تنبیہ ہونے کی وجہ سے اس مفصل کی حرکتیں محدود ہوتی ہیں۔ رباط موضوع ترقوہ کی اس حرکت کو باز رکھتا ہے جو قص پر آگے کی جانب کو ہوتی ہے اور جس میں رباط مقدم مزاحم آتا ہے۔ یہ موضوع الذکر رباط موضوع بند کے مقابل میں زیادہ ڈھیلا اور کم مضبوط ہوتا ہے اور اسکی کمزوری سے آگے کی طرف کو خلع واقع ہونے کی کسی حد تک توجیہ ہوتی ہے۔

270

ترقوہ کی جو حرکت قص پر پیچھے کی طرف کو واقع ہوتی ہے اس کی تسخیر رباط مقدم سے ہوتی ہے۔ اور اس ہڈی کے سرے کے پیچھے کی طرف کو گزرنے میں مضبوط مزاحم آتا ہے۔ اس حرکت کی مخالفت ضلعی ترقوی رباط سے بھی ہوتی ہے۔ لہذا پیچھے کی طرف کو خلع واقع کرنے کے لئے معتد بہ قوت کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں (مسیحی) چوالیس نے صرف ایک ہی واقعہ دیکھا ہے جو گھوڑے پر سے لہو پر پڑا ہوا تھا۔ اس میں لٹا ہر دونوں رابطات دیدہ ہو گئے تھے اور دوران اندام میں خلع کے بار دیگر واقع ہوئے روکنے کے لئے معتد بہ شکل پیش آتی تھی۔

قصی ترقوی مفصل کا مرض - مفصل میاں مفصلی غضروف کے ذریعہ سے

درحقیقت دو جوڑوں پر منقسم ہوتا ہے۔ دوران میں سے ہر ایک میں ایک واضح زلابی غشا ہوتی ہے ان جوڑوں میں جوڑوں کے معمولی امراض پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ مرض ان زلابی تاجوں میں سے ایک ہی میں شروع ہو سکتا ہے اور کچھ عرصہ کے لئے اسی تک ہی محدود رہ سکتا ہے۔ وقت گزرنے پر بالعموم تمام مفصل ماؤف ہو جاتا ہے۔ مگر ترقی یافتہ واقعات میں بھی مرض بعض اوقات غضروف کی ایک ہی طرف کے زلابی کہہ تک محدود رہتا ہے۔ بعض مصنفین کی یہ رائے ہے کہ مفصل نفیق الدم (pyæmia) سے کسی دوسرے مرض کی نسبت زیادہ کثرت سے متاثر ہوتا ہے۔ جب قصی ترقوی مفصل میں انصباب اور بالخصوص تنجید پیدا ہو جاتا ہے تو ورم بالعموم سامنے کی طرف ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس مفصل کے ارد گرد معنی رباطی ساختیں ہیں انیس سے مقدم قصی ترقوی رباط سب سے پتلا اور سب سے کم مزاحم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپ جب از خود باہر نکل آتی ہے تو عام طور پر مقدم سطح پر ہی سے خارج ہوتی ہے۔

قصی ترقوی مفصل کے خلوع - ترقوہ کا خلع قص سے ان تین رگوں میں سے

کسی ایک رخ میں واقع ہو سکتا ہے اور یہ لمبا ظ کثرت وقوع بالترتیب دئے گئے ہیں۔ (۱) آگے کی جانب۔ (۲) پیچھے کی جانب۔ (۳) اوپر کی جانب۔ رباطات کے مفصل کی حرکتوں کو محدود رکھنے کے متعلق جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس سے ان خلوع کی اضافی کثرت وقوع سمجھ میں آ سکتی ہے۔

اکرومی ترقوی مفصل

یہ مفصل اتھلا ہوتا ہے اور جن دو ہڈیوں سے یہ بنتا ہے انکا خاکہ ایسا ہوتا ہے کہ ترقوہ کے اکرومی سے دور ہٹ جانے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہوتی۔ اس مفصل کی طاقت کا انحصار حقیقت میں تقریباً سب کا سب اسکے رباطات پر ہوتا ہے۔ اسکا مستوی اس خط سے ظاہر کیا جاتا ہے جو ان ہڈیوں کے درمیان اوپر سے نیچے کی اور اندر کی طرف کو کمینیا جائے۔ اس مفصل کا یہ میلان اس امر کی توضیح کرتا ہے کہ اس حصہ کا عام خلع ترقوہ کے اکرومی پر سے اوپر کی طرف ہٹ جانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مقام پر جو خلع واقع ہوتا ہے اسکا ایک مخالفہ ایگز منظر شعاعی نگار شوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے، خاصاً جبکہ نلی کو مفصل کے اوپر صیح طور پر نہ رکھا گیا ہو۔ لہذا یہ بہت ممکن ہے کہ شعاع نگار ش کا نا تجربہ کار شارح ایسی حالت میں بھی خلع تشخیص کر دے جبکہ کوئی خلع موجود نہ ہو۔ چونکہ اس مفصل کے حرکات میں حادثہ یا مرض کی وجہ سے نقص واقع ہو جاتا ہے اس لئے

271

یہ معلوم کر لینا بہتر ہوگا کہ جارحہ کے حرکات میں یہ مفصل کیا حصہ لیتا ہے۔ جب کتف (اور نیزہ) ہارے کہ اسکے ساتھ بازو بھی ہوتا ہے) صدر پر آگے اور پیچھے کی جانب کو پھسلتا ہے تو ایکٹس کی شکل میں حرکت کرتا ہے جسکا مرکز قصی ترقوی مفصل پر ہوتا ہے، اور نصف قطر ترقوہ ہوتا ہے۔ جب یہ ہڈی آگے کی طرف کو حرکت کرتی ہے تو ان وجوہ کی بنا پر جسکا ذکر ابھی آئے گا یہ ضروری ہے کہ وقتی کہف کا رخ بھی ترجیحی سمت میں آگے کی طرف کو ہو۔ یہ موزن الذکر مطلوبہ حالت اکرومی ترقوی مفصل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس مفصل کی عدم موجودگی میں تمام کتف ترقوہ کے برونی ہوتے آگے کی طرف کو گزرتے وقت مذکورہ بالا دائرہ کے خط کا متبع کر لیا اور وقتی کہف کا رخ اندر کی جانب کو زیادہ ہو جائے گا۔ یہ لازمی ہے کہ وقتی کہف کی سطح ذراعیہ کے طویل محور پر حتی الامکان زاویہ قائمہ کی حالت میں قائم رہے۔ جب یہ تعلقات برقرار ہیں تو ذراعیہ کے پیچھے ہڈی کی مضبوط سطح کا سہارا موجود ہوتا ہے اور کسی حد تک اسی سہارے سے فائدہ اٹھانے کے لئے گونیسے باز جانب سے یعنی ذراعیہ کو پیچھے سے کتف کا اچھی طرح سے سہارا دیکر گونسا مارتا ہے لگرا اکرومی ترقوی جوڑ

272

موجود نہ ہوتا تو قبی حفرہ بازو کو آگے کی طرف بڑھانے کی صورت میں سہارا نہ دیتا اور اس حالت میں گھونسا مارنے سے جب کہ جارحہ اس وضع پر ہو یا اسی طرح کے حالات کے تحت ہاتھ کے بل گرنے سے ذراعیہ کے کندھے کے جوڑ کے کیسہ کی طرف نکل جانے کا امکان ہوتا ہے جس سے خلع پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا طبیعی حالتوں میں جوں جوں کتف اور بازو آگے کی طرف کو بڑھتے ہیں اکرومی اور ترقوہ کے ہم پہلو حصہ کے درمیان کا زاویہ زیادہ حاد ہوتا جاتا ہے اور قبی حفرہ ایسی وضع پر قائم رہتا ہے کہ اسکا رخ کافی حد تک آگے کی طرف کو ہوتا ہے تاکہ ذراعیہ کو مضبوط سہارا دے سکے۔ چنانچہ اب یہ ثابت ہو گیا ہوگا کہ اس چھوٹے سے جوڑ کی سختی کندھے کے مفصل کی مدم حفاظت اور جارحہ کے بعض حرکات میں ضعف پیدا ہونے کا باعث ہو سکتی ہے۔ جب بازو اٹھا کر سر کی جانب لایا جاتا ہے تب بھی اس مفصل میں حرکت واقع ہوتی ہے اور جوں جوں کندھا اوپر کو اٹھتا جاتا ہے ترقوہ اور بغلی کنارہ کے درمیان کا زاویہ زیادہ حاد ہوتا جاتا ہے۔

اکرومی ترقوی جوڑ کے خلوع۔ ترقوہ یا تو اوپر کی طرف ہٹ کر

اکرومی پر چلا جاتا ہے اور یا نیچے کی طرف ہٹ کر اسکے نیچے چلا جاتا ہے۔ پوسٹے لون (Polailion) نے مقدم الذکر خلع کے ۳۸ واقعات اور مؤخر الذکر کے صرف ۶ واقعات ہی جمع کئے ہیں۔ اس عدم تناسب کی زیادہ تر توضیح اس جوڑ کی مفصلی سطحوں کے رخ سے ہو جاتی ہے۔

کتف (scapula)۔ اس ہڈی کی مؤخر یا ظہری سطح پر جو عضلات اگلے شوکر کے

عین اوپر اور اسکے عین نیچے واقع ہوتے ہیں وہ عمیق رداسے وابستہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ فوق شوکر کی عضلہ (supraspinatus) ایک رداس بند ہوتا ہے جو اس عضلہ کے مبداء کے ارد گرد ہڈی سے چسپیدہ ہوتی ہے اور اس سے ایک کہنہ طیار ہو جاتا ہے جو صرف اس عضلہ کے منتہی کی طرف ہی کھلتا ہے۔

لے ان مفاسل کے میکانیہ کا بہت عمدہ بیان دیکھنے کے لئے دیکھو مورسز "انATOMY آف دی جوائنٹس"

(Morris's "Anatomy of the Joints")

تحت شوکی (infraspinatus) اور مدخلی صغیر (teres minor) عضلات بھی ایک نمایاں گہر بہت گہری ردا سے گھریے ہوتے ہیں جو عضلات کی اُس طرف ہڈی سے پسیدہ ہوتی ہے اور آگے کی طرف غلاف دالیہ کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے اور اس سے ایک دوسری بند فضا بن جاتی ہے۔ ان رداؤں کی ترتیب اُس قلیل المقدار کدم (ecchymosis) کے پیدا ہونے کی توضیح کرتی ہے جو عظم الکُتف کے کسور کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔

کُتف کے حرکات۔ جسم کے پہلو سے بازو کو اوپر اٹھا کر سر کے اوپر انتصابی

وضع میں لانے میں ایک دوسری حرکت واقع ہوتی ہے۔ (۱) کُتف اور دوسرے درمیان۔ (۲) ذراعیہ اور کُتف کے درمیان کندھے کے جوڑ پر۔ پہلے جوڑ میں حرکت کی مقدار تقریباً ۹۰° ہوتی ہے۔ اور دوسرے میں تقریباً ۱۰۰° درجہ ہوتی ہے۔ ایک جوڑ دوسرے جوڑ کا معاون ہوتا ہے۔ لہذا کندھے کے جوڑ کی جہات میں بازو کی کسی قدر تبعید اور تقریب باقی رہ جاتی ہے، اور تمام بالائی جارحہ دوار کُتف کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ یہ نتیجہ حاصل کرنے کے لئے قبل اسکے کہ جہات واقع ہو بازو کی پہلو سے تبعید کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ جارحہ اوپر اٹھا دیا جاتا ہے تو کُتف میں ایک آزاد دوار کی حرکت واقع ہو جاتی ہے اور اس کا فکری کنارہ تقریباً انتصابی وضع سے تقریباً افقی وضع میں آ جاتا ہے۔ اس حرکت کی ابتدا پر جب تک کہ بازو پہلو سے ۳۵° تک نہیں پہنچ جاتا کُتف کا زاویہ تقریباً ساکن رہتا ہے۔ اس مرحلے میں کُتف مثبت رہتا ہے اور عضلہ منخرنسر (trapezius) عضلات معین نما (rhomboids) اور عضلہ منشاریہ کبیرہ (serratus magnus) اسکو اسکی جگہ پر قائم رکھتے ہیں۔ اگر عضلہ منخرن (trapezius) میں شلل واقع ہو گیا ہو جیسا کہ گردن سے غدد دور کرنے میں عصب معین (accessory) (نخاعی معین: spinal accessory) کے اتفاقیہ کٹ جانے سے ہو جاتا ہے تو تحتانی زاویہ اور فکری کنارہ مرتفع بازو کے بوجھ سے پیچھے کی طرف کو کھل جاتے ہیں اور کندھے کا گردنی حصہ نیچے اور آگے کی طرف کو گر جاتا ہے۔ جب بارودہ ۳۰° درجہ سے آگے کھل جاتا ہے تو عضلہ منشاریہ کبیرہ (serratus magnus) کا فعل شروع ہو جاتا ہے اور کُتف کا تحتانی زاویہ سرعت سے آگے کی طرف کو چلا جاتا ہے اگر عضلہ منشاریہ کبیرہ (serratus magnus) مشلول ہو جائے (بیل: Bell) کا طویل صدی عصب جو پانچویں، چھٹے اور ساتویں اعصاب

نکلتا ہے) یا اسکے متضاد عضلات — عضلات معین نما (rhomboids) — میں جو اس حالت میں فعل کرتے ہیں شلل واقع ہو جائے (وہ عصب جو پانچویں عصب سے آتا ہے) تو کتف کا زاویہ اور موخر کنارہ نمایاں یا ”ممتنع“ (winged) ہو جاتے ہیں — یہ علامت ان عضلات کے شلل کی ہے۔ چنانچہ حرکت کی ابتدا میں کتف کی جراحی (winging) عضلہ منخرس (trapezius) کے شلل کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہ حرکت کے اچھی طرح شروع ہو جانے کے بعد واقع ہو تو عضلہ منخرس کبیرہ (serratus magnus) ماؤف ہوتا ہے۔

274

کتف کے کسور اور خاص کر اس ہڈی کے جسم کے کسور اس حصہ کی حرکت پذیر

اور ان دبیر عضلات کے موجود ہونے کی وجہ سے جو اسکے زیادہ پتلے حصوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور انکی حفاظت کرتے ہیں کثیر الوقوع نہیں۔ مزید برآں یہ نرم عضلی گدی پر ممکن ہوتا ہے اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ پسلیوں کی لچک سے بھی اسکی مزید حفاظت ہوتی ہے۔

عام ترین ضرب اکرومیائی زائئڈہ (acromion process) کا کسر ہے۔ یہ اکثر صرف بربالہ کی طلعدنگی کی شکل ہی میں واقع ہوتا ہے۔ اکرومی کے دو اور بعض اوقات تین بربالی مرکز ہوتے ہیں۔ اور ان میں تغلم سن بلوغ کے قریب نمودار ہوتا ہے اور بائیس سال سے لیکر پچیس سال تک کی عمر میں سارا بربالہ بقیہ ہڈی سے متحد ہو جاتا ہے۔ اکرومی کے مفروضہ کسر کے کئی ایسے واقعات جن میں اتحاد یعنی بافت سے عمل میں آ جاتا ہے غالباً ناقص طور پر متحدہ بربالہ کی مثالیں ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ چوٹ سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ سیمنگٹن (Symington) نے ۴۰ جسموں میں سے ۵ جسموں میں یہ مشاہدہ کیا کہ اکرومی بربالہ کتف کے شوک سے ایک یعنی واسطہ کے ذریعہ سے متحد تھا اور دیگر مشاہدین کے اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورے ۱۰ فیصدی بالغوں میں یہی حالت موجود ہوتی ہے۔ اس خطہ کے شعاعی ترسیمات کی ترجمانی کرنے میں یہ امر معتد بہ اہمیت رکھتا ہے اس زائئڈہ کے کسور میں زیادہ غیر وضعیت بہت کم پائی جاتی ہے کیونکہ اس ہڈی کے اوپر ایک کثیف پوشش موجود ہوتی ہے جو اس سے چسپیدہ عضلات سے حاصل ہوتی ہے۔ غرابائی زائئڈہ (coracoid process) میں بعض اوقات حقیقی کسر پایا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ ایک بربالہ کی طرح جدا ہو جاتا ہے۔ بربالہ کی حیثیت سے یہ اصلی ہڈی کے ساتھ تقریباً ۷۰ سال کی عمر میں متحد

ہوتا ہے۔ فوق وقبی درنہ (supraglenoid tubercle) جو ذوراسین (biceps) کے طویل سر کا مبدا ہوتا ہے غرابی بر بال کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ باوجود اسکے کہ غرابی زائدہ مقوی عضلات چسپیدہ ہوتے ہیں، غیر وضعیت بالعموم خفیف سی ہوتی ہے کیونکہ غرابی تر قوی رباطات شاذوناً ہی پھلتے ہیں۔ یہ معلوم رہے کہ رباطات اس زائدہ کے قاعدہ سے چسپیدہ ہوتے ہیں۔ چند واقعات میں یہ زائدہ عضلی فعل کی شدت سے ملحدہ ہو چکا ہے۔

275

جسم کتف کے جو کسور زیادہ عام ہیں انیس سے ایک صغیفہ (blade) کا مستعرض یا ترچھا کسر ہے جو شوک کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ چونکہ تحت شوکی (infraspinatus) زیر کتفی (subscapularis) اور دیگر عضلات دونوں ٹکڑوں سے چسپیدہ ہوتے ہیں اسلئے عام طور پر صرف خفیف سی غیر وضعیت ہی واقع ہوتی ہے۔ جراحی عنق (surgical neck) میں سے کسر واقع ہو سکتا ہے اور یہ اس ہڈی کا ایک تنگ حصہ ہے جو وقبی حفرہ کے پیچھے اور فوقی کتفی کٹاؤ (کتفی ثلمہ: incisura scapularis) کی سیدھ میں واقع ہوتا ہے۔ لہذا چھوٹا ٹکڑا غرابی زائدہ پر مشتمل ہو گا اور بڑا کرومی پر۔

کتف کے سلعات۔ مختلف قسم کے سلعات کتف سے پیدا ہوتے ہیں اور


یہ زیادہ تر اس ہڈی کے اسفنجی حصوں یعنی شوک، عنق اور تحتانی زاویہ پر نمودار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صرف کتف کا اتصال کر دینا ہی کافی ہوتا ہے مگر یہ ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ اس حالت میں وہ بڑا نصاب جس پر جارحہ اعلیٰ گردش کرتا ہے دور کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ان حالتوں میں بین کتفی صدری (interscapulo-thoracic) بتر سر انجام دینے کا زیادہ رواج ہے، جو بعض اوقات ان خبیث سلعات کے لئے کیا جاتا ہے جو کندھے کے جوڑ کے قرب و جوار پر اثر انداز ہوں۔

بغل (نیز دیکھو صفحہ 261)۔ جراحی نقطہ نگاہ سے بغل کو گردن اور جراحہ

کے درمیان کی گذر گاہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۶۳)۔ بغلی سلعات اور خراجات فشر ہو کر گردن میں جاسکتے ہیں اور اسی طرح عنقی بالیدیں اور قیچی اجتماعات بھی بغل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جلد کے جس حصہ سے بغل کا قاعدہ بنتا ہے اس پر بہت سے چھوٹے چھوٹے بال

ہوتے ہیں اور اس میں کثیر التعداد دہنی اور عرقی غد پائے جاتے ہیں۔ اس جلد میں چھوٹے چھوٹے سطحی خراجات جو غدنی بافتوں کے تفتیح سے پیدا ہوتے ہیں اکثر مشاہدہ کرنے میں آتے ہیں اور یہ جلد کے کپڑوں سے رگڑ کھانے سے رونما ہوتے ہیں۔ چونکہ بغل کی جلد میں رگڑ کے اثر سے خراشیدہ اور ملہب ہو جانے کا رجحان موجود ہوتا ہے اسلئے سیما جی زبان کے استعمال کو بھی

276



شکل ۶۳۔ بغلی شریان اور عضلہ صغیرہ کا تعلق کندھے کے جوڑاؤں سے۔

غرض سے جیسا کہ آتشک میں کیا جاتا ہے اس مقام کا انتخاب اچھا نہیں۔
جلد اور اوپری ردا کے نیچے بغلی ردا (axillary fascia) ہوتی ہے اور اس غشا کے آگے بغلی فضا (axillary space) ہوتی ہے۔ جس انقبالی بافت سے بغلی فضا پر ہوتی ہے وہ بہت ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ڈھیلا پن بازو کی آزاد حرکت کی سماعت کرتا ہے مگر ساتھ ہی اسکی وجہ سے بڑے بڑے تقبی اجتماعات اور خون کی بہت وسیع و عابد ریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔

اس خط میں ردا کی ترتیب کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ تین تہوں سے زیادہ تر سائبہ پڑتا ہے۔ (۱) عمیق صدری ردا جس سے عضلہ صدریہ کبیرہ پوشیدہ اور محصور ہوتا ہے۔ (۲) ترقوی صدری ردا جو ترقوہ سے منقسم ہوتی ہے اور زیر ترقوی عضلہ (subclavius) کو محصور کرتی ہے اور ضلعی خرابی (costo-coracoid) غشا کی شکل میں نیچے کی طرف چلی جاتی ہے اور زیر ترقوی عضلہ اور عضلہ صدریہ غیرہ کے درمیان کی فضا کو پُر کرتی ہے اور یہ بڑے بڑے عروق اور عصاب کے سامنے واقع ہوتی ہے۔ اسکے بعد یہ ردا تقسیم ہو کر عضلہ صدریہ غیرہ کو محصور کر لیتی ہے اور بغل کے مقدم شکن پر عمیق صدری تہ سے لمباتی ہے جس کے بغلی ردا بن جاتی ہے۔ یہ ساری غشا بعض اوقات ”بغل کے تعلیقی رباط“ (suspensory ligament of the axilla) کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بغلی ردا کو ترقوہ کی طرف اوپر کھینچتی ہے اور بغل کے گڑھے کی پیدائش کا موجب زیادہ تر یہی ہے۔ (۳) بغلی ردا جو قبل الذکر دونوں رداؤں کے متحد ہوجانے سے بنتی ہے اور بغل کے قاعدہ پر اسکے مقدم شکن سے لیکر موضعی شکن تک پھیلی ہوتی ہے۔ بغل کے بالوں کے نیچے یہ باریک ترین ہوتی ہے۔

بغلی خطہ کے قرب وجوار کا خراج عضلہ صدریہ کبیرہ کے نیچے اور

دونوں صدری عضلات کے درمیان یا عضلہ صدریہ غیرہ اور ترقوی صدری ردا کے نیچے اور اسلئے بغلی فضا میں بن سکتا ہے۔ بغلی فضا میں ڈھیلی ڈھالی بافت کے موجود ہونے کی وجہ سے عظیم بہت کہف خراج بن جاتا ہے۔ جب خراج سے بغل پُر ہو جاتی ہے تو یہ عضلہ صدریہ کبیرہ کو آگے کی طرف کو دھکیل دیتا ہے اور بغل کے جوف کو کم و بیش بھر دیتا ہے اور کثف کو پیچھے کی طرف ہٹا دیتا ہے اور عضلہ فشار کبیرہ (مقدم) اور زیر کتبئی عضلہ کے درمیانی زاویہ کو چوڑا کر دیتا ہے۔ لہذا جن خراجات کا مدارک نہ کیا گیا ہو انہیں اوپر کی طرف پھیل کر گردن میں چلے جانے کا بہت رجحان پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہی وہ سمت ہے جس میں مزاحمت اقل ہوتی ہے۔ تقیبی اجتماع گردن سے منصف میں بھی جاسکتا ہے ایک واقعہ میں بغلی خراج نے جس کی ابتدا کندھے کے جوڑ کے مرض سے ہوئی تھی پہلی میں ضلعی فضا کو منتقب کر دیا تھا اور یہ ہلک ذات الجنب کا باعث ہوا تھا۔

بغلی خراج کھولنے اور درحقیقت اس فضا میں تمام شفاف دیتے وقت چاقو بغل کے فرش کے مرکز پر یعنی مقدم اور موضعی ششیوں کے وسط میں اور اس فضا کی اندرونی یا صدری

طرف کے قریب داخل کرنا چاہئے بغیر سوچے سمجھے شکیاف دینے سے جن عروق کو نقصان پہنچنے کا امکان ہوتا ہے۔ زیر کتفی (subscapular) عروق ہیں جو زیر کتفی عضلہ کے زیرین کنارے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور جانبی (طویل) صدری عروق ہیں جو چھوٹے صدری عضلہ کے زیرین کنارے کی متابعت کرتے ہیں اور نیز وہ بڑے بڑے عروق ہیں جو ذرا عیہ کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ اگر چاقو مناسب طریقہ پر داخل کیا جائے تو اسے قبل الذکر دونوں عروق کے درمیان اور بڑے بڑے تنوں سے کافی دور ہونا چاہئے۔ ایک شریان ہے جو بعض اوقات بغلی تنے کی سب سے نیچے کی شاخ کی شکل میں نکلتی ہے اور بغل کے وسطی حصہ کو عبور کرنے کے بعد طویل صدری شریان کے نیچے صدر پر منقسم ہو جاتی ہے۔ متذکرہ بالاشکاف سے یہ شریان غالباً زخمی ہو جائے گی۔ مگر یہ شریان بہت غیر مستقل اور چھوٹی سی ہوتی ہے اور سطح کے زیادہ نیچے نہیں ہوتی۔ یہ بالعموم عورتوں میں پائی جاتی ہے۔

بغل کے لمفی غدود۔ بغلی غدود کثیر التعداد ہوتے ہیں اور یہ جراحی

نقطہ نگاہ سے بہت اہم ہیں (دیکھو شکل ۵۸ صفحہ 243)۔ انکو چار گروہوں میں ترتیب دیا جاسکتا ہے (۱) انہیں سے بیشتر بغلی ورید کے اندر کی طرف بغل کے بالوں کے گچھے کے نیچے واقع ہوتے ہیں۔ غدود کا یہ مرکزی گروہ جارحہ اعلیٰ اور پستان سے لمف وصول کرتا ہے (احس whitlow) یا بازو کے کسی عفوئی التہاب سے بغل میں جو درد محسوس ہوتا ہے اسی گروہ کے التہاب سے پیدا ہوتا ہے جبکہ بین ضلعی ذرا عیہ (intercosto-humeral) عصب قنقب کرتا ہے۔ (۲) عمیق بغلی گروہ بغلی عروق کے ساتھ ساتھ واقع ہوتا ہے۔ یہ مرکزی گروہ سے لمف وصول کرتا ہے اور زیرین عمیق غدد سے جو زیر تر قوی مثلث میں واقع ہوتے ہیں مسلسل ہو جاتا ہے۔ (۳) دوسرے غدود عضلہ منٹار کیہرہ (serratus magnus) کے اوپر بغل کی صدری طرف پر صدری عضلات کے زیرین کنارے کے ذرا نیچے واقع ہوتے ہیں۔ انہیں چھاتی کے سامنے کی طرف کے عروق لمف اور پستان کے بڑے بڑے عروق لمف اور حد ناف تک کے شکم کے سطحی عروق لمف آکر ملتے ہیں۔ انکے برآر عروق زیادہ تر غدود کے مرکزی گروہ ہی میں جا کر داخل ہوتے ہیں۔ یہ غدود بعض عوارض پستان میں اور چھاتی اور شکم کے بالائی حصے پر آبلے پیدا ہونے یا دیگر سطحی التہاب وغیرہ کے واقع ہونے کے بعد سب سے پہلے کافی یافتہ ہوتے ہیں۔ عورت کے پستان کا بغلی زائدہ

اس گروہ سے سس کرتا ہے۔ (۴) بقیہ غد بد بغل کے پیچھے کی طرف زیر کتفی عروق کے ساتھ ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کمر کے کتفی اور قطنی خصلوں کے عروق لف آ کر ملتے ہیں۔

یہاں یہ معلوم کر لینا بھی مناسب ہو گا کہ عضلہ دالید (deltoid) اور عضلہ صدریہ کبیرہ (pectoralis major) کے درمیانی میزاب میں عام طور پر ایک یا دو لغنی غد پائے جاتے ہیں انہیں انگشت اشاریہ اور بازو کی بیرونی طرف اور کندھے اور پستان کے کچھ حصہ کے عروق لف آ کر ملتے ہیں۔ اگر انگشت اشاریہ کا کوئی سرانقی عارضہ التهاب عروق لف (lymphangitis) پیدا کر دے تو اسکی پہلی غذی مزاحمت اکثر اس ایک غد پر ہوتی ہے جو زیر تر قوی خط میں غرابی زائدہ کے پاس واقع ہوتا ہے۔ عضلہ دالید (deltoid) کے اوپر کے حصہ کے اوپری عروق لف عمقی غد کو جاتے ہیں (فلو: Tallaux)۔ اور نیچے کے نصف پر کے بغل کو جاتے ہیں۔ فوق شوکی حفرہ سے جو عروق لف آتے ہیں وہ فوق کتفی (مستعرض کتفی) شریان کے ساتھ ساتھ جا کر زیر ترین منفی غد سے مل جاتے ہیں۔ کمر کے سطحی عروق لف جو مستند ہو کر بغل میں پہنچتے ہیں گردن سے عضلہ منحرفہ (trapezius) کے اوپر سے اور تمام ٹھری اور قطنی خصلوں سے حرقنی عوف (iliac crest) تک سے آتے ہیں۔

بغلی غد کا مکمل زالہ ایک ایسا عملیہ ہے جو اکثر اوقات اور خاص کر سرطان پستان کے واقعات میں سرا انجام دیا جاتا ہے۔ ان تک دونوں صدری عضلات دور کرنے سے آزادانہ رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ پستان کے سرطان میں بالائی بغلی غد اور خاص کر وہ غد جو بغلی ورید کے ساتھ ضلعی غرابی (costo-coracoid) غشا کے پیچھے واقع ہوتے ہیں اس وقت تک مناسب طور پر دور نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ عضلہ صدر میغیرہ اور عضلہ صدر کبیرہ بھی ساتھ ہی علیحدہ نہ کر دیے جائیں۔ ان غد کے محل وقوع سے سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ جب یہ مرض زدہ ہو جاتے ہیں تو بغلی عروق سے اور خاص کر ورید سے ان کے منضم ہو جانے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔

بغلی عروق۔ بغلی ورید باسلیق (basilic) اور عضدی شریان کی دونوں

رفیق وریدوں کے متحد ہونے سے بنتی ہے۔ یہ اتحاد عام طور پر عضلہ صدر میغیرہ کے برین کنارہ پر واقع ہوتا ہے اور اسلئے یہ ورید شریان کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ورید واحد کی شکل میں موجود نہیں ہوتی بلکہ ترقوہ کے صین نیچے جا کر ایک سنا بن جاتا ہے۔ جب یہ حالت موجود ہو تو

یہ شریان کے عملیات کے لئے بہت غیر مساعد ہوتی ہے کیونکہ شریان کی دونوں طرف جو وریدیں واقع ہوتی ہیں انکو آپس میں ملائے کے لئے بہت سی مستعرض شاخیں شریان کو عبور کرتی ہیں چونکہ بغلی ورید مقابلہ قلب کے نزدیک واقع ہوتی ہے اسلئے جہاں تک اسکے اندر کے خون کا تعلق ہے یہ شہیتی حرکت سے باسانی متاثر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ اس عرق یا اسکے بڑے بڑے معاونوں کے کسی زخم میں سے ہوا اندر کھینچ جائے اور موت واقع ہو جائے۔ اصلی ورید میں ہوا کے داخلہ کو غالباً اس امر سے مدد ملتی ہے کہ غرابی غشا (ترقی صدری ردا کا بالائی حصہ) اس عرق سے منضم ہوتا ہے اور اسلئے اسکا رجحان ورید کے زخمی ہونے کی حالت میں اس کو منفتح رکھنے کی طرف ہوتا ہے۔

شریان کی نسبت ورید زیادہ کثرت سے زخمی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ زیادہ بڑی اور زیادہ اوپری ہوتی ہے اور نیز اس طرح واقع ہوتی ہے کہ شریانی تے پر یہ کم و بیش متراب ہوتی ہے بخلاف اسکے جو کہ ذریعہ سے جو ضرر عرق کو پہنچتا ہے جیسا کہ خلوع کی ترجیح میں ہوتا ہے اس سے ورید کی نسبت شریان کو زیادہ کثرت سے نقصان پہنچتا ہے۔ بالائی جارحہ کی تمام وضعوں میں شریان بغلی فضا کے بیرونی زاویہ کی طرف ہی رہتی ہے۔ مگر ورید کا جو تعلق بغلی شریان کے پہلے حصہ یعنی اس حصہ سے ہوتا ہے جو عضلہ صدریہ غیرہ سے اوپر واقع ہوتا ہے اس میں جارحہ کی وضع سے تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بازو پہلو پر لگتا ہے تو ورید شریان کی اندرونی وسطانی جانب پر ذرا آگے کی طرف کو ہوتی ہے۔ مگر جب جارحہ دھڑ سے زاویہ قائمہ پر ہوتا ہے تو ورید کھچ کر شریان کے آگے آ جاتی ہے کہ اسکو تقریباً پوشیدہ کر دیتی ہے۔

بغلی شریان کے پہلے حصہ پر بندش لگانے کے متعلق یہ معلوم کر لینا مناسب ہے کہ عضلہ صدریہ کیرو کے عضلی ریشہ جات کے دونوں مستویوں کے درمیان بعض اوقات ایک غلوی نغہ موجود ہوتا ہے (Heath)۔ اگر عضلہ صدریہ صغیرہ کا مبدا دوسری پسلی سے ہو تو شریان کو کم و بیش مکمل طور پر پوشیدہ کر دیتا ہے اور اسکے کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عضدی صغیرہ کی جو جمل اس شریان سے نزدیک ترین ہوتی ہے اسے بھی غلطی سے بعض اوقات شریان تصور کر لیا جاتا ہے اور یہ اس بندش میں بھی جو شریان کے لئے مقصود ہوتی ہے آسانی سے آ جاتی ہے۔ اس عملیہ میں بغلی عروق تک قیفالی ورید (cephalic vein) کے تعاقب سے باسانی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ جو نہی یہ شریان عضلہ صدریہ کیرو کی طرف کو جاتی ہے مقدم داخلی صدری (anterior

(internal thoracic) عصب ورید اور شریان کے درمیان ظاہر ہو جاتا ہے اور گاہے گاہے یہ بھی بطور رہنما کے کام دے سکتا ہے۔


اس شریان کے تیسرے حصہ پر بندش لگاتے وقت یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بعض اوقات ایک عضلی دھجی عروق کو ترچھے رخ میں عبور کرتی ہے۔ یہ عضلہ عرضیہ ظہریہ (latissimus dorsi) سے نکل کر عضلہ صدر کیہو غرابی عضلہ (coraco-brachialis) یا ذوراسین عضلہ سے مل جاتی ہے۔ اس دھجی سے دوران عمل میں کچھ اختلال پیدا ہو جاتا ہے اور یہ غلطی سے بعض وقت غرابی عضلہ تصور کر لی جاتی ہے۔

عضدی ضغیرہ (brachial plexus) جب کندھا منحنف ہو تو عضدی ضغیرہ

کے بالائی اور وسطی دونوں تنے جو پانچویں چھٹے اور ساتویں عقی اعصاب سے بنتے ہیں بغل میں ترقوہ کے نقطہ وسطی کے ذرا باہر کی طرف داخل ہونے کے لئے قصبی حلی عضلہ (sterno-mastoid) کے موخر کنارے کے نیچے سے گزرتے ہوئے گردن میں واضح طور پر محسوس کئے جاسکتے ہیں (شکل ۶۲)۔ یہ عصبی تنے پہلی پسلی کی اوپر کی سطح کی طرف جاتے ہیں جہاں یہ زیر ترقوی (subclavian) شریان کی اوپر کی اور ظہری طرف پر واقع ہوتے ہیں اور اس راستہ میں یہ ڈبیلی ڈھالی تقالی بافت سے گھرے ہوتے ہیں جو کندھے کے ارتفاع اور انحناف کے ساتھ ساتھ ضغیرہ کو بھی آزاد حرکت کرنیکی اجازت دیتی ہے۔ فوق ترقوی خط کے اس حصہ پر جہاں شریان کے بنفانات کے اوپر کی اور پیچھے کی طرف عصبی تنے محسوس کئے جاسکتے ہیں (خاص کر جبکہ مریض بیٹھا ہو اور اسکا کندھا منحنف ہو) ضغیرہ میں بازو کی عدم حیثیت پیدا کرنے کے لئے اثرات کئے جاتے ہیں۔

بالائی اتنا جو پانچویں اور چھٹے اعصاب سے بنتا ہے چوٹ کے لئے دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ معرا ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا مبدا وسطی اور زیرین تنوں کے مقابلہ میں گردن میں زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ لہذا اگر گردن زور سے بائیں طرف کو جھکا کر جائے جیسا کہ دائیں کندھے پر بوجھ اٹھانے کی حالت میں ہوتا ہے تو دائیں جانب کے بالائی تنے پر وسطی اور زیرین اجال کی نسبت زیادہ بار پڑتا ہے (شکل ۶۳)۔ بوقت پیدائش تنفی طریق (presentation) کی حالت میں یا جب کبھی کندھا اور گردن کسی حادثہ کی وجہ سے زور کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہٹ جائے تو بالائی جصل پر بار پڑنے یا اسکے منقش ہو جانے کا امکان ہوتا ہے جس سے ایک عارضہ پیدا ہو جاتا ہے

جو عام طور پر شلل آرب (Erb's palsy) کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ فوق کتفی (suprascapular) مہنجن (circumflex) (بغلی: axillary) اور عضلی جلدی (musculo-cutaneous) اعصاب اس تنے سے نکلتے ہیں۔ نیز معین نما عضلات (rhomboids) اور عضلہ فشریہ کبیرہ (serratus magnus) کے اعصاب بھی اسی سے



شکل ۶۴۔ عضدی ضفیرہ کے بالائی اور وسطی تنے یہ ظاہر کرنے کے لئے پیچھے سے دکھائے گئے ہیں کہ کندھے کا انخفاض یا سر کی جانبی تبعید جسمی احوال کو کس طرح تنیدہ کر سکتی ہے اور انکو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
(پوائیئر: Poirier کے مطابق۔)

نکلتے ہیں۔ بہر کیف اشتقاق بالعموم ان موخر الذکر اعصاب کے مبدا کی بعیدی جانب پر واقع ہوتا ہے لہذا یہ عضلات کچ جاتے ہیں۔ شلل آرب (Erb's palsy) میں جو عضلات مآؤف ہوتے ہیں وہ فوق شوکی عضلہ (supraspinatus)، تحت شوکی عضلہ (infraspinatus)، عضلہ صغیرہ (teres minor)، عضلہ والیہ (deltoid)، غرابی عضلہ (coraco-brachialis) عضلہ ذوراسین (diceps)، عضلہ عضدیہ (brachialis) اور عضلہ عضدیہ (brachio-radialis)

ہیں اور گاہے گاہے عضلہ بالٹو (supinator) (قصیرہ: brevis) ، عضلہ باسط رمنغیہ کعبیہ طویلہ (extensor carpi radialis longior) اور عضلہ کابہ (کعبیہ) مدلمجب (pronator radii teres) بھی ماؤف ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں حسی شلل دیکھتے ہیں نہیں آتا۔ یہ ایک عجیب امر ہے کہ پانچویں عنقی عصب کو کاٹنے سے عضلی شلل کا جو رقبہ نمودار ہوتا ہے وہ اتنا ہی وسیع ہوتا ہے جتنا کہ پانچویں اور چھٹے متحدہ اعصاب کو کاٹنے سے حاصل ہوتا ہے (ولفرڈ ہیرس: Wilfred Harris)۔ عضدی ضغیرہ کے مکمل طور پر منقطع ہو جانے کی حالت میں حس کہنی سے آگے پوری طرح غائب ہو جاتی ہے۔ مگر بازو اور کندھے میں عمیق حاسیت برقرار رہتی ہے (شرین: Sherren)۔ ایسے ضررات پیدا ہونے کی صورت میں نازل عنقی (descending cervical) اور بن ضلعی ذراعیتی (intercosto-humeral) اعصاب سے حاصل شدہ اعصاب بازو میں اپنے محل پر قائم رہتے ہیں۔

بغلی اعصاب۔ زخم سے کسی ایک عصب کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مگر


وسلمی (median) کو سب سے زیادہ کثرت سے نقصان پہنچتا ہے! (عضلی مرغولی: musculo-spiral) کو سب سے کم۔ مومنوالذکر عصب کی تقابلی مامونیت کی توجیہ انکے عینی محل اور اسکے جارجہ کی اندرونی اور مومنوجانب پرواق اور اسکے عظیم الجسامت ہونے سے ہوتی ہے۔ جارجہ پر ایسے جرح کا عمل ہونے سے جو کم و بیش مکمل قلع سے کسی قدر کم ہو اعصاب شاذ و نادر ہی ٹوٹتے ہیں۔ اور اگر یہ زور سے کچھ جائیں تو بغل میں ٹوٹنے کی نسبت انکے جبل شوکی سے جہاں یہ اس سے چسپیدہ ہوتے ہیں علحدہ ہو جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ چنانچہ فلوبرٹ (Flaubert) نے ایک واقعہ درج کیا ہے جس میں اخیر کے چار عنقی اعصاب مخلوع کندھے کی تریج کے لئے شدید کوشش کرتے وقت جبل سے علحدہ ہو گئے تھے۔

خطہ والیہ۔ یہ خطہ جو کندھے کی چوٹی پر مشتمل ہے ہر طرف سے عضلہ

سے محدود ہوتا ہے۔ عضلہ والیہ (deltoid) عضد کے اوپر کے سرے اور کندھے کے جوڑ کو ڈھکے ہوتا ہے (شکل ۶۵)۔ لہذا اس جوڑ اور سطح کے درمیان صرف جلد، سطحی ردا، عضلہ والیہ جو اپنے غلاف میں ہوتا ہے اور کچھ ڈھیلی ڈھالی اتھالی با (زیر والیتی بافت: subdeltoid tissue)

بھی ہوتی ہے جس میں عظیم زیر دالیتی (subdeltoid) (زیر اکرومی: subacromial) درجہ یک موجود ہوتی ہے۔ زیر دالیتی بافت بعض اوقات ایک واضح و بیز غشا کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اس جوڑے جو تھنجی اجتماعات آگے بڑھتے ہیں انکو محدود المقام رکھنے کے لئے یہ بعض اوقات ایک اہم اثر رکھتی ہے۔ عضلہ دالید کے اوپر کی شحمی بافت شحمی سغات کے پیدا ہونے کے لئے

284



شکل ۶۵۔ کندھے کے جوڑ کی تراش جو کیسہ اور برابالی خط اور درجہ یک کے تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔ (پولٹیر: Poirier کے مطابق)

ایک موافق مقام ہے۔

بغلی (axillary) (منحنی: circumflex) عصب اور مؤخر منحنی (posterior circumflex) شریان دونوں عضلات مدلیجہ (teres muscles) کے درمیانی وقفہ سے نچلتے ہیں اور یہ ذراعید کی پوری کے گرد ہڈی کے بالکل نزدیک سے اور جراحی عنق کے خط کے قریب سے افقی رخ میں گھوم جاتے ہیں (شکل ۶۳ صفحہ 276 اور شکل ۶۵ صفحہ 284)۔ یہ عصب اس ترتیب کی ایک مثال ہے جسکی طرف ہٹن (Hilton) نے اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جوڑ کا اصلی

عصب نہ صرف مفصلی سطوح کو ہی رسد پہنچاتا ہے بلکہ مفصل کے عضلات فخر کہ میں سے بڑے عضلات کو اور نیز انکے اوپر کی جلد کو بھی رسد پہنچاتا ہے۔ یہ عصب کندھے کے جوڑ عضلہ دالیا اور عضلہ مدلمجیغہ (teres minor) کو اور کندھے کے بیرون دو تہائی حصہ اور عضلہ مثلثۃ الزو (triceps) کے بالائی حصہ کے اوپر کی جلد کو رسد پہنچاتا ہے۔ کندھے کے ضربات میں اس کو اکثر نقصان پہنچتا ہے اور بعض اوقات یہ اس حصہ کی کسی سادہ سی کو فتگی سے بہت بری طرح سے کھلا جاتا ہے، جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عضلہ دالیا میں شلل واقع ہو جاتا ہے۔ مگر کندھے کی کو فتگیوں کے بعد منحن (circumflex) کو جس کثرت سے کہ پہلے خیال کیا جاتا تھا اسکی نسبت بہت کم نقصان پہنچتا ہے۔ یہ عصب ذراعیہ کی جراحی عرق کے کسورا اور اس ہڈی کے خلوع (خاصکر عصبی خلج) میں اور ان خلوع کی ترجیع کے لئے شدید کوشش کرنے کے دوران میں پھٹ جاتا ہے (شکل ۶۳ اور ۶۴)۔

285

کندھے کا جوڑ۔ جراحی کے ایک نقطہ نگاہ سے جوڑ مندرجہ ذیل قسموں میں

تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ (۱) وہ جوڑ جنکی طاقت کا انحصار زیادہ تر رباطات پر ہوتا ہے۔ (۲) وہ جوڑ جو میکینک کے لحاظ سے پائدار ہوتے ہیں اور جنکی مضبوطی زیادہ تر انکی ان ہڈیوں کی ترتیب سے پیدا ہوتی ہے جن سے یہ بنتے ہیں اور (۳) وہ جوڑ جنکے سہارے کا دار و مدار زیادہ تر انکے عضلات پر ہے۔ پہلی قسم کی مثال کے طور پر قصبی تر قوی جوڑ پیش کیا جاسکتا ہے اور دوسری قسم کی مثال کے طور پر کہنی کا جوڑ اور تیسری قسم کی مثال کے طور پر کندھے کا جوڑ پیش کیا جاسکتا ہے۔ ایسے مفصل میں خلج واقع ہونے کا امکان سب سے کم ہوتا ہے جسکی مضبوطی کا دار و مدار کرٹے مضبوط رباطات پر ہو۔ مگر جس جوڑ میں خلج سب سے زیادہ کثرت سے واقع ہوتا ہے وہ تیسری قسم سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اسکی مضبوطی کا انحصار زیادہ تر عضلات پر ہوتا ہے جن پر اچانک بار پڑ سکتا ہے اور جنکا بے ترتیب فعل خود جوڑ کی کمزوری کا باعث ہو سکتا ہے۔ خلج کی تسبیب بلاشبہ صرف انہی امور پر ختم نہیں ہوتی۔ وقوع خلج کا بہت کچھ انحصار حرکت کی اس مقدار پر جو کسی مفروضہ جوڑ میں ہو سکتی ہے اور نیز برصیت کے اس درجہ پر ہوتا ہے جو اسکے حصوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔

غزانی اور اگر کوئی زائندوں اور انکے درمیانی رباطات سے جو محراب بنتی ہے وہ ذراعیہ کے سر کا لازمی سہارا ہے اور اس مفصل کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس محراب کے ساتھ

ذراعیہ کا سر قریبی تعلق رکھتا ہے مگر اس سے حقیقی طور پر پس نہیں کرتا (شکل ۶۵)؛ لیکن عضلہ دالیہ کے شلل میں ذراعیہ کا سر بعض اوقات غرابی زائده سے کچھ فاصلہ پر واقع ہوتا ہے۔ یہ معلوم کر لینا مناسب ہوگا کہ جب بازو پہلو کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے تو اس ہڈی کے سر کا تقریباً دو تہائی حصہ وقبی کہنہ (glenoid cavity) سے پس نہیں کرتا! ورنیگر (Anger) اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس وضع میں ذراعیہ کے سر کے محیط کاتین چوتھائی حصہ اس انتصابی خط کے آگے واقع ہوتا ہے جو اکرومی زائده کے مقدم کنارہ سے کھینچا جائے۔ نیز اس وضع میں سر بنناہم غرابی زائده کے باہر کی طرف ہوتا ہے۔

286

وقبی کہنہ کا حاشیہ بیرونی جانب کی نسبت اندر کی طرف زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور حاشیہ کا مضبوط ترین اور حفرہ کا عریض ترین حصہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور یہ ایک معمی خیز امر ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مفصل کے اس حصہ یعنی کیسہ کے پیرین اور اندر کی طرف کے حصہ کو جو مزاولت جراحی میں کمزور ترین ثابت ہوتا ہے مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی مقام پر ذراعیہ کا سر کندھے کے خلع میں جوڑے ملحدہ ہوتا ہے۔

کندھے کے جوڑ کا کیسہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور جتنا بڑا ذراعیہ کا سر ہوتا ہے اس سے دو گنی جماعت کے غلطی سر کی اسپین گنجائش ہو سکتی ہے۔ کیسہ کا کوئی حصہ بھی دوسرے حصوں کے مقابل میں ہمیشہ دبیز نہیں پایا جاتا جیسا کہ کو لھے کے جوڑ میں ہوتا ہے۔

کندھے کے جوڑ کے گرد نواح میں جو درجکیں ہیں ان میں سے زیر اکرومی

(subacromial) درجک میں مرض سب سے زیادہ کثرت سے واقع ہوتا ہے۔ اس تاج کا زلابی اتساع غلطی سے جوڑ کا مزمن التهاب تصور کر لیا جاتا ہے (شکل ۶۵)۔ تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس درجک کی دیواریں بازو کے مروڑے جانے کی حالت میں خاصکر جبکہ یہ خیم کردہ یا بسط کردہ ہو واقعی پھٹ جاتی ہیں۔ جب یہ تاج متدد ہو جاتا ہے تو تبعد سے درد کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وضع میں درجک کی دیواروں میں طبعی طور پر شکن پڑ جاتے ہیں جن سے حدیبہ عظیم کے سامنے ایک قسم کا کالرسا بن جاتا ہے۔ یہ تاج بعض اوقات جوڑ سے راہ و ربط رکھتا ہے۔

زیر کتفی درجک اس جوڑ کی غشائے زلابی کی ایک توسیع ہی تصور کیا سکتی ہے جو

اس عضلہ کے انتہائی سرے اور کتف کے درمیان تک پہنچی ہوتی ہے۔

بازو کو کندھے کے جوڑ پر گردش دینے پر اگر درد ظاہر ہو تو یہ اس جوڑ کے با زیر اکرومی درجک یا زیر کتفی درجک کے درد سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس حالت میں ان تینوں میں حرکت واقع ہوتی ہے۔

ذورا سین کا طویل وتر جوڑ کے بالائی حصہ کو مضبوط بناتا ہے، اور
 جارحہ کی مختلف وضعوں میں ذراعیہ کو وقتی کہنے سے لائے رکھتا ہے، اور اس ہڈی کے سر کو اوپر کی طرف اکرومی کے نیچے اسکے بہت قریب کھینچ آنے سے روکتا ہے۔ یہ وتر بعض اوقات عشق ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں جارحہ کے عمومی ضعف کے اور ایک عجیب قسم کے مریکے جو اس عضلہ کے پیٹے کے انقباض سے بنتا ہے پیدا ہو جانے کے علاوہ ذراعیہ کا سر عموماً اوپر اور آگے کی طرف کو بہا تک کھینچ آتا ہے کہ غرابی اکرومی محراب اسکو مزاحم آتی ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ایک خفیف سا کاذب خلع پیدا ہو جاتا ہے۔ جارحہ کے بعض شدید جھٹکوں میں جیسے کہ کبھی کبھی کرکٹ کا گیند پھینکتے وقت آجاتے ہیں یہ وتر بعض اوقات رباط مستعرض کو جس سے یہ مربوط ہوتا ہے پھاڑ دیتا ہے اور اپنے میزاب سے پھسل کر باہر کی یا اندر کی طرف کو ہٹ جاتا ہے اور عام طور پر یہ اندر کی طرف کو ہی ہٹتا ہے۔ بعض اوقات مزمن عظمیٰ التهاب مناسب مفصل (osteo-arthritis) کے واقعات میں وتر کا دروں کیسی حصہ ذراعیہ کی نواشیدہ مفصل سطح سے رگڑ کھانے کی وجہ سے فائب ہو جاتا ہے۔ ایسی حالتوں میں یہ ذورا سین (bicipital) میزاب سے چسپیدہ ہو جاتا ہے۔

کندھے کے جوڑ کا مرض۔ اس مفصل میں جملہ اقسام کے امراض مفصل

کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے، اس جوڑ کا کیسہ بہت ڈھیلہ ہوتا ہے اور مفصلی سطحیں صرف ارد گرد کے عضلات کی کش کی وجہ سے متقابل رہتی ہیں۔ کلوہ فارم دینے کے بعد یہ سطحیں باسانی ملحدہ کیجا سکتی ہیں اور انکا امتحان کیا جا سکتا ہے۔ بہر کیف مرض مفصل میں انصاف کی وجہ سے دونوں ہڈیوں میں معتد بہ علحدگ واقع ہو جاتی ہو۔ براون (Braune) نے فوق شوکی جھڑ میں سے وقتی کہنے کو منقب کیا، اور اس میں معتد بہ دباؤ کے ساتھ چربی کا شراب کر دیا۔ جب جوڑ مکمل طور پر متمد ہو گیا تو ذراعیہ کتف سے اپانچ سے زائد فاصلہ پراپتی گئی۔ اس امر سے

جارجہ کی اس طوالت کی توجیہ ہوتی ہے جو اکثر اوقات اس حصہ کے ایسے مفصلی مرض میں دیکھنے میں آتی ہے جس میں بہت سا انصباب موجود ہو۔ جب کیسہ کا تمدد انتہا کو پہنچ گیا تو ذرا عیب میں ذرا سبب واقع ہو گیا اور یہ اندر کی طرف کو گھوم گئی۔ لہذا یہ ایک معنی خیز امر ہے کہ کندھے کے جوڑ کے مرض میں بازو عام طور پر پہلو کے قریب پایا جاتا ہے اور کہنی کی قدرتی پیچھے کی طرف کو مٹی ہوتی ہے (بسط کردگی) اور جارجہ اندر کی طرف کو گھوما ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وضع اس جوڑ کے ارد گرد کے عضلات کے استوار انقباض سے بھی پیدا ہو جاتی ہو۔ جب اس قسم کے انقباضات

288

موجود ہوں تو ان سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ طاقتور عضل عریضہ فلٹیر (latissimus dorsi) کو اپنے مخالف عضلات پر فوقیت حاصل ہے اور یہ بازو کی اندر کی طرف کی گردش اور اس کے پیچھے کی طرف نکل جانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ برعکس خط کا اندرونی حصہ کیسہ کے عین اندر ہوتا ہے اور اسکے بیرونی مقدم اور موخر حصے بالکل زیر گردش عظمی ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا ہو جاتا ہے کہ تقریبی التهاب بریالہ (suppurative epiphysitis) میں پیپ جوڑ کے اندر چلی جاتی ہے۔

زلابی غشائیں سے دو عطفات نکلے ہوتے ہیں۔ (۱) ایک وہ جو ذوراسینی میزاب (بین

دنی تجویف) میں وتر کے ساتھ کچھ فاصلہ تک نیچے کی طرف جاتا ہے۔ (۲) ایک تہ انبان ہے

جو زیر کتفی عضلہ (subscapularis) کے نیچے زلابی کہنہ اور اس عضلہ کے نیچے کے درجہ کے

درمیانی ربط سے بنتی ہے۔ جب یہ جوڑ انصباب سے پُر ہو جاتا ہے تو کیسہ یکساں طور پر متمد

ہو جاتا ہے اور کندھا یکساں طور پر گول ہو جاتا ہے اور عطفات کے مقامات پر خاص مرمیات

بنجاتے ہیں۔ چنانچہ التهاب زلابی (synovitis) کے ابتدائی درجہ میں عضلہ مدد ریکبرہ

(pectoralis major) اور عضلہ دالید (deltoid) کے درمیانی میزاب میں اکثر ایک ورم

نمودار ہو جاتا ہے اور یہ ورم بعض اوقات ذوراسین کے مضبوط وتر سے منقسم ہونے کی وجہ سے

دو لختی معلوم ہوتا ہے۔ زیر کتفی (subscapular) عضلہ سے پرے بغل میں کیسہ کے غیر پوشیدہ

حصہ کا امتحان کرنے سے تھوچ بہترین طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ جوڑ متعجب ہو جاتا ہے

تو پیپ مذکورہ بالا تہ انبانوں میں سے کسی ایک میں چلی جاتی ہے اور یہ اکثر اس تہ انبان میں جاتی

ہے جو ذوراسین کے وتر کے ساتھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس طرح پیپ ذوراسینی میزاب کے ساتھ ساتھ

کچھ فاصلہ تک چلی جاتی ہے اور کندھے کے تدرن زدہ ہونے کی حالت میں جوف کا فتحہ اکثر

بازو کے بالائی حصہ کی اندرونی جانب کے نصف پر پایا جاتا ہے۔ ایک مندرجہ واقعہ میں پیپ

جو کندھے کے جوڑ سے نکلی تھی عضلی مرغولی (musculo-spiral) (کعبری: radial) عصب کے
مرکے ساتھ جا کر کہنی کے باہر کی جانب باہر نکلی تھی۔

خلوع - اس جوڑ کے خلوع جسم کے کسی دوسرے جوڑ کی نسبت زیادہ کثیر الوقوع

ہیں۔ اس امر کی توجیہ وقتی حفرو کے اٹھنے پر ذرا عیہ کے سر کے عظیم الجسامت اور گلوب نما
ہونے، بازو کی وسیع حرکتوں اور اس سے حاصل شدہ طویل ہر میت سئے اور اس مفصل کی قوت
کے زیادہ تر عضلات پر منحصر ہونے سے ہوتی ہے۔ جارحہ اصلی اور کندھے پر چوٹ لگنے کا امکان
خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے۔

289

عضلہ کا جو خلوع کندھے کے جوڑ پر واقع ہوتا ہے اسکے مندرجہ ذیل اقسام ہیں :-
۱۔ زیر وقبی (subglenoid) - نیچے کی اور کیتقدراگے کی طرف کو۔ نادر الوقوع
تمام اقسام میں ابتدائی خلع یہی ہوتا ہے مگر ذراعیہ کا سر پھسل کر بالعموم زیر غسرابی وضع میں
چلا جاتا ہے۔

- ۲۔ زیر غرابی (subcoracoid) - آگے کی اور ذرا نیچے کی طرف - عام قسم۔
- ۳۔ زیر تر قوی (subclavicular) - زیر غرابی خلع کی بہت ترقی یافتہ حالت ہے۔
- ۴۔ زیر شوکی (subspinous) - نادر الوقوع۔

گاہے گاہے خلع انتصابی (luxatio erecta) بھی جو زیر وقبی قسم کی ایک نوع
ہے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس میں بازو انتصابی حالت میں بغیر حرکت پذیری کے مثبت ہوتا ہے۔
تمام مکمل خلوع میں ذراعیہ کا سر مفصلی کہفہ کو چھوڑ کر کیسہ کے انشقاق میں سے نکل جاتا ہے
جو خلوع کا ذب، کہلاتے ہیں انہیں کیسہ فشق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر نعش میں عضلہ دالیہ
(deltoid) کو کاٹ دیا جائے تو ذراعیہ کا سر کیسہ کے فشق ہونے کے بغیر باہر غرابی زائدہ کے نیچے
لایا جاسکتا ہے۔ زندگی میں بھی اس عضلہ کے شلل کی حالتوں میں یہی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔

اس جوڑ کے خلع کی تمام حالتوں میں ابتدائی غیر وضعیت ہمیشہ نیچے کی طرف کو
ہوتی ہے اور عضلہ کا سر بغل کے اندر زیر وقبی وضع میں آجاتا ہے۔ کندھے کے خلوع بالعموم جارحہ
اسکی تبصیدی حالت میں چوٹ آنے سے پیدا ہوتے ہیں اور یا یہ ایسی شدید بلا واسطہ چوٹ ہو واقع
ہوتے ہیں جو ذراعیہ کو نیچے کی طرف کو دھکیل دے۔ اسلئے جب جارحہ حالت تبعد میں ہوتا ہے تو

ذراعیہ کا سروقبی حفرہ کے نیچے نکلا ہوتا ہے اور کیبہ کے تحتانی اور نہایت غیر محفوظ حصہ پر متنگن ہوتا ہے اور امپر دباؤ ڈالتا ہے۔ چونکہ کیبہ کے اس حصہ کے ریشے اس وضع میں زور سے تنے ہوتے ہیں اسلئے اس رباط کو منقش کرنے اور اس ہڈی کو بغل میں دھکیل دینے کے لئے غیر معمولی طاقت کے بروئے کار آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جوڑ کے خلوع میں کیبہ کا انشعاق اسکی تحتانی اور اندرونی جانب پر واقع ہوتا ہے اور ذراعیہ کا سر زیر کتفی عضلہ (subscapularis) کے نیچے آجاتا ہے جس پر ہمیشہ بار پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں دریدگی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ذراعیہ کا سرجب اس طرح نیچے کی طرف کو دب کر بغل میں پہنچ جاتا ہے تو بعض وجوہ کی بنا پر بعض اوقات وہیں قائم بھی رہتا ہے (زیر وقبی قسم: subglenoid form)۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لی قنور عضلہ صدر کی کبیرہ دوسرے عضلات کے ساتھ جکے فعل میں اب کم مزاحمت درپیش ہوتی ہے اور جارحہ کا وزن جس کے لئے اب سہارا نہیں ہوتا ہڈی کے سرے کو آگے کی اور اندر کی طرف کو کھینچتے ہیں۔ (زیر غرابی قسم: subcoracoid form) اور اخیر میں اگر ضرب کا رخ نمایاں طور پر سامنے کی طرف سے ہو تو اس ہڈی کا سر پیچھے کی طرف کو اکرومی یا شوکی زائڈوں کے نیچے گھس جاتا ہے (زیر شوکی قسم: subspinous form) زیر غرابی قسم کی انتہائی کثرت وقوع کی وجہ ان امور سے ہوتی ہے کہ جو عضلات ہڈی کو آگے کی طرف کو کھینچتے ہیں انکو ہڈی کو پیچھے کی طرف کو کھینچنے والے عضلات کی نسبت اپنے فعل کی سرانجام دہی میں زیادہ سہولت حاصل ہوتی ہے، اور نیز سر کو آگے کی طرف کو جانے میں ان شدید رکاوٹوں کے مقابلہ میں جو اسکو پیچھے کی طرف سرک کر کتفی شوک کے نیچے آجانے میں درپیش ہوتی ہیں بہت خفیف سی مزاحمت پیش آتی ہے۔

کندھے کے حملہ خلوع کے مشترک خصائص۔ چونکہ عضلہ دالید


(deltoid) کی گولائی کا انحصار زیادہ تر اسکے نیچے ذراعیہ کے سر کے موجود ہونے پر ہوتا ہے، اور نیز ان تمام خلوع میں (شائد زیر شوکی قسم کے خلوع کی زیادہ خفیف حالتوں کے سوا) سر کا عضلہ دالید سے بالکل کوئی تعلق نہیں رہتا اسلئے یہ عضلہ ہمیشہ کم و بیش چپٹا ہو جاتا ہے۔ یہ چپٹا پن عضلہ کی تنیدگی سے جو کسی حد تک ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عضلہ دالید کی تنیدگی کے ساتھ بازو کی تبعید بھی پائی جاتی ہے، اور یہ علامت حملہ خلوع میں ایک کافی حد تک مستقل ہوتی ہے۔ چونکہ

عضل ذوراسین بھی کم و بیش نامناسب طور پر تنیدہ ہوتا ہے اسلئے کہنی خمیدہ پائی جاتی ہے اور پیش بازو منطبع ہوتا ہے۔ خلع کی ہر ایک قسم میں بغل کے انتصابی محیط میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وقبی حفروہ کو چھوڑنے کے بعد اس کے محیط کے کسی مشہور حصے پر اگر ٹھیکر جائے۔ مزید برآں ڈوگاس (Dugas) نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ”مریض یا جراح مضرت رسیدہ جراحہ کی انگلیوں کو صحیح و سالم کندھے پر رکھ سکے درآئیکہ کہنی صدر سے مس کرتی ہو (یہ وہ حالت ہے جو اس جوڑ کی طبعی حالت میں حاصل ہوتی ہے) تو خلع موجود نہیں ہوتا، اور اگر ایسا نہ کیا جاسکے تو خلع ضرور موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ حالت جو طبعی طور پر غیر ممکن العمل ہے سوائے خلع کے اور کسی تضر سے پیدا نہیں ہو سکتی، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ صدر کے مدور ہونے کے باعث ذراعیمہ کے دونوں سروں کا بیک وقت اس سے مس کرنا ناممکن ہے، اور کندھے کے خلع میں ہڈی کا بالائی سرا مدور سے تقریباً ملا ہوتا ہے۔ اخیر میں بڑے بڑے عروق اور اعصاب کے محل پر غور کرنے سے (شکل ۶۳) یہ ظاہر ہو جائے گا کہ زیرغرابی اور زیر وقبی خلوع میں ہڈی کا سران سانہوں کو دبانے سے فرار پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ جراحہ میں تہیج اور شدید درد پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی عضلی طاقت میں ضعف نمودار ہو سکتا ہے۔ شریان اپنی لچک کی وجہ سے بالعموم بچ جاتی ہے، لیکن بیرارڈ (Bérard) نے مقدم غیر وضیعت کے ایک واقعہ کی اطلاع دی ہے جس میں بغلی شریان ذراعیمہ کے سرے سے اسبقدر مضبوط ہو گئی تھی کہ اس سے جراحہ میں گنگرین نمودار ہو گئی تھی۔ چونکہ عصب متعن (circumflex nerve) ذراعیمہ کے سرے سے قریبی تعلق رکھتا ہے اسلئے اس کو خامر خلع کی زیر وقبی (subglenoid) اور زیر شوقی (subspinous) قسموں میں ضرر پہنچنے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔

کندھے کے خلع کی ہر ایک قسم کی خصوصی تشریح - ۱۔ زیرغرابی

(subcoracoid)۔ ذراعیمہ کا مفصل سر کتف کی گردن کی مقدم سطح پر واقع ہوتا ہے اور جراحی عنق وقبی حفروہ کے مقدم لب پر تنگن ہوتی ہے۔ چنانچہ ذراعیمہ کا سرغرابی زائدہ کے مین نیچے اور اپنے طبعی محل کے آگے کی اور اندر کی طرف اور اس سے ذرا نیچے واقع ہوتا ہے۔ حدیثہ عظیم خالی وقبی کہنفہ کے بالمقابل ہوتا ہے (شکل ۶۶)۔ زیر کتفی عضل (subscapularis) ذراعیمہ کے سر کے اوپر تنیدہ ہو جاتا ہے اور بالعموم کس قدر مدیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ فوق شوقی عضل (supraspinatus)

زیر شوقى عضلہ (infraspinatus) اور عضلہ مدلمہ صغیرہ (teres minor) یا تو کھج مالتے ہیں اور یا پھٹ جاتے ہیں یا بعض اوقات حدیبہ عظیم ٹوٹ کر علحدہ ہو جاتا ہے۔ غرابی عضلہ (coraco-brachialis) اور ذوراسین (biceps) کا چھوٹا سر تن جاتے ہیں اور ذراعیہ کے سر کے اندر کی طرف واقع ہونے کی بجائے عین اسکے سامنے واقع ہوتے ہیں۔ ذوراسین کا طویل وتر نیچے کی اور باہر کی طرف کو منصرف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ پھٹ کر میزاب سے علحدہ ہو جاتا ہے مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔



شکل ۶۶۔ ذراعیہ کا زیر غرابی خلوع۔


عضلہ دالیہ (deltoid) میں تنیدگی پائی جاتی ہے بغل کے سامنے ذراعیہ کے سر سے جو ابھارتا ہے اسکا انحصار کسی مقدار گردش کی مقدار پر ہوتا ہے اگر ہڈی باہر کی طرف کو گردش کر جائے تو مر میس نمایاں ترین ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ اندر کی طرف کو گھوم جائے تو اسکا سر بغل میں نیچے اتر جاتا ہے اور جلد کی بجائے کتف سے زیادہ مس کرتا ہے چونکہ ہڈی کا سر ہمیشہ ذرا نیچے کی طرف کو چلا جاتا ہے لہذا جارحہ کے طول میں حقیقی اضافہ کا پایا جانا ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن اگر ہڈی کا سر کافی فاصلہ آگے کی اور اندر کی طرف کو چلا گیا ہو اور جارحہ حالت تبعید میں ہو تو یہ ممکن ہے کہ معمولی طریقہ پر

پیمائش کرنے سے جارحہ میں اضافہ پائے جانے کی بجائے پیمائش طبعی ہو۔ یا ظاہری قصر موجود ہو۔ جب سرو قبی کہنہ کو چھوڑ دے تو حالت تبعید میں خارجی (جانبی) قنارال کا رجحان اکرومی کے نزدیک آنے کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ وہ دو نقاط ہیں جہاں درمیان عام طور پر پیمائش کی جاتی ہے۔ لہذا بازو کے ظاہری طول کا انحصار زیادہ تر ذراعیہ کی تبعید کی مقدار یا ہڈی کے محور کے ترچھے پن پر ہوتا ہے۔

۲۔ زیر و قبی (subglenoid)۔ سراپنے طبعی مل کے نیچے اور اسکے ذرا سامنے اور

اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ سیدھا نیچے کی طرف نہیں جاسکتا کیونکہ مثلثہ الرؤس (triceps) کا طویل نیچے موجود ہوتا ہے۔ بلکہ یہ اس عضلہ اور زیر کتفی عضلہ (subscapularis) کے درمیان وقفہ میں

چلا جاتا ہے۔ ذراعیہ کے سر کی مفصلی سطح اُس مثلث رقبہ کی مقدم جانب پر ممکن ہوتی ہے جو وقبی حفرہ کے عین نیچے ہوتا ہے اور جس سے مثلثۃ الرؤس (triceps) نکلتا ہے۔ حدیبہ عظیم کا بالائی کنارہ جوڑ کے زیرین حاشیہ سے قریبی تعلق رکھتا ہے۔ زیر کتفی عضلہ (subscapularis) جو ذراعیہ کے سر کو مثبت رکھتا ہے بہت تنیدہ ہو جاتا ہے یا پھٹ بھی جاتا ہے۔ فوق شوکی (supraspinatus) اور زیر شوکی (infraspinatus) عضلات تنیدہ ہو جاتے ہیں یا پھٹ بھی جاتے ہیں۔ اور دونوں عضلات مدطجہ (teres muscles) زیادہ متاثر نہیں ہوتے تاوقتیکہ بازو کی معتد بہ تعبید موجود نہ ہو۔ غرابی عضدی عضلہ (coraco-brachialis) اور ذوراسین (biceps) تنیدہ ہوتے ہیں اور کسیدر تعبید کی وجہ سے جو بالعموم موجود ہوتی ہے، ذوراسین کا وتر خط مستقیم سے بہت کم منصرف ہوتا ہے۔



۳۔ زیر شوکی (subspinus) یا برہنوم کتف کی گردن کی موخر سطح پر ممکن ہوتا ہے اور ذراعیہ کی جراحی عنق کا میزاب وقبی حفرہ کے موخر لب کا قناظر ہوتا ہے۔ چنانچہ سر اکرومی (acromion) کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات یہ اور پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے اور

شکل ۶۷۔ ذراعیہ کا زیر شوکی خلع۔

یہ نہ کتف (dorsum scapulae) پر اور کتفی شوک کے نیچے بھی واقع ہو سکتا ہے (شکل ۶۷)۔ زیر کتفی عضلہ کا وتر کچھ کر وقبی حفرہ کے اوپر ایک طرف سے دوسری طرف تک تنجا تا ہے اور اکثر اپنی چسپیدگی سے علحدہ ہو جاتا ہے۔ ذراعیہ کا سر عضلہ دلیہ (deltoid) کے عقبی حصہ اور تحت شوکی عضلہ (infraspinatus) اور عضلہ مدطجہ وغیرہ (teres-minor) کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ موخر الذکر عضلات اس ہڈی کو ڈھکے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر تنے ہوتے ہیں۔ صدر یہ کہوہ نامناسب طور پر تنیدہ ہوتا ہے اور اسکی تنیدگی سے ذراعیہ کی اندرونی گردش اور مقدم تعبید کی جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں کسی مد تک توجیہ ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں حرکتیں کم و بیش عديم التضاد ہوتی ہیں اور

عصب منحن (cicumflex) اکثر بھٹ جاتا ہے۔

طریقہ کاوتر (Kocher's method) کی تفصیل جس سے اس ضلع کی ترجیع کیجاتی ہے مذکورہ بالا تشریحی بحث سے معلوم ہوکتی ہے۔ عام زیرغابی ضلع کو مد نظر رکھتے ہوئے طریقہ کاوتر (Kocher's method) کا طرز عمل تین مراحل پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) ذراعیہ کو باہر کی طرف بہت آہستہ آہستہ گھمایا جاتا ہے، اور اس حالت میں پیش بازو کو بازو پر مضیدہ رکھا جاتا ہے اور کہنی کو پکڑ کر دھڑکے نزدیک اور انکے ذرا آگے کی طرف کو رکھا جاتا ہے۔ اس دست وری کے ذریعہ سے اس ہڈی کے سر کو پھسلا کر اسی راستہ پر سے واپس لانے اور اسکو عضلات سے (اور بالخصوص زیر کتفی عضلہ سے) جنیں یہ پھنس جاتا ہے نکالنے کی کوشش کیجاتی ہے۔ (۲) کہنی کو عین سامنے کی طرف حرکت دیجاتی ہے اور یہ بھی بہت آہستہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس سے کیسے کے اشتقاق میں کشادہ لہی پیدا کر دیجاتی ہے اور ذراعیہ کا سر کیسے کے فتح کے قریب کر دیا جاتا ہے اور (۳) ہاتھ کو طرف مقابل کے کندھے پر دفعۃً لے جانے اور کلائی کو چھاتی پر لے آنے سے ذراعیہ کو جلدی سے اندر کی طرف کو ۸۰ درجہ کے برابر گھما دیا جاتا ہے۔ اس سے سر کیسے کی دریدگی میں سے جو ابھی تک منفتح ہی ہوتی ہے پھنس کر اندر چلا جاتا ہے۔

خلوع کی اور بالخصوص ان خلوع کی جو بہت مدت سے موجود ہوں ترجیع کرتے وقت بغلی ساختوں کو بعض اوقات شدید نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بغلی ثریان کو سب سے زیادہ کثرت سے نقصان پہنچتا ہے اور ورید کو بہت کم اور عصب کو اس سے بھی کم۔ چونکہ ثریان باہر کی طرف واقع ہوتی ہے، اسلئے اس کے ان نرم بافتوں سے جو اپنی جگہ سے ہٹتی ہوئی ہڈی کے سر کو پوشیدہ کرتی ہیں منضم ہو جانے اور اسلئے ان حصوں میں مداخلت کرتے وقت اس کے منشق ہو جانے کا امکان ہوتا ہے (شکل ۲۳ صفحہ ۲۷۶)۔

ذراعیہ کے بالائی سرے کے کسور۔ تشریحی عنق (anatomical)

(neck) کیسے کا بالائی حصہ عین تشریحی عنق سے چسپیدہ ہوتا ہے اور اس محل کا سر بعض اوقات اس رباط کی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور جزوی طور پر بروں کیسی ہوتا ہے (شکل ۲۵ صفحہ ۲۸۴)۔ کیسے کا زیرین حصہ تشریحی عنق کے ذرائع چسپیدہ ہوتا ہے اور اسلئے یہ ضروری ہے کہ اگر ضرر اس محل پر واقع ہو تو وہ ضرور دروں کیسی ہوگا۔ جس خط پر کیسے کا زیرین حصہ ذراعیہ سے چسپیدہ ہوتا ہے

اس سے ریشہ جات معکوس ہو کر اوپر کی طرف مفصلی غضروف کے جو اس ہڈی کے سر پر ہوتی ہے حاشیہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ان ریشہ جات میں انشقاق نہ واقع ہوا ہو تو ان سے ٹکڑوں میں تعلق قائم رہتا ہے۔

اوپر کا ٹکڑا جو چھٹا سا درجہ کثیف ہوتا ہے اسفنجی ہڈی کے اس وسیع رقبہ میں جو نیچے کے ٹکڑے کے اوپر کی سطح پر ظاہر ہو جاتا ہے باسانی منغز ہو جاتا ہے۔ اس انغراز کے واقع ہونے پر عضلہ دالبیہ میں کسیتدر چٹا پن واقع ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے سر کے العباد کم ہو جاتے ہیں اور اسلئے یہ عضلہ دالبیہ میں ابھار پیدا نہیں کر سکتا۔ مگر مطلب میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسکی تعویض درون مفصلی انصباب سے ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ نظر نہیں آتا۔ اگر انغراز واقع نہ ہو تو اوپر کا چھوٹا سا ٹکڑا اکثر اپنے اوپر گھوم جاتا ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر بعض اوقات بغل میں چلا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا قبو میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس کسر میں انغراز ایک مفید چیز ہے۔ اسی لئے تکتک حاصل کرنے کے لئے جس سے انغراز کے زائل ہو جانے کا امکان ہوتا ہے کوئی کوشش نہ کرنا چاہئے بلکہ تشخیص کی توضیح کو لاشعاعوں کے امتحان پر چھوڑ دینا چاہئے۔

۲۔ اوپر کے برالہ کی علیحدگی۔ اس برالہ کا زیریں کنارہ اس خط سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حدیبہ عظیم کے قاعدہ پر ہڈی کو کاٹتا ہوا اور تشریحی اور جراحی عقنوں کے درمیان واقع ہو (دیکھو شکل ۶۵ صفحہ 284)۔ آری کی مستعرض کاٹ جو اس ہڈی کے سب سے چوڑے حصہ میں سے گزرتی ہو اسکے محل کو کافی حد تک ظاہر کرتی ہے۔ اس برالہ کے تینوں ترکیبی نوات (سرا در حدیبہ جات عظیم و صغیر) پانچویں سال کے قریب متحد ہوتے ہیں اور یہ تمام تودہ پوری سے بیسویں سال کے قریب قریب ملتا ہے۔ اوپر کا ٹکڑا ان عضلات کے ذریعہ سے جو حدیبہ عظیم سے چسپیدہ ہوتے ہیں باہر کی طرف کو مکمل جاتا ہے اور باہر کی طرف کو ہی گھوم جاتا ہے اور نیچے کا ٹکڑا ان عضلات کے ذریعہ سے جو ذراسینی میزاب میں چسپیدہ ہوتے ہیں اندر کی طرف کو کھچ جاتا ہے۔ چنانچہ نیچے کے ٹکڑے کے اوپر کے صاف سرے کا کچھ حصہ خرابی زائیدہ کے نیچے عام طود پر ایک نمایاں مرمیہ کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جابرہ کا محور متغیر ہو جائیگا اور کہنی پہلو سے دراز رہیگی علاوہ ازیں تمام غیر وضعیت اکثر مقدم و مخریخ میں بھی ہوتی ہے اور نیچے کا ٹکڑا آگے کی طرف کو نکلا ہوتا ہے۔ چوٹ کے مقام پر ہڈی کی دونوں سطحیں ایک دوسری سے اتنی دور ہوتی ہیں کہ انکا تراکب مشکل ہی سے ممکن ہوتا ہے۔

۳۔ جراحی عنق۔ جراحی عنق حدیبہ جات کے قاعدوں اور عضلہ عریضہ نظریہ
(latissimus dorsi) اور عضلہ مدللجہ کبیرہ (teres major) کے منہاؤں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ یہاں جو کسر واقع ہوتا ہے وہ بالعموم مستعرض ہوتا ہے، اگرچہ ہڈی کی ایک گنج اکثر پوری پر سے اوپر کو بھی اٹھی ہوتی ہے۔ کسر کا خط ان عضلات کے منہاؤں سے نیچے ہوتا ہے جو حدیبوں سے چپکے ہوتے ہیں اور بالعموم یہ ان سے اوپر ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ عضلہ صدر کبیرہ، عضلہ عریضہ نظریہ، اور عضلہ مدللجہ کبیرہ کے منہاؤں پر سے گزرتا ہے جو ذوراسینی میزائٹ واقع ہوتے ہیں۔ ٹکڑوں میں جو عام غیر وضعیت پائی جاتی ہے مندرجہ ذیل ہے: ۱۔ اوپر کا ٹکڑا بالعموم باہر کی طرف کو کھل جاتا ہے اور فوق شوکی اور تحت شوکی عضلات اور عضلہ مدللجہ منفرہ اسکو باہر کی طرف کو کھلا دیتے ہیں لیکن بعض اوقات اس میں زیادہ غیر وضعیت نہیں پائی جاتی نیچے کے ٹکڑے کے اوپر کے سرے کو عضلہ دالیہ، ذوراسین، غرابی عضلہ اور مثلثۃ الرؤس اور بکتر کو کھینچ لیتے ہیں اور جو عضلات ذوراسینی میزاب پر چسپیدہ ہوتے ہیں وہ اسکو اندر کی طرف کو کھینچ لیتے ہیں اور عضلہ صدر کبیرہ اسکو آگے کی طرف کو کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ اس سے بغل میں ایک مریہ بجاتا ہے اور نیچے کے ٹکڑے کا محور بھی متغیر ہو جاتا ہے جس سے اسکا رخ اوپر کی اور اندر کی طرف ہو جاتا ہے اور کہنی پہلو سے مبعد ہوتی ہے۔ جب تک ذراعیہ کا سر و قبی کہنہ میں رہتا ہے کندھے کی چوٹی میں کوئی چٹا بن نہیں پایا جاتا جیسا کہ ضلع میں دیکھنے میں آتا ہے۔ بہر کیف اس سے ایک یا دو انچ نیچے ایک نشیب دکھائی دیتا ہے تا وقتیکہ وہ نرفی العصاب سے پکڑ نہ ہو جائے۔ بازو میں ایک انچ یا اس سے زائد قصر واقع ہو جاتا ہے نیچے کے ٹکڑے کے اوپر کے سرے سے عضلہ عصاب کے دب جانے سے بعض اوقات شدید درد پیدا ہو جاتا ہے یا انکو شدید قسم کا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ عصب منحن (circumflex) کو جو کسر کے لیول پر قاعدہ کے گرد ہو کر گزرتا ہے نہایت کثرت سے ضرر پہنچتا ہے۔ شریان اور ورید کو بھی مضرت پہنچ جاتی ہے گو اعصاب کے مقابلہ میں ایسا کم ہوتا ہے۔

297

مذکورہ بالا غیر وضعیت ہمیشہ موجود نہیں ہوتی اور ایسے واقعات بھی درج ہیں جن میں نیچے کے ٹکڑے کے اوپر کا سرا (۱) ابتدائی تیبی طاقت سے آگے کی طرف کو ہٹ گیا تھا یا (ج) عملی طور پر مطلقاً ٹلا ہی نہیں تھا۔

کندھے کے جوڑ پر سے ہتر۔ عضلہ دالیہ سے ایک معیاری ہتری دامن

طیار ہوتا ہے۔ اس کی خونی اور عصبی رسد موخر منحن (posterior circumflex) عروق اور منحن (circumflex) عصب کی وجہ سے جن کو کیسہ کے کاٹنے سے پیشتر ذراعہ کے بالائی سرے کی موخر جانب پر سے دامن اٹھاتے وقت بچانا ضروری ہوتا ہے محفوظ رہتی ہے۔ غرابی زائدہ اس عضل کے مقدم کنارہ کے نیچے اور بغلی عروق کے خط کے ساتھ ہی باہر کی طرف واقع ہوتا ہے طریقہ سپنس (Spence's method) کے مطابق شکاف غرابی زائدہ کے عین باہر کی طرف سے لے کر عضل دالیہ کو کاٹنا ہوا اس کی کور کے متوازی دیا جاتا ہے اور پھر اس کو اس کے منتہی سے اوپر مستعرض رخ میں عضل دالیہ پر سے بازو کے موخر اندرونی کنارہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مقام تک یہ تمام شکاف بے روک ٹوک ہڈی تک گہرا دیا جاتا ہے۔ مگر جو جیرا اس شکاف کو مذکورہ موخر اندرونی کنارہ سے لے کر اس کے انتہائی حصہ سے ملتا ہے، یعنی شکاف کا وہ حصہ جو عروق کے خط کو قطع کرتا ہوا گزرتا ہے، صرف جلد اور زیر جلدی بافت ہی میں سے دیا جاتا ہے۔ اب مفصل کے کیسہ کو حدیبہ جات پر سے چاک کر کے سر کو مخلوع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مددگار اندرونی دامن کو جو ابھی تک شکاف یافتہ نہیں ہوتا اس طرح پکڑ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کے عروق قابو میں آجائیں اور اس اثنا میں جراح شکاف کے اٹھلے حصہ کو گہرا کر کے جارحہ کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عروق فوقانی عمیق (superior profunda) (بازو کی عمیق ثریان) کے مبداء سے نیچے کاٹ دئے جاتے ہیں۔ عضل صدر کبیرہ کا منتہی اس شکاف سے کٹ جاتا ہے جو عضل دالیہ کے مقدم کنارہ کے ساتھ ساتھ دیا گیا تھا اور علی ہذا عضلہ نصفہ لمبرہ (latissimus dorsi) اور عضلہ مدبلج کبیرہ (teres major) بھی کٹ جاتے ہیں۔ عضلہ مدبلج صغیرہ، زیر شوکی عضلہ، فوق شوکی عضلہ اور زیر کتفی عضلہ کیسہ سے منقسم ہوتے ہیں، اور ہڈی کے سر کو علیحدہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی کاٹ دئے جاتے ہیں۔ کیسہ کا زیرین حصہ اور ششہ الرؤس کا طویل سر ذراعہ کو عقب سے بالائی زخم میں سے باہر نکالنے کے بعد کاٹے جاتے ہیں۔

کندہ کے جوڑے مرض میں ذراعہ کے سر کا استیصال کرنے کے لئے

شکاف ذوراسین کے فوق و قبی سر کے ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے اور شکاف کو اوپر گہرا کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا وتر جوڑ میں معرا ہو جاتا ہے۔ بازو کو اندر کی طرف گھما کر اور ذوراسین کے وتر کو محفوظ کر کے فوق شوکی عضلہ، زیر شوکی عضلہ اور عضلہ مدبلج صغیرہ کے منتہاؤں کو حدیبہ عظیم سے زیر گرد عظمی

طور پر علحدہ کر دیا جاتا ہے اور پھر بازو کو باہر کی طرف گھما کر زیر کتفی عضلہ کی چسپیدگی کو مدیہٴ صغیر سے اسی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب ہڈی کا سر مخلوع کیا جاسکتا ہے اور آری سے کاٹا جاسکتا ہے و قبی کہنفہ کو مجرف (curette) سے کھرچ دیا جاتا ہے اور مرض زدہ زلابی غشا کاٹ کر علحدہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیسہ کی اس جھری کو (جس سے ان عضلات کی چسپیدگی باقی رہتی ہے) ٹانگے لگا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ ذراعیمہ کے سرکا استیصال کرتے وقت یہ ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ ذراعیمہ کی پوری میں جو نمو طولا پیدا ہوتا ہے اس کا ۷ حصہ بالائی ربانی خط پر واقع ہوتا ہے۔ لہذا ۱۹ یا ۲۰ سال کی عمر سے پیشتر واقعی طور پر استیصال کرنے پر کھرچنے کو ترجیح دینا چاہئے۔

بازو از دہم

بازو

(ARM)

299

بازو یا بالائی بازو (upper arm) یا عضدی خط وہ حصہ تصور کیا جاتا ہے جو بغل سے لے کر کہنی تک پھیلا ہے۔

سطحی تشریح۔ عورتوں اور موٹے اشخاص میں بازو کا خاکہ مستدیر اور کافی باقاعدہ ہوتا ہے۔ قوی العضلات اشخاص میں یہ اتنا باقاعدہ نہیں ہوتا بلکہ کسی حد تک اسطوانہ کی شکل کا ہوتا ہے اور ایک طرف سے دوسری کو چپٹا اور آگے کی طرف کو غیر متناسب طور پر ابھرا ہوتا ہے (عضلہ ذوراسین)۔ عضلہ ذوراسین کا خاکہ نمایاں ہوتا ہے اور اس کی ہر ایک جانب پر ایک میزب پایا جاتا ہے۔ دونوں میزبوں میں سے اندرونی کہیں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ کہنی کے خم سے لے کر بغل تک جاتا ہے اور ورید باسلیق (basilic vein) اور عضدی شریان (brachial artery) کے محل کو ظاہر کرتا ہے۔ بیرونی میزب اتھلا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف عضلہ دالیہ کے منتہی تک جا کر ختم ہو جاتا ہے اور یہاں تک یہ قیفالی ورید (cephalic vein) کے محل کو ظاہر کرتا ہے۔

عضلہ دالیہ کا منتہی ایک مشہور امتیازی نشان ہے اور آسانی سے تمیز کیا جاسکتا ہے۔ یہ ذراعہ کی پوری کی بہت صحیح صحیح تنصیف کرتا ہے اور غرابی عضدی عضلہ کے منتہی کے لیول پر واقع

ہوتا ہے۔ نیز یہ عضدی عضلہ (brachialis) کی اوپر کی حد کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ مزید برآں یہ ان مقامات کا متناظر ہوتا ہے جہاں ذراعیہ کی پوری کا استوانہ نما حصہ منشور نما حصہ سے ملتا ہے اور جہاں مغذی شریان (nutrient artery) داخل ہوتی ہے۔ اور نیز یہ اس لیول کا متناظر بھی ہوتا ہے جس پر بازو کا عضلی مرغولی (musculo-spiral) عصب اور اسکی شریان عمیق (profunda artery) ہڈی کی عقبی جانب پر سے گزرتی ہے۔

300

جب بازو حالت بسط اور حالت بطح میں ہوتا ہے تو عضدی شریان اس خط کی متناظر ہوتی ہے جو ذرا سین کے اندرونی کنارہ کے ساتھ ساتھ بغل کے مخرج (اس کے وسطی اور مقدم ایک تہائی حصوں کے مقام اتصال) سے لیکر کہنی کے خم کے وسط تک کھینچا جائے۔ شریان سطحی ہوتی ہے اور اپنے تمام طول میں محسوس کی جاسکتی ہے۔ اسکا بالائی دو تہائی حصہ ذراعیہ کی پوری کے اندر کی جانب واقع ہوتا ہے اور اسلئے اسکو ہڈی پر باہر کے اور ذرا پیچھے کے رخ میں مضبوط کیا جاسکتا ہے۔ اس کے زیرین ایک تہائی حصہ کے پیچھے ذراعیہ واقع ہوتی ہے اور مضبوط کو موثر بنانے کے لئے اسکارخ پیچھے کی طرف کو ہونا چاہئے۔


فوقانی زندگی مجانب (superior ulnar collateral) (تحتانی عمیق inferior profunda) اس خط سے ظاہر کی جاسکتی ہے جو ذراعیہ کی پوری کی اندر کی طرف کے وسطی حصہ سے لیکر اندرونی یعنی وسطانی سرفقدال کی عقبی جانب تک کھینچا جائے یعنی شریان (nutrient artery) ہڈی میں اسکی اندرونی جانب پر عضلہ دالیہ کے منتہی کے سامنے داخل ہوتی ہے اور تحتانی زندگی مجانب (inferior ulnar collateral) (متفہم کیز: anastomotica magna) عرق کہنی کے خم سے تقریباً دو انچ اوپر نکلتا ہے۔

زندگی عصب (ulnar nerve) پہلے عضدی شریان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور پھر اس خط کے ساتھ ساتھ جو غزائی عضدی عضلہ کے منتہی کے لیول کے قریب عرق مذکور کی اندرونی جانب سے اندرونی قندال اور تڑج (olecranon) کے درمیانی وقفہ تک کھینچا جائے۔ کلائی کے داخل یا وسطانی جلدی عصب (medial cutaneous nerve) کا زیادہ تر حصہ اندرونی دوراسینی میزب کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اور عضلی جلدی (musculo-cutaneous) عصب کہنی کے خم میں ذرا سین کے وتر کے بیرونی کنارہ پر بیرونی دوراسینی میزب یا تجویف میں سطحی ہو جاتا ہے۔ اس میزب کی گہرائی میں دو عصب پک جاتے

ہیں۔ عضلی جلدی (musculo-cutaneous) اور عضلی مرغولی (musculo-spiral) (کعبی radial: پہلا عصب راسین کے نیچے نکلتا ہے اور دوسرا عضدی کعبی عضلا (brachio-radialis) کے قریبی حصہ کے نیچے واقع ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے پوشیدہ ہوتا ہے۔

301

بازو کی جلد کا خاکہ اس کے سانس کی طرف اور جانبین پر باریک اور صاف ہوتی ہے۔ یہ بہت حرکت پذیر ہوتی ہے اور عمیق حصوں سے ایک بہت نرم زیر جلدی ردا کے ذریعہ سے ڈھیلے طور پر چسپیدہ ہوتی ہے۔ بازو کے مدور بتور میں جلد اپنے ڈھیلے پن کی وجہ سے دستی جز ہی سے ایک کافی حد تک کھچ جاتی ہے ٹیگلیاکوزی (Tagliacozzi) کے عمل میں ناک کو بار دیگر طیار کرنے کے لئے ذوراسین کی مقدم سطح کے اوپر کی جلد ہی سے دامن طیار کیا جاتا ہے۔ اس



شکل ۶۸۔ بازو کے وسط میں سے تعرض تراش۔

(برڈن : Braune)

(۱) ذوراسین - (ب) غواہی عضدی عضلا۔

(ج) عضدی عضلا (مقدم) - (د) مثلثہ الزوگ

۱۔ عضدی شریان۔ ۲۔ عصب وسطی۔ عصب ندی

۳۔ عضلی مرغولی (کعبی) عصب۔

حصہ کی جلد کے پتلا اور بالوں سے معرا ہونے کی وجہ سے یہ اس طریق کار کے لئے بہت موزوں ہے چونکہ بازو کی جلد کی چسپیدگیاں زیادہ نہیں ہوتیں اس لئے یہ دریدہ اور کوفتہ زخموں میں آسانی سے پھٹ اور اتو جاتی ہے۔ بعض اوقات ان ضررات میں جلد کے بڑے بڑے دامن ضرب کی شدت سے طلوعہ ہو جاتے ہیں۔ زیر جلدی بافتوں کے

ڈھیلے پن کی وجہ سے الہامی اعمال کے پھیلنے میں بہت مدد ملتی ہے اور اس کے مقابلہ پتلا ہونے کی وجہ سے کدم (ecchymosis) ابتدا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔

یہ جارح ایک میٹ ردا سے جو عضدی صفاق (brachial aponeurosis)

سے موسوم ہے اس طرح ڈھکا ہوتا ہے جیسا کہ آستین سے۔ یہ ردا طرفین پر دوہین عضلی فاسلات سے

جو ذراعیہ کے بیرونی اور اندرونی حاشیوں سے چسپیدہ ہوتے ہیں ثبت ہوتی ہے۔ اور یہ فاصلات ایک طرف عضلہ دالیه کے انتہی سے لیکر بیرونی یا جانبی سرقندال تک اور دوسری طرف غائبی عضدی عضلہ کے انتہی سے لیکر اندرونی سرقندال تک پھیلے ہوتے ہیں۔ اس صفاق اور اسکے فاصلات سے بازو دو خانوں میں منقسم ہو جاتا ہے جو بازو کی مستعرض تراش میں بخوبی نظر آتے ہیں (شکل ۶۸)۔ یہ خانہ الہتانی اور زنی انصبابات کو محدود رکھتے ہیں۔ ان دونوں خانوں میں سے مقدم خانہ کے حدود کم مستحکم ہوتے ہیں کیونکہ جو ردا ذوراسین کی پوشش کا کام دیتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے۔ انصبابات ایک خانہ میں سے دوسرے خانہ میں ان ساختوں کے ساتھ ساتھ چلکر جوین عضلی فاصلات کو منتقب کر کے دونوں فضاؤں کے لئے مشترک ہو جاتی ہیں، آسانی پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ ساختیں عضلی مرغولی اور زندی اعصاب، شریان عمیق (profunda artery) اور فوقانی اور تحتانی زندی مجانبات (superior and inferior ulnar collaterals) ہیں۔ بڑی بڑی ساختیں جو عضدی صفاق کو منتقب کرتی ہیں یہ ہیں:۔ ورید باسلیق (basilic vein) جو بازو کے وسط سے ذرا نیچے ہوتی ہے۔ پیش بازو کا داخلی جلدی عصب جو بازو کے وسط کے قریب ہوتا ہے اور عضلی جلدی عصب کی خارجی جلدی شاخ جو کہنی پر ہوتی ہے۔ قبل الذکر دونوں ساختیں اندرونی ذوراسینی میزاب میں ہوتی ہیں اور موخر الذکر بیرونی میں ہوتی ہے۔

عضدی عضلہ (brachialis) ہڈی سے مضبوطی سے چسپیدہ ہوتا ہے اور ذوراسین (biceps) آزاد ہوتا ہے۔ لہذا جب ان عضلات کو کاٹا جاتا ہے (جیسا کہ بتربیں) تو موخر الذکر عضلہ میں قبل الذکر کی نسبت معتد بہ بازکشی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا مدور بتربہ سرانجام میٹے وقت یہ مناسب ہوتا ہے کہ پہلے ذوراسین کو کاٹ دیا جائے اور جب یہ بازکشیہ ہو جائے تو پھر عضدی عضلہ مقدم کو کاٹا جائے۔

عضدی شریان (brachial artery)۔ یہ عرق عضلہ کبجیری (teres major)

کے زیرین کنارے پر بغلی شریان کے بلا واسطہ تسلسل کی شکل میں شروع ہوتا ہے اور پیش غرقہ خرو (antecubital fossa) میں کعبہ کی عنق کے مقابل کعبری اور زندی شریانوں میں منقسم ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسکے خط کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے (دیکھو صفحہ 299)۔ قوی العضلات اشخاص میں یہ شریان بعض اوقات ایک معتد بہ مدتک ذوراسین عضلات سے اور کسی حد تک

غرابی عضدی عضلہ سے مترکب ہوتی ہے۔ دوسری ساختوں کے مقابل میں اس کا محل شکل ۶۸ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ بازو کے وسط میں عصب وسطی (median nerve) اس کے تقریباً عین سامنے ہوتا ہے، اور ذرا سین اس پر مترکب ہوتا ہے اور مثلثہ الرؤس اسکو پیچھے سے سہارا دیتا ہے۔ جب جراح کو یہاں اس شریان کو مس کرنا مقصود ہو تو موخر الذکر امر اس کے لئے دلچسپی سے خالی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر بیجا طور پر نیچے کوئی گدی رکھی ہو یا سہارا دیا ہو تو وہ مثلثہ الرؤس کو اوپر کی طرف کو دھکیل دے گا جس سے تشریحی تعلقات میں خلل واقع ہو جائے گا اور یہ عرق مخفی ہو جائے گا۔ اس قسم کی کوئی گدی استعمال نہ کرنا چاہئے بلکہ بازو کو صرف کندھے اور اس گدی کے سہارے رہنے دینا چاہئے جو کہنی کے نیچے رکھی گئی ہو۔

303

عصب وسطی اس شریان کی بیرونی اور مقدم جانب پر سے نیچے کی طرف کو غرابی عضدی عضلہ کے منہی تک جاتا ہے اور یہاں یہ اس کے عین آگے واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کے اندر کی جانب کو آجاتا ہے اور اٹھایا تعلق آگے بڑھ کر بھی قائم رہتا ہے۔ لہذا عضدی شریان کے مضغط میں عصب وسطی شکل سے ہی بچ سکتا ہے۔ داخلی جلدی عصب اس عرق کے سامنے یا اس کی اندر کی طرف کے قریب ہی واقع ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ ردا کو منتقب کر دیتا ہے۔ زندگی عصب غرابی عضدی عضلہ کے منہی تک اس شریان کے اندر کی طرف واقع ہوتا ہے اور اس عرق کے مقام ابتدا کے پیچھے عضلی مرغوی عصب موجود ہوتا ہے۔ رفیق و ریدوں میں سے ہر ایک اس شریان کی ایک ایک طرف واقع ہوتی ہے اور یہ ایک دوسری سے چھوٹی چھوٹی مستعرض شاخوں سے مربوط ہوتی ہیں اور یہ شاخیں اس عرق کو عبور کرتی ہیں اور اس پر عملیہ کرتے وقت بعض وقتاً موجب تکلیف ہوتی ہیں۔ شلٹ وسطی پر شریان کو باندھنے کے لئے جو شکافات دئے جاتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ اندر کی طرف واقع ہوں تو باسلیق و رید کے کٹ جانے کا امکان ہوتا ہے یا زندگی عصب مسرا ہو جاتا ہے جو غلطی سے وسطی تصور کر لیا جاتا ہے۔ بہترین شکاف وہ ہے جو انتصابی رخ میں نیچے کی طرف کو اس خط پر دیا جائے جو غرابی زائدہ سے لیکر پیش مرفعی حفرہ کے نقطہ وسطی تک اس حالت میں کھینچا گیا ہو جبکہ بازو دھڑ سے زاویہ قائمہ پر ہو اور ہاتھ جت حالت میں ہو اور تکیہ صرف کہنی کے نیچے ہی رکھا ہو۔ اس طریقہ سے رسائی حاصل کرنے سے عملیہ کن کے سامنے ذرا سین کی اندرونی کورا اور عصب وسطی آجائے گا اور انکو باہر کی طرف کو ہٹانے سے اسکو دوسری ساختوں کو ہلانے کے بغیر یہ شریان مل جائے گی۔ جہاں تک زندہ مضمی کا

تعلق ہے عصب وسطیٰ کو ماتحت شریان سے اکثر ایک نمایاں نبضان پہنچتا رہتا ہے اور بعض اوقات اسی کو بڑی شریان تصور کر لیا گیا ہے۔

عضدی شریان کی ترتیب میں جو غیر طبعی حالتیں پائی جاتی

ہیں وہ اس قدر کثیر الوجود ہیں (۱۲ تا ۱۵ فیصدی بازوؤں میں پائی جاتی ہیں) کہ وہ جراحی نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ ایک بجانب شاخ (عرق خالصی: vas aberrans) کا پایا جانا غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ شاخ عضدی شریان کے بالائی حصہ یا بغلی شریان کے نچرین حصہ سے نکلتی ہے اور بازو میں نیچے تک عصب وسطیٰ سے اوپری جاتی ہے اور کبھی شریان میں یا بعض اوقات زندگی میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات عضدی کی جگہ عرق خالصی (vas aberrans) ہی موجود ہوتا ہے۔ اور اس حالت میں شریان عصب وسطیٰ سے عمیق ہونے کی بجائے اس سے اوپری پائی جلتے گی اور عمیق (profunda) یا گہری شریان اور فوقانی زندگی بجانب (superior ulnar collateral) شریان اصلی عضدی شریان کے بقیہ حصہ سے نکلیں گی۔ یہ اوپری عضدی عرق بعض اوقات فوق قندالی زائیدہ (supracondyloid process) کے نیچے سے گزرتا ہے اور یہ زائیدہ ہڈی کا ایک خطاف دار مرید ہے جو گاہے گاہے ذراعہ سے اس کے اندرونی سرفقندال سے ۲ انچ اوپر پیدا ہوتا ہے۔ یہ عرق عضدی عضلہ کے مبداء کے اندرونی ریشوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

ایک اور اختلافی حالت ہے جس میں ایک شریان کی بجائے دو شریانیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں عضدی شریان فوق مرفقی حفرہ میں منقسم ہونے کی بجائے بازو کے بالائی حصہ ہی میں تقسیم ہو جاتی ہے اور جو عروق دکھائی دیتے ہیں وہ درحقیقت کبھی اور زندگی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شریان عضدی اپنے طبعی محل پر منقسم ہوتی ہے اور دوسرا عرق بین العظامی ہوتا ہے جو بازو کے نچرین حصہ میں شریان زندگی سے نکلنے کے بجائے بازو کے بالائی حصہ میں عضدی ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے واقعات میں جو عروق نظر آتے ہیں انہیں ایک طبعی عضدی ہوتا ہے اور ایک عرق خالصی (vas aberrans)۔ اگر عملیہ بندش کے لئے سرانجام دیا جا رہا ہو تو دونوں شریانوں کو باندھنا ضروری ہوتا ہے۔

عضلی مرغولی (musculo-spiral) (کعبی: radial) عصب کو ہڈی سے

جس کو یہ عضلہ دالیہ کے منہی پر عبور کرتا ہے قریبی تماس رکھنے کی وجہ سے اکثر ضرر پہنچ جاتا ہے اور نیشق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شدید کوفتگیوں میں لات اور بول لنگنے اور گھوڑوں کے کاٹنے سے اور نیز ذراعیمہ کی پوری کے کسور میں اسے بہت کثرت سے نقصان پہنچ چکا ہے۔ یا الیا ہوتا ہے کہ یہ عصب کسر کے وقت صحیح وسالم ہوتا ہے اور بعد میں دُشبد (callus) سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ حصے جکو یہ رسد پہنچاتا ہے مشلول ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی قید سے اسکو آزاد کرنے کے لئے طولانی شکاف موزوں ہوتا ہے، جو بازو کی پشت پر اسکے عین وسط میں دیا جاتا ہے جبکہ کہنی خمیدہ ہو اور کلائی چھاتی پر رکھی ہو۔ اس قسم کے شکاف کو گہرا کرنے سے یہ عصب مشکوٰۃ الرؤس کے اندرونی اور طویل سروں کے درمیان عضلی مرغوی میزاب میں فوقانی عریق (superior profunda) ثریان کے ساتھ پایا جائے گا۔ کئی ایک مثالوں میں یہ عصب ان آدھیوں میں سر کے دباؤ سے مشلول ہو گیا ہے جو بازو کو مکمل انبطاح اور تبعید کی حالت میں سر کے نیچے رکھ کر سو گئے تھے۔ غراب ساخت کے عکازوں کے دباؤ سے بھی اسکو اکثر نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 'عکازی شلل' (crutch paralysis) میں یہ عصب نہایت کثرت سے ماؤف ہوتا ہے، اور بلحاظ کثرت ابتلا کے جوتنا اسکے بعد ماؤف ہوتا ہے وہ زندگی ہے۔

305

عضلی مرغوی (musculo-spiral) شلل سے جو مظاہر پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر صفحہ 370 پر کیا گیا ہے۔

ذراعیمہ کی پوری کا کسر بعض اوقات بلا واسطہ ضرب سے پیدا ہوتا ہے

گر اس کی پوری بالواسطہ ضرب سے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تمام ہڈیوں میں سے ذراعیمہ ہی ہے جو عضلی فصل سے نہایت کثرت سے ٹوٹتی ہے۔ موخر الذکر کی مثالوں کے طور پر گیند یا بمب کا پھینکنا یا کرنے سے بچنے کے لئے کسی سہارے کا پکڑنا اور قوت کی دو آزمائش جو کلائی مڑاؤنے (wrist-turning) کے نام سے موسوم ہے پیش کی جاسکتی ہے۔ جب یہ ہڈی عضلہ دالیہ کے منہی سے اوپر ٹوٹتی ہے تو نیچے کا کمرہ ذوراسین، مشنتہ الرؤس اور عضلہ دالیہ سے اوپر کی طرف اور موخر الذکر سے باہر کی طرف کو کھینچ جاتا ہے، اور اوپر کا کمرہ ان عضلات سے جو ذوراسینی میزاب میں چسپیدہ ہوتے ہیں اندر کی طرف کو کھینچ جاتا ہے۔ جب کسر عضلہ دالیہ کے منہی سے نیچے واقع ہو تو یہ عضلہ اوپر کے کمرے کے نیچے کے سرے کو باہر کی طرف کو کھینچ لیتا ہے، اور

نیچے کا ٹکڑا ذوراسین اور مثلثۃ الرؤس سے اس کے اندر کی طرف سے اوپر کو کھینچا جاتا ہے۔ بہر حال قاعدہ یہ ہے کہ بدشکلی کا انحصار کسی عضل فعل کی نسبت کا بہرظم قوت کی نوعیت اور اس کے رخ پر کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جن بدوضعیوں کا ذکر ابھی کیا گیا ہے یہ بھی مشاہدہ میں آسکتی ہیں مگر عضلہ دالیہ کے منتہی کو محل کسر سے جو علاقہ ہوتا ہے اس سے یہ بالعموم کوئی تعلق نہیں کہتیں۔ بازو کے وزن کی وجہ سے قصر شاذ و نادار ہی ۳ انچ سے زائد ہوتا ہے۔

ہڈی کے کسر کے ساتھ اس کے ارد گرد کے عضلات کا معکوس انقباض

306

ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک معکوس ہے جو ان حسی اعصاب کو ضرر پہنچنے سے ظہور میں آتا ہے جو ضرر رسیدہ ہڈی، گرد غلط اور عضلات میں ختم ہوتے ہیں۔ اور شکستہ سروں کے ایک دوسرے پر چڑھ جانے کی یہی وجہ ہے۔ یہ معکوس انقباض معدم حس کے زیر اثر غائب ہو جاتا ہے اور اقتراب (apposition) آسان ہو جاتا ہے۔

عدم اتحاد ذراعیمہ کے کسر میں دوسری ہڈیوں کی نسبت زیادہ کثرت سے پایا

جاتا ہے۔ عدم اتحاد اور اتحاد آجل کا انحصار شریان مغذی اور محل کسر کے درمیان تعلق پر نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر تثبیت حاصل کرنے میں دقت پیش آنے پر ہوتا ہے۔ اندام کے لئے جس آرام کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف ان تمام عضلات کو جو ذراعیمہ کے کسی حصہ پر بھی فعل کرتے ہیں محل کسر میں خلل انداز ہونے سے باز رکھنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا کندھے کہنی کلائی اور ہاتھ کے جوڑوں کو غیر متحرک بنانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو عضلات ذراعیمہ سے چسپیدہ ہوتے ہیں وہ ان تمام جوڑوں پر فعل کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ دوسرے جوڑوں کی تثبیت آسان ہوتی ہے مگر کندھے کے جوڑے کی تثبیت مکمل طور پر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ شکستہ سروں کے درمیان عضلہ بافت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس ہڈی کی پوری منفعیم عضلہ ریشیوں سے گھری ہوتی ہے اور ان سے قریبی تعلق رہتا ہے۔ چنانچہ ترجیحے کسر میں ہڈی کے ٹکڑے کا سرا بعض اوقات عضلہ عضلہ میں گھس جاتا ہے اور دوسرا سرا مثلثۃ الرؤس کے جسم میں جا بٹھکتا ہے اور اس طرح ہڈیوں میں تماس واقع نہیں ہو سکتا۔

ذراعیمہ کی بالیدگی۔ سترھویں یا اٹھارویں سال کے قریب بھدی بر بالی

خط پر بالیدگی بند ہو جاتی ہے اور ٹریپین یا بعدی بر بال پوری سے متحد ہو جاتا ہے۔ قربی یا بالائی بر بالی خط پر بالیدگی اسکے بہت عرصہ بعد ختم ہوتی ہے اور قربی بر بال پوری کے ساتھ اکیسویں بائیسویں سال کے قریب متحد ہوتا ہے۔ بر بالی خطوط کے بند ہو جانے کے بعد طول میں جو بالیدگی واقع ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈگبائی (Digby) نے اندازہ کیا ہے کہ طول میں جو بالیدگی واقع ہوتی ہے وہ قربی خط پر بعدی خط کی نسبت چار گنی سرعت سے واقع ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی بڑھتے ہوئے بچے میں قربی خط کو ضرر پہنچ جائے تو بعدی خط کو اسی قسم کا ضرر پہنچنے کے مقابلہ میں قصہ بہت زیادہ ہوگا۔

باسینزیم

کہنی کا خط

سطحی تشریح - کہنی کی مقدم سطح پر تین عضلات ارتقاعات دکھائی دیتے ہیں۔

ایک اوپر کی طرف اور مرکز میں ہوتا ہے جو ذوراسین اور اسکے وتر کا متناظر ہوتا ہے اور دو نیچے کی طرف اور جانبین پر ہوتے ہیں انیس سے باہر کی طرف کا عضدی کجری عضلہ (brachio-radialis) اور مشترک باسط تودہ کا اور اندرونی عضلہ کا بہ مد مجہ (pronator teres) اور خم کن عضلات کے مشترک گروہ کا متناظر ہوتا ہے۔ یہ ارتقاعات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ ذوراسین اور اسکے وتر کی دونوں طرف دو میزاب بنجاتے ہیں۔ یہ میزاب اوپر کی طرف منفرج ہو جاتے ہیں اور بیرونی اور اندرونی ذوراسینی میزابوں سے مل جاتے ہیں اور نیچے کی طرف یہ اس وتر کے نمایاں تریں حصہ پر سے ایک دوسرے سے متحد ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح ان سے وی (۷) کی شکل کا ایک انحناف پیدا ہو جاتا ہے (کسل ۶۹)۔ ان انحناف کی وضاحت کا انحصار افراد کی لاغری اور انکے عضلی نمبر پر ہوتا ہے۔ دونوں میزابوں میں سے اندر کے میزاب میں عصب وسطی، شریان عضدی، اور اسکی رفیق وریدیں پائی جاتی ہیں اور بیرونی میزاب کے نیچے عضلی مرغولی (musculo-spiral) (کجری radial) عصب

اور عمیق (profunda) شریان معہ صغیر کبری باز گرد عروق کے گہرے واقع ہوتے ہیں۔ ذوراسین کا وتر بالعموم واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اسکا بیرونی کنارہ اسکی اندرونی کور کی نسبت زیادہ واضح ہوتا ہے کیونکہ ذوراسینی ردا (یعنی عضلیہ: lacertus fibrosus) اسکی موخر الذکر جانب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس خطہ کو مقدم جانب پر جلد کی ایک سلوٹ مستعرضاً عبور کرتی ہے اور یہ کہنی کا شکن کہلاتی ہے۔ یہ شکن خط مستقیم نہیں ہوتا بلکہ نیچے کی طرف کو محذب ہوتا ہے اور خط مفصل سے ذرا اوپر واقع ہوتا ہے۔ اور اسکے باہمی سرے دونوں سرقندالی فراز است کی چوٹیوں کے مناظر ہوتے ہیں۔ کہنی کے عقبی غلوع میں ذراعیہ کانچے کا سرا اس شکن سے تقریباً ایک انچ نیچے معلوم ہوتا ہے۔ مگر ذراعیہ کے ان کسور میں جو سرقندالوں کے عین اوپر واقع ہوں یہ شکن یا تو اس ارتفاع کے جو اوپر کے ٹکڑے کے نیچے کے سرے سے بنجاتا ہے بالمقابل ہوتا ہے اور یا اس سے نیچے ہوتا ہے۔ یہ سلوٹ بازو کی بسط کردگی میں غائب ہو جاتی ہے۔

308

وی (۷) کی شکل کے نشیب کے راس پر اُس مقام کے نزدیک جہاں ذوراسین کا وتر واضح طور پر محسوس نہیں کیا جاسکتا اور اس وتر کی بیرونی جانب پر وسطی وریڈ و وسطی باسلیق وریڈ اور وسطی قیفالی وریڈوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نیز اسی مقام پر عمیق و وسطی وریڈ سطحی عروق سے ملتی ہے۔ وسطی باسلیق وریڈ ذوراسین کے وتر کو عبور کرتی ہوئی اور اس میزاب کے ساتھ ساتھ کم و بیش صحیح طور پر جاتی ہوئی جو اس عضلہ کے اندرونی کنارہ پر ہوتا ہے اور اندرونی (وسطانی) سرقندال سے ذرا اوپر موخر زندگی وریڈ سے ملتی ہوئی جس سے باسلیقتی تنا بنجاتا ہے دیکھی جاسکتی ہے۔ وسطی قیفالی (median cephalic) ذوراسین کے بیرونی حاشیہ پر کے میزاب میں سے گزر کر خارجی (جانبی) سرقندال کے لینول پر کبری وریڈ سے مل جاتی ہے اور اس اتحاد سے قیفالی وریڈ بنتی ہے۔

عضدی شریان اُس خط کے وسط سے جو ایک سرقندال سے دوسرے سرقندال تک کھینچا جائے ایک انچ نیچے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا نقطہ تقسیم کبرہ کی گردن کے بالمقابل ہوتا ہے۔

”اگر جوڑ کے سامنے پر کی مثلث فضا پر محکم دباؤ ڈالا جائے تو زند (ulna) کا اکیلل آسا زائدہ غیر واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے“ (چین: Chiene)۔ دونوں سرقندالوں کی چوٹیاں ہمیشہ محسوس کی جاسکتی ہیں۔ اندرونی سرقندال دونوں میں سے زیادہ نمایاں اور کم گول ہوتا ہے۔

ذراعیتی کبریٰ مفصل خط افقی میں ہوتا ہے۔ مگر ذراعیتی زندگی مفصل ترجحاً ہوتا ہے اور مفصلی سطیس نیچے کی اور اندر کی طرف کو مائل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے خارجی سرقندال مفصلی خط سے صرف ۳۴ انچ (۱۸ ملی میٹر) اونچا ہوتا ہے۔ مگر اندرونی سرقندال کی چوٹی اس حصہ سے ایک انچ (۲۸ ملی میٹر) سے زائد اونچی ہوتی ہے (پولٹ: Paulet)۔ زند اور ذراعیتہ کے درمیان کی مفصلی سطیسوں کے میلان کا یہ نتیجہ ہے کہ بسط کردگی میں کلائی بازو کے خط مستقیم میں نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک زاویہ ”حائل“ بناتی ہے جو باہر کی طرف کو کھلتا ہے۔ چنانچہ جب کلائی سے تمام جارحہ اعلیٰ پر جڑ کا عمل کیا جاتا ہے تو کچھ قوت باسط لازمی طور پر ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسے جڑ کو کہنی سے لگانا چاہئے، جیسا کہ دست و رزی سے کندھے کے خلع کی ترجیح کرنے میں بالعموم کیا جاتا ہے۔ دونوں سرقندالوں کے درمیان کھینچا ہوا خط بازو کے محور سے زاویہ قائمہ پر واقع ہوتا ہے، مگر کلائی کے محور کے ساتھ باہر کی طرف یہ اس سے چھوٹا زاویہ بناتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم بازو پر نظر ڈالیں تو دونوں سرقندال ایک ہی لیول پر دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر ہم انکو کلائی کی طرف سے دیکھیں تو اندرونی سرقندال خارجی زائدہ کی نسبت زیادہ اونچے لیول پر نظر آتا ہے۔

کہنی کا مفصلی خط دونوں قندالوں کی چوٹیوں کے درمیان کے پورے خط کی چوڑائی کے صرف دو تہائی حصہ کے برابر ہوتا ہے (شکل ۱، صفحہ 322)۔

کہنی کی پشت پر رُج (olecranon) کا ارتقاع ہمیشہ واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ بیرونی سرقندال کی نسبت اندرونی سرقندال کے زیادہ قریب واقع ہوتا ہے۔ انتہائی بسط کردگی کی حالت میں رُج (olecranon) کی چوٹی اس خط سے ذرا اوپر واقع ہوتی ہے جو دونوں سرقندالوں کو ملاتا ہے۔ جب کلائی بازو سے زاویہ قائمہ پر ہوتی ہے تو اس زائدہ کی نوک سرقندالوں کے خط سے نیچے ہوتی ہے اور انتہائی خم کردگی میں یہ سب کا سب اس خط کے آگے واقع ہوتا ہے۔ رُج (olecranon) اور اندرونی سرقندال کے درمیان ایک نشیب ہوتا ہے جس میں زندگی عصب اور نہری (موخر) زندگی باز گرد [dorsal (posterior) ulnar recurrent] شریان پائی جاتی ہے۔

رُج (olecranon) سے باہر کی طرف اور خارجی سرقندال کے عین نیچے جلد میں ایک انخفاض ہوتا ہے جو جارحہ کی بسط کردگی کی حالت میں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ شمیم اشخاص میں بھی یہ گڑھا دکھائی دیتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اس میں کعبہ کا سر اور کعبہ کی ذراعیتی

جوڑ (radio-humeral joint) محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اور ان دونوں میں ہڈی کوپٹ اور چت حالت میں گردش دینے سے بخوبی تمیز کی جاسکتی ہے۔ یہ گڑھا اس جوف کا متناظر ہوتا ہے جو عضلہ مرفقیہ (anconeus) کے بیرونی کنارہ اور اس عضلہ کے فراز کے درمیان واقع ہوتا ہے جو برفیہ کے دونوں کعبی باسط عضلات اور عضلہ کعبی عضلہ (brachio-radialis) سے بنتا ہے۔ ہڈی کا سب سے اونچا مقام جو اسکو گردش دینے پر محسوس کیا جاسکتا ہے کہنی کے جوڑ کے خط کے عین نیچے کعبہ کا متناظر ہوتا ہے اور یہ اس مفصل کے لئے مفید رہنما ہوتا ہے۔ کہنی کے جوڑ کی اوپر کی حد اس خط تک پہنچتی ہے جو دونوں سرفندالوں کے درمیان کیمنچا گیا ہو۔ کعبہ کا حدیبہ اسکے سر کے عین نیچے محسوس کیا جاسکتا ہے جبکہ جارحہ انتہائی اکباب کی حالت میں ہو۔

کہنی کی سامنے کی طرف کی جلد باریک اور نازک ہوتی ہے اور یہ کسر سندھی ہوئی پٹیوں اور جبروں کے نامناسب استعمال سے آسانی چھل جاتی ہے۔ جلد کے باریک ہونے کی وجہ سے ماتحت وریدیں اس میں سے آسانی دکھائی دے دیتی ہیں۔ مگر جس وضاحت سے یہ دکھائی دیتی ہیں اسکا انحصار زیادہ تر زیر جلدی شحم پر ہوتا ہے۔ بہت مضبوط آدمی میں یہ بعض اوقات بال دکھائی نہیں دیتیں اور فصد کے لئے جو معمولی ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں ان سے ان کا نمایاں بنانا مشکل یا نامکن ہوتا ہے۔


کہنی کے سامنے کی طرف کی وسطی وریدوں میں جو ایم (M) کی شکل کی ترتیب پائی جاتی ہے وہ معروف ہے۔ لیکن یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ترتیب ہمیشہ نہیں پائی جاتی (شکل ۱۹)۔

وسطی ورید و وسطی قیقال اور وسطی باسلیق وریدوں میں ذوراسین کے

وتر کے باہر کی طرف منقسم ہو جاتی ہے۔ اور اسلئے موخر الذکر ورید اس وتر اور عضلہ ثریان اور اسکی وریدوں اور وسطی عصب کے سامنے سے گزرتی ہے۔ ان ساختوں سے یہ ذوراسین ردا کے ذریعہ سے علحدہ ہوتی ہے۔ وسطی باسلیق ورید بعض اوقات عضلہ ثریان کو دفعہ عبور کر لیتی ہے اور اس سے سوائے مقام تقاطع کے مقابلہ بے تعلق رہتی ہے یا یہ کچھ فاصلہ تک ثریان کے عین آگے سے جاتی ہے یا اسکو پہلے ہی عبور کر کے اسکے متوازی چلی جاتی ہے، مگر ممر کے زیادہ تر حصہ میں اس کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ جہاں تک جسامت کا تعلق ہے وسطی باسلیق ان وریدوں میں سے عام طور پر سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اسکے بعد وسطی قیقالی کا نام آتا ہے۔

اور وسطی خود تیسرے درجہ پر ہوتی ہے اور زندگی اور کبری وریدیں اس سلسلہ میں سے سب سے چھوٹی

ہوتی ہیں۔ ان وریدوں میں بہت سی غیر طبعی حالتوں کے پائے جانے کا امکان ہوتا ہے اور انہیں سے نمایاں ترین اس صورت میں پائی جاتی ہیں جب کہ اس حصہ کی بڑی بڑی شریانیں بھی غیر طبعی ہوں۔ یہ اختلاف جارح کی زندگی جانب کی وریدوں میں کبری جانب کی وریدوں کی نسبت زیادہ عام ہوتا ہے۔ چنانچہ کبری ورید یا وسطی قیفالی ورید یا دونوں ہی عام طور پر یا تو بہت ناقص النہو ہوتی ہیں اور یا بالکل معدوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ وسطی با تسلیق ورید عضلہ شریان سے علاقہ بھی رکھتی ہے لیکن فصد اور نقل الدم اور مصلوب



اور جدیرغول کے درون وریدی شری

نسل ۶۹ - بائیں کہنی ماسنے کی طرف سے۔

۱۔ با تسلیق ورید۔ ج۔ قیفالی ورید۔ ج۔ زندگی

پر وسطی با تسلیق ورید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۲۔ کبریہ پر وسطی قیفالی ورید کی طرف اشارہ کرتا

ہے۔ ۳۔ کبری ورید۔ ۴۔ وسطی ورید۔ ۵۔

موجود زندگی ورید۔ عضلہ شریان وسطی با تسلیق ورید

کے پیچھے سے گزرتی ہے اور کبریہ کی گردن کے اندر

کی طرف کبری اور زندگی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے

کے لئے اسی ورید کو بالعموم منتخب کیا جاتا ہے۔

اسکو منتخب کرنے کے لئے مندرجہ ذیل وجوہ ہیں۔ یہ

وریدوں میں سے عام طور پر سب سے بڑی اور سب

سے نمایاں ہوتی ہے اور سطح سے قریب ترین ہوتی

ہے۔ مزید برآں یہ سب سے کم حرکت پذیر ورید ہے

اور سب سے کم اختلاف پذیر بھی ہے۔ ذرا ایسی ردا

ورید کھنکھانی (phlebotomy) کے دوران میں

عضلہ شریان کے لئے بہرین محافظ کا کام بھی

دیتی ہے۔ اس غشا کی کثافت مختلف ہوتی ہے اور اسکا انحصار زیادہ تر عضلہ نو کی مقدار پر ہوتا

ہے۔ دبلے اشخاص میں وسطی با تسلیق ورید کو ماتحت شریان سے بعض اوقات نبضانات وصول

ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مشاہد کا یہ خیال ہے کہ اس ورید کی دیوار میں اکثر اتنی موٹی ہوتی ہیں جتنی کہ

پاپیٹیل (popliteal) ورید کی ہوتی ہیں۔ زندگی، کبیری اور وسطی وریدوں کی فصد کھولنے پر شاذ و نادر ہی خون کی کافی مقدار نکلتی ہے کیونکہ یہ عمیق وسطی ورید کے مقام اتصال سے نیچے واقع ہوتی ہیں اور اسلئے انہیں جالہ کی عمیق وریدوں سے خون نہیں آتا۔ عضدی شریان جیسا کہ خیال کیا جاسکتا ہے دوران فصد میں اکثر مجروح ہو چکی ہے اور جس زمانہ میں فصد کارولاج عام تھا کہنی کے خم پر شریانی وریدی انورسما اکثر بنجایا کرتا تھا۔ چونکہ بڑے بڑے عروق لف انہی وریدوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور نیز ورید شنگافی کئے دوران میں ان میں سے بعض مجروح ہونے سے شاذ و نادر ہی بچتے ہیں اسلئے اس عمل کے لئے جو طریقہ اختیار کئے جاتے ہیں انہیں اگر صفائی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو حاد التهاب عروق لف پیدا ہو جاتا ہے۔

داخلی جلدی (پیش بازو کا وسطی جلدی) عصب کے جو عام طور پر وسطی باسلیق ورید کے سامنے سے گزرتا ہے اس عرق سے خون نکالتے وقت زخمی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔

بازو کے داخلی میان عضلی فاصل پر اور اندرونی سرفندال کے عین اوپر ایک لمبی (فوق منقبی: supracubital یا پرمبرجری: epitrochlear) غدہ ہوتا ہے۔ اس میں پیش بازو کی اندرونی طرف کے بعض سطحی عروق لف داخل ہوتے ہیں اور اندر کی دو یا تین انگلیوں کے بھی اسی میں آکر ملتے ہیں۔ لمحاظ محل یہ غدہ جارحہ اعلیٰ کے ان غدہ میں سے جو ہمیشہ پائے جاتے ہیں زیر ترین غدہ ہے۔

اسی محل پر گاہے گاہے ذراعیہ کی اندرونی جانب کی ایک بروں بالیدید ہوتی ہے۔

فوق قندالی زائده (supracondyloid process)۔ عضدی شریان اوئیزر وسطی مصب بھی بعض اوقات اس زائده کے نیچے سے اور اندر کی (وسطانی) جانب سے ہو کر گزرتا ہے۔

عضدی شریان (brachial artery)۔ بازو کو زور سے خمیدہ کرنے میں یہ شریان جوڑ کے سامنے کے عضلی تودوں کے درمیان مضبوط ہو جاتی ہے اور کجری نبض میں بہت تنغیف ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ بند بھی ہو جاتی ہے۔ کہنی کے خم کے انورسماؤں کا علاج جارحہ کی خم کردگی سے کیا جا چکا ہے، کیونکہ اس وضع سے انکے تاج پر کم و بیش بلا واسطہ دباؤ پڑتا ہے جوڑ کی پوری بسط کردگی میں یہ شریان چھٹی ہو جاتی ہے اور کجری نبض میں تنغیف ہو جاتی ہے۔

بیش بسط کردگی میں جبکہ ممکن ہے کہ نُرَج (olecranon) بھی کمسور ہو گیا ہو۔ نبض پونچے پر بند ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی کہنی کی جو خمیدگی کی حالت میں استوار ہو گئی تھی زور سے بسط کردگی کرنے میں عضدی نثریان منشق ہو چکی ہے۔

زندگی عصب (ulnar nerve) کا جوصل وقوع کہنی پر ہے اسکی وجہ سے

اسکے مجروح ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ اندرونی سرقندال کے پیچھے سے ایک میزاب میں سے گزرتا ہے اور اسکے اوپر لیفی بافت کا ایک پل ہوتا ہے جو اسکی غیر وضعیت کو مانع آتا ہے۔ اس عصب کا اندرونی سرقندال کے سامنے سے گزرنے کا بھی ممکن ہے اور ایک مثال کی بھی اطلاع دی گئی ہے جس میں یہ عصب کہنی کے خمیدہ کرنے پر اس فراز کے اوپر سے پھسل کر سامنے آ جاتا تھا (کواین Quain: جب زندگی عصب کو (تندگی عصب وغیرہ کے لئے) کہنی کے پیچھے سے معر کیا جاتا ہے تو یہ بعض اوقات ایک عضلہ — برکری مرفقیہ (epitrochleo-anconeus) — سے جو گاہ گاہے موجود ہوتا ہے پوشیدہ پایا جاتا ہے۔

زندگی عصب کو ضرر پہنچنے کے نتائج پر صفحہ 372 پر بحث کی گئی ہے۔

کہنی کا جوڑ (elbow-joint)۔ اس جوڑ کی طاقت کا انحصار اتنا رابطات یا


عضلات پر نہیں جتنا کہ عظمی سطحوں کی باہمی موافقت پر ہے۔ نُرَج (olecranon) اور اکلیل نما زائدہ کے تعلقات ذراعیہ سے ایسے ہیں کہ بعض وضعوں میں اس جوڑ کی قوت بہت کافی ہوتی ہے۔ چونکہ کہنی ایک خالص قبضہ دار جوڑ ہے اسلئے اس میں صرف خم کردگی اور بسط کردگی ہی پائی جاتی ہے۔ یہ حرکتیں ترجیحی واقع ہوتی ہیں لہذا خم کردگی میں کلائی اندر کی طرف کو مائل ہوتی ہے اور ہاتھ کو ترقوہ کے وسطی ٹنٹ کی طرف لاتی ہے۔ اگر مفصلی خط میں ترچھا پن نہ پایا جاتا تو ہاتھ کو اسی طرف کے کندھے پر چپا رکھنا ممکن ہوتا۔ لیکن اس حرکت کا عمل میں لانا صرف جوڑ کے بعض استیصال کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس عمل میں مفصلی سطحوں کو ترچھا رخ باردیگر نہیں دیا جاتا۔ انتہائی بسط کردگی میں چہانتک زندہ اور ذراعیہ کے جانبی مستویوں کا تعلق ہے زندہ تقریباً ذراعیہ کی سیدہ میں واقع ہوتی ہے اور انتہائی خم کردگی میں دونوں ہڈیوں کے درمیان ۳۰ تا ۴۰ درجہ کا زاویہ بنتا ہے۔

جو عضلات کہنی کے جوڑ پر عمل کرتے ہیں انہیں سے بعض جراح کے لئے خاص دلچسپی رکھتے ہیں جسکی وجہ یہ ہے کہ قرب وجوار کے کسور کے علاج کے دوران میں انکو ضرر پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ چنانچہ لعظمی التهاب عضلہ (myositis ossificans) کے عضلہ غضبیہ مقدم (brachialis anticus) میں پیدا ہونے کا خاص میلان پایا جاتا ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائے تو معالجاتی ذرائع مثلاً مالش اور منفعلی حرکات کو جن سے خراش پیدا ہوتی ہے ترک کر دینا یا انہیں کمی کر دینا ضروری ہوتا ہے اور اس سے مزید آرام کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ مزید برآں وولکمن کے وقف الدمی شلل اور تقبض (Volkman's ischæmic paralysis and contracture) کے خاص طور پر سرعت سے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے جبکہ کہنی مکمل خم کردگی کی حالت میں مضبوطی سے باندھ دیجی ہو یا کلائی پر کسکر جبرہ لگا دیا گیا ہو۔ ورم سے پٹی کے کس جانے کے خطرہ کا خیال رکھتے ہوئے جراح کو اپنی دستکاری کا ۶ سے لیکر ۸ گھنٹے گزرنے کے بعد ملاحظہ کرنا چاہیے ہیموفیلیا کے ایک مریض لڑکے میں میں (سیسی چوائس) نے کہنی کے خلع کے بعد وقف الدمی شلل (ischæmic paralysis) کو ظاہر ہونے دیکھا ہے اور اسکے ساتھ بافتوں میں بہت سانسزنی انصباب بھی موجود تھا۔ اس واقعہ میں کوئی پٹی یا جبرہ استعمال نہیں کیا گیا تھا۔

دربکس (bursæ)۔ زُج کے اوپر کی عظیم زیر جلدی درجک اکثر کلائی یافتہ اور مٹھب پائی جاتی ہے (شکل ۷۰)۔ بعض پیشوں میں جنہیں کہنی پر دباؤ پڑتا ہے یہ اور بڑی ہوجاتی ہے مثلاً ”کان کنوں کی کہنی“۔ ذوراسین کے مٹھبی پر اسکے اور ہڈی کے درمیان ایک درجک ہوتی ہے اور اسکا جو تعلق کلائی کے اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ کی اطلاع ملے جس میں اس درجک میں مزمن کلائی پائی جاتی تھی اور وسطی عصب اور ظہری بن العظامی اعصاب (dorsal interosseus nerves) پر اسکا دباؤ پڑنے کی وجہ سے کلائی کی قوت زائل ہو گئی تھی (ایگنیو: Agnew)۔ مثلثیہ الرؤس کے مٹھبی پر بھی ایک درجک ہوتی ہے (شکل ۷۰)۔

کہنی کے جوڑ کے رابطات میں سے مقدم اور موخر رابطات مقابلہ پتیلہ ہوتے ہیں اور اس مفصل کے مرض میں جوڑ کے اندر جو سیال ہوتا ہے اسکے دباؤ سے خاصکر موخر الذکر جلد جواب

دیدنیات ہے (نقشہ ۷۰)۔ داخلی جانبی (زندگی محانب) رباط اس حصہ کے رابطات میں سے سب سے مضبوط اور سب سے وسیع ہوتا ہے اور یہ اپنی استواری اور وسیع چسپیدگی کی وجہ سے اور نیز اسلئے کہ یہ نہ صرف خم کردگی اور بسط کردگی کو ہی محدود رکھتا ہے بلکہ اگر کلائی کو بازو سے باہر طرف کو



شکل ۷۔ کہنی کے جوڑ کی انتصابی تراکبش۔

نُج اور کبرہ کے برابر بالی خطوط سرخ دکھائے گئے ہیں۔ جو نصف بطن کر دی گئی حالت میں ہے۔

۱۔ رُح کا عام کلام، نابالغ جس سے مثلثۃ الرؤس چسپید ہوتا ہے۔ جب۔ برابر ہو جائے گا ہے۔ پانچ جاتا ہے اور جس سے رُح کا بالائی ایک تنہا ہی حصہ بنتا ہے۔ مین ورکس دکھائی گئی ہیں۔ رُح کے اوپر۔ مثلثۃ الرؤس کے فوجیہ نیچے اور ذرا اس میں کے منہ پر۔ (مفصلہ بالمطرح لولید = عضلہ عضدیہ کوجریہ)۔

مروڑنے کی کوشش کی جائے تو اسکو بھی محدود کرنا ہے کہ پنی کی ”موچوں“ میں یہ اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ چونکہ یہ رباط رُج کے تمام اندرونی کنارہ سے چسپید ہوتا ہے اسلئے اس زائدہ مکے کمر کی حالت میں یکمزدوں کی علحدگی کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔

منفصلی مرض۔ اس جوڑے کے مریض میں انصباب پہلے پھل ایک ورم کی شکل میں

نمودار ہوتا ہے جو رُج کے حاشیوں کے ارد گرد پایا جاتا ہے اور اسکی توجہ ان امور سے ہوتی ہے کہ زلانی کہفہ یہاں سطح سے قریب ترین ہوتا ہے اور موخر رباط ڈیٹلا اور پیٹلا ہوتا ہے۔ نیز کجبری ذراعینی مفصل کے خط پر بھی کیقدر ورم جلد ہی دیکھنے میں آ جاتا ہے اور اس مقام پر توجہ کا پایا جانا انصاف مفصل کو مثلثہ الرؤس کے نیچے کی درجہ کی سادہ کلانی سے تمیز کرتا ہے عمیق ورم مقدم رباط کے پتلا ہونے کی وجہ سے جوڑ کے سامنے عضلہ عضدیہ مقدم (brachialis anticus) کے نیچے بھی محسوس کیا جاسکتا ہے اور خارجی سر قندال کے ارد گرد یہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ داخلہ (زندہی بجانب) رباط کی کثافت زلانی غشا کو اندر کی طرف ابھرنے سے باز رکھتی ہے۔

جب اس جوڑ میں قیوع پیدا ہو جاتا ہے تو پیپ اوپر کی اور پیچھے کی طرف ذراعیہ اور مثلثہ الرؤس کے درمیان چکر سطح تک نہایت آسانی سے پہنچ جاتی ہے اور اسلئے فراج کا منہ عام طور پر اس عضلہ کے کسی ایک کنارہ پر بن جاتا ہے۔ بعض اوقات پیپ سامنے کی طرف عضلہ عضدیہ کے نیچے چلی جاتی ہے اور اس عضلہ کے منہ کی قریب باہر نکل جاتی ہے۔ مرض زدہ کہنی کا میلان نصف خم کردگی کی حالت میں رہنے کی طرف ہوتا ہے اور یہ معلوم کرنا دلچسپی کا باعث ہوگا کہ یہ جوڑ اسوقت بھی یہی وضع اختیار کر لیتا ہے جبکہ اس میں زور سے اثرات کئے جائیں (برون : Braun)۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ اس جوڑ میں نصف خم کردگی کی حالت میں سیال کی سب سے بڑی مقدار سما سکتی ہے۔

کہنی کی عضلی استواری کے سلسلہ میں جو مرض کی معکوس خراش سے پیدا ہوتی ہو یہ معلوم کر لینا مناسب ہوگا کہ اس مفصل کے تمام اعصاب خاص کر عضلی مرغولی (musculo-spiral) اور عضلی جلدی (musculo-cutaneous) اس پر فعل کرنے والے عضلات کو رسد پہنچاتے ہیں۔ زندگی عصب کا جو تعلق اس جوڑ سے ہے اس سے ان واقعات کی توجہ ہو جاتی ہے جن میں اس عصب کے تفرع کے مناظر حصوں میں کلانی کے ساتھ ساتھ اور انگلیوں میں شدید دردمسوس ہوتا ہے۔

کعبہ کا بالائی بربالہ اور ذراعین کے زیرین بربالہ کا بیشتر حصہ دروں زلانی ہوتا ہے یعنی یہ جوڑ کے کیسہ کے اندر آ جاتے ہیں (شکل ۷۱)۔ زندہ کے بالائی بربالہ کا جو نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے صرف کچھ حصہ ہی کیسہ کے اندر واقع ہوتا ہے (شکل ۷۰)۔

کہنی کے خلوع۔ یہ بہت سے ہیں اور انکو اس طرح ترتیب دیا جاسکتا ہے۔ (۱)

کعبہ اور زند دونوں کے خلوع یا تو پیچھے کی طرف یا باہر کی طرف یا اندر کی طرف اور یا آگے کی طرف (علی الترتیب لہما ظ کثرت وقوع)۔ (۲) صرف کعبہ کے خلوع یا تو آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف اور یا باہر کی طرف (علی الترتیب لہما ظ کثرت وقوع)۔ (۳) صرف زند کا خلوع پیچھے کی طرف۔

ان مختلف الانواع خلوع کے سلسلہ میں بعض عمومی تشریحی امور کا تہیداً بیان کرنا مناسب ہوگا۔

(۱) مقدم موخر خلوع جانبی خلوع کے مقابلہ میں بہت کثیر الوقوع ہیں۔ مقدم موخر رخ میں جو خلوع واقع ہوتے ہیں وہ زیادہ کثیر الوقوع ہیں، کیونکہ اس جوڑ کی حرکتیں اسی رخ میں واقع ہوتی ہیں اور ذراعیم کی مفصلی سطح آگے سے پیچھے کی طرف کو نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے۔ بخلاف اسکے کہنی میں لمبی طور پر کوئی جانبی حرکت نہیں پائی جاتی اور اس مفصل کا عرض ایک جانب سے دوسری جانب تک معتدبہ ہوتا ہے۔ مقدم موخر رباطات کمزور اور جانبی (مجانب) رباطات مضبوط ہوتے ہیں۔

(ج) کلیائی کی دونوں ہڈیاں اکیلی کعبہ یا اکیلی زند کی نسبت زیادہ کثرت سے مغلوع ہوتی ہیں۔ اس امر کا انحصار ایک طرف تو کعبہ اور زند کے باہمی رباطی تعلق پر ہے اور دوسری طرف ذراعیم اور کعبہ کے اس قسم کے باہمی تعلق کی عدم موجودگی پر۔ مردہ موضوع میں پیش بازو کی دونوں ہڈیوں کو مغلوع کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ مگر کعبہ کو زند سے بافتوں کو زیادہ توڑنے یا پھاڑنے کے بغیر علیحدہ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔

(ج) اکٹھی دونوں ہڈیوں کا عام ترین خلع پیچھے کی طرف کو ہوتا ہے اور آگے کی طرف کو یہ سب سے زیادہ نادر الوقوع ہے۔ قبل الذکر حالت میں حرکت کو چھوٹا سا اکلیل نما زائدہ اور موخر الذکر میں بڑا اور خم دار زنج مزاحم آتا ہے۔ اسی قسم کے اسباب کی وجہ سے باہر کی طرف کا خلع اندر کی طرف کی غیر وضعیت سے کم نادر ہے کیونکہ ذراعیم کی مفصلی سطح اندر کی طرف سے نیچے کی اور اندر کی طرف کو مائل ہوتی ہے اور اسلئے اس حصہ میں بنیادہ کا کوٹ

پیش کرتی ہے۔

(۵) اگر ایک ہی ہڈی مخلوع ہوتی ہے تو وہ بالعموم کعبہ ہوتی ہے۔
ایسا اس ہڈی اور ذراعیہ کے درمیان قابل اعتماد اتحاد موجود نہ ہونے اور کعبہ کے (جو ہاتھ کا دستہ ہے) بلا واسطہ ضرب کے زیادہ مدت تک معرض اثر میں رہنے اور نیز اسکے زیادہ حرکت پذیر ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ خلع بالعموم آگے کی طرف کو واقع ہوتا ہے اور اسکی وہیہ ہے کہ جس قسم کے ضربات کا رجحان اس ہڈی کو اکثر اپنی جگہ سے ہٹا دینے کی طرف ہوتا ہے اسی قسم کے ضربات کا رجحان اسکو آگے کی طرف کو کھینچنے کی طرف بھی ہوتا ہے۔ پالٹ (Paulet) اس امر پر زور دیتا ہے کہ حلقہ ناطہ رباط (annular ligament) کا موخر حصہ مقدم حصہ کی نسبت "کھینچ زیادہ موجب مزاحمت" ہوتا ہے۔ اکیلی زند کا خلع پیچھے کے رخ میں واقع ہوتا ہے اور اسکے وجہ معلوم ہی ہیں۔

جلو اقسام کے خلوع جزوی بھی ہوتے ہیں اور مکمل بھی۔ جب یہ مقدم موخر رخ میں واقع ہوتے ہیں تو بالعموم مکمل ہی ہوتے ہیں اور جب غیر وضعیت جانی ہوتی ہے تو یہ جزوی ہوتے ہیں۔

کھینی کے خلع کی صرف انہی دو قسموں پر جو عام طور پر پائی جاتی ہیں اب ذرا تفصیل کے ساتھ بحث کی جا سکتی ہے۔

دونوں ہڈیوں کی خلفی غیر وضعیت۔ یہ جبری بسط کردگی میں واقع ہو جاتی ہے

اس میں رُج (olecranon) کی چوٹی جو ذراعیہ پر دباؤ ڈالے ہوتی ہے دوسری قسم کے بیم کے نصاب کا کام دیتی ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیننی (sigmoid) یا نیم قمری (semilunar) کٹاؤ بکرہ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ کٹائی پر پیچھے کی یا اوپر کی سمت میں شدت کا زور پڑنے سے حقیقی غیر وضعیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حالت کی توضیح دوڑتے ہوئے مکمل طور پر بسط کردہ ہاتھ کے بل گرنے کی مثال سے کیجا سکتی ہے۔ یہ ضرر جارح کے بعض شدید مروڑوں سے پیدا ہو سکتا ہے مائل گین (Malgaigne) کی یہ رائے ہے کہ مروڑ کی خاص قسم جو خلع پیدا کرنے کے لئے سب سے زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے وہ ہے جبکہ کھینی کی نصف خم کردگی کی حالت میں کٹائی کو اندر کی طرف کو مروڑا جائے۔ اس طرح داخل جانی رباط پیٹ جاتا ہے اور اکلیل نما زائندہ ذراعیہ کے نیچے

319

اندر کی اور نیچے کی طرف کو بل کھسا جاتا ہے، اور اس طرح ہڈیاں پیچھے کی طرف کو ہٹ جاتی ہیں۔ جو
کے مکمل طور پر خم کردہ ہونے کی صورت میں اس ضرر کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ خلع کی مکمل حالت میں
اکلیل نما زائدہ زنجی حفرہ کے بالمقابل ہوتا ہے اور یہ اس جوف میں مشکل ہی سے داخل ہوتا ہے
(جیسا کہ بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے) کیونکہ یہ زند اور کعبہ کے درمیانی تعلق کی وجہ سے
اور موخر الذکر کے ذراعیہ کے بیرونی سر قندال کے پیچھے نکل جانے سے اس حفرہ میں گر نہیں سکتا۔
مقدم اور دونوں جانبی رابطات بالعموم کم و بیش دریدہ ہوجاتے ہیں اور موخر او ملقہ نارابطات
بچ جاتے ہیں۔ ذوراسین ذراعیہ کے برین سرے پر سے کھچ جاتا ہے اور اوسط درجہ تک تنیدہ ہوجاتا
ہے۔ عضل عضدیہ بہت تنجا آتا ہے اور اکثر ٹیمٹ جاتا ہے۔ مرقیہ (anconeus) بھی تنیدہ ہوجاتا
ہے۔ وسطی اور زندی اعصاب بھی بعض اوقات حد سے زیادہ کھچ جاتے ہیں۔

۲۔ کعبہ کی مقدم غیر وضعیت۔ یہ ہڈی کو پیچھے کی طرف سے بلا واط

چوٹ پینچنے یا انتہائی اکباب (pronation) یا بسط کردہ اور کتب ہاتھ کے بل گرنے سے
پیدا ہوتی ہے۔ مقدم خارجی او ملقہ نارابطات پھٹ جاتے ہیں۔

کہنی کی مویج (کچی ہوئی کہنی) (pulled elbow)۔ ۵ سال سے کم عمر کے

بچوں میں جارح کو مبطوح حالت میں زور سے کھینچنے سے بعض اوقات کعبہ ملقہ نارابطا میں سے نیچے
کی طرف کو پھسل جاتی ہے اور یہ رابطا اوپر کی طرف کو ہٹ جاتا ہے۔ ایسی حالتوں میں جس کہنی کے
عضلات کو معمولی معکوس انقباض کے لئے وقت ملنے سے پیشتر ہی عمل میں آ جاتا ہے۔ لہذا جب
بچہ ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اٹھایا جاتا ہے تو تمام وزن عضلات کی بجائے کہنی کے رابطات پر پڑتا ہے
اس قسم کے خلع کی مزاحمت کرنے والے رابطات صرف یہی ہیں، (۱) ترچھا زندی کعبی رابطا،
(۲) ملقہ نارابطا کے نیویرن ریشے جو سر کو پکڑے ہوتے ہیں۔ کتب حالت میں کہنی کو خمیدہ کرنے سے
مذکورہ رابطا اپنے لمبی عمل پر آ جاتا ہے۔

ذراعیہ کے نیچے کے سرے کے کسور۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں ا۔ (۱) سر قندالوں کے

میں اوپر کا ایک کسر۔ (۲) ٹی (T) کی نعل کا کسر جس میں جوڑ بھی موقوف ہوتا ہے۔ (۳) داخلی

یا وسطانی اور (۴) خارجی یا جانبی قندالی حصوں کے کسور۔ (۵) اندرونی سر قندال کا کسر۔ اور (۶) نیچے کے بربالہ کے سین اوپر سے علیحدگی۔ یہ تمام کسور بچوں میں زیادہ عام ہوتے ہیں۔

۱۔ یہ کسر جو بعض اوقات "سر قندالوں کے قاعدہ پر کا کسر" کہلاتا

ہے بالعموم جفہ زُج کے ذرا اوپر جہاں ذرائع کی پوری پھیلنا شروع ہوتی ہے واقع ہوتا ہے۔ یہ عموماً ایک جانب سے دوسری جانب تک مستعرض واقع ہوتا ہے اور پیچھے سے نیچے کی اور سامنے کی طرف کو ترچھا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کسی ایسی چوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہنی کے سرے پر لگی ہو۔ زُج کی نوک ہڈی میں دفعہ گھس کر شامد فانہ کے سرے کی طرح عمل کرتی ہے اور اس کسر کے پیدا کرنے میں ایک اہم فعل سر انجام دیتی ہے۔ نیچے کا ٹکڑا پیش بازو کی ہڈیوں کے ساتھ ہی ثلثہ الرؤس کی وجہ سے عام طور پر پیچھے کی طرف کو ہٹ جاتا ہے اور اسی عضلہ اور ذوراسین اور عضلہ عضدیہ کی وجہ سے اوپر کی طرف کو اٹھ جاتا ہے۔ وسطی اور زندگی عصا کو اور بالخصوص موخر الذکر کو بعض اوقات شدید نقصان پہنچتا ہے۔

۲۔ "ٹی (T) کی شکل کا کسر" قبل الذکر ضرر کی ہی ایک قسم ہے سر قندالوں

سے اوپر مستعرض کسر واقع ہونے کے علاوہ ایک انتہائی کسر بھی موجود ہوتا ہے جو جوڑے اندر تک جاتا ہے۔ چنانچہ ٹکڑا دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ غیر وضعیت دسی ہی ہوتی ہے۔ یہ کسر عام طور پر خمیدہ کہنی کے بل گرنے سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ نرج کا سڑی فانہ کے طور پر کام کرتا ہو اور کسر پیدا کر دیتا ہو اور نیز زند کے ہلانی کٹاؤ کے وسط پر جو نمایاں جید ہوتا ہے وہ دوسرے فانہ کا کام دیتا ہو اور جوڑے اندر تک کا مستعرض کسر پیدا کرتا ہو۔

جراحی مقاصد کے لئے یہ مناسب ہے کہ ذرائع کے بعد ہی مفصلی سرے کے ہر ایک رقبہ کو جس پر سر قندال واقع ہوتا ہے قندالی حصہ کے نام سے موسوم کیا جائے۔ اگر صحیح صحیح کہا جائے تو سر قندال جوڑے کے کیسہ کے باہر واقع ہوتے ہیں اور قندالی حصے اس کے اندر تک چلے جاتے ہیں۔

۲۔ داخلی یا وسطانی قندالی حصہ کے کسر میں خط فصل بالعموم

وسطی سرقندال کی نوک کے نصف انچ اوپر سے شروع ہوتا ہے (اور اسلئے یہ جوڑ سے باہر ہوتا ہے) اور زج اور اکیلل نما حفرہ میں سے باہر کی طرف کو ترچھے رخ میں گذر کر بکری سطح کے مرکز پر سے ہوتا ہوا مفصل کے اندر داخل ہو جاتا ہے (ہیملٹن: Hamilton)۔ یہ ٹکڑا اکثر اوپر کی نیچے کی اور اندر کی طرف کو ذرا ہٹ جاتا ہے اور زنبج بھی اس کے ساتھ ہی جاتی ہے۔

321

۴۔ خارجی یا جانبی قندالی حصہ کے کمر میں بھی خط مفصل خارجی

سرقندال کے اوپر سے اور جوڑ کے باہر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف کو جا کر عام طور پر بکری سطح اور اس سطح کے درمیان میں سے جو کبرہ کے لئے ہوتی ہے جوڑ میں داخل ہو جاتا ہے۔ غیر وضعیت خفیف اور تغیر پذیر ہوتی ہے۔

۵۔ خارجی سرقندال کا کمر اسکے منفر الجسامت ہونے کی وجہ سے

شاذ و نادر ہی ممکن ہوتا ہے۔ گرد اخسل یا وسطانی سرقندالوں کے سور کا فی عام ہوتے ہیں اور جوڑ غیر متاثر رہتا ہے (شکل ۷)۔ یہ سرقندال ایک علحدہ برالہ کی شکل میں موجود ہوتا ہے جو ۱۸ سال کی عمر پر متحد ہوتا ہے اور جو اس عمر سے قبل کسی وقت بھی بلا واسطہ ضرب یا شدید عضلی فعل سے علحدہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ کثیف صفاقی ریشوں سے پوشیدہ ہوتا ہے اسلئے عریض غیر وضعیت عام طور پر واقع نہیں ہوتی اور جب یہ واقع ہوتی ہے تو یہ مشترک خم کن عضلات کی سیدہ میں ہوتی ہے جو اس زائدہ کی نوک سے نکلتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں زبیدی عصب کو جو اس زائدہ کی دوسری طرف پر واقع ہوتا ہے اکثر نقصان پہنچ جاتا ہے

۶۔ نیچے کا برالہ (شکل ۷)۔ ذراعیہ کے غضروفی زیرین سرے میں چار تعظمی مرکز ظاہر ہوتے ہیں جو متدرج ذیل ہیں: (۱) ایک تار کچھ (capitellum) اور بکرہ (trochlea) کے جانبی نصف کے لئے۔ ۲ ۱/۲ سال پر۔ (۲) داخلہ سرقندال کے لئے، ۵ سال پر۔ (۳) بکرہ کے وسطانی نصف کے لئے، ۱۰ سال پر۔ اور (۴) خارجی سرقندال کے لئے، ۱۲ سال پر۔ ذراعیہ کے زیرین سرے کی مفصلی سطح میں یہ ایک غیر معمولی خاصہ پایا جاتا ہے کہ اس میں دربالہ کا کچھ حصہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ موخاندک کی ایک پٹلی سی دجی بکرہ اور داخلہ

سرقندال کے درمیان حاصل ہوتی ہے۔ تارکچی، بکری اور خارجی سرقندالی مراکز تقریباً سن بلوغ پر متحد ہوتے ہیں اور ان سے مٹلی بر بالہ بنتا ہے۔ وریہ تودہ جو اس طرح طیار ہوتا ہے قسمتاً سترھویں سال پر پوری سے مل جاتا ہے۔ داخلی سرقندالی بر بالہ انٹھاریوں یا انیسویں سال تک علحدہ رہتا ہے اور اسلئے بر بالی خط دو حصوں پر منقسم پایا جاتا ہے، اور اس کی تشکیل بے قاعدہ ہوتی ہے۔ یہ جوڑ کے کیسے کے اندر

اور باہر دونوں طرف واقع ہوتا ہے (شکل ۱)۔

اور اسکا محل اس خط سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

جو خارجی سرقندال کے اوپر کے کنارہ سے لیکر

داخلی سرقندال کے زیرین کنارہ تک کھینچا جائے۔

زیرین بر بالہ پوری سے ۱۷ سال کی عمر پر ملتا ہے۔

چنانچہ ۱۷ سال کے بعد ہڈی کی بالیدگی کا انحصار

لازمی طور پر بالائی بر بالہ کی فعالیت پر ہوتا ہے،

جو ۲۰ سال کی عمر تک متحد نہیں ہوتا۔ لہذا سولہ

یا سترہ سال کی عمر سے پہلے کہنی کا استیصال

(excision) کرنے سے جارحہ کا نمونہ نہیں

ہوگا، خواہ آری بر بالی خط سے بھی تنجا وڑ کر گئی ہو۔

بہر کیف بہت سے ایسے واقعات کے متعلق افلاح

وصول ہوئی ہے جن میں سولہ سال کی عمر سے پہلے

نیچے کے بر بالہ کو اور بیس سال کی عمر سے پیشتر اوپر

کے بر بالہ کو چوٹ آنے سے جارحہ کی بالیدگی نمایاں طور پر بند ہو گئی تھی۔ چونکہ بر بالی خط کا زیادہ


حصہ کیسے کے اندر ہوتا ہے اسلئے بعدنی تودہ کے علحدہ ہو جانے سے اسکے پیچھے کی طرف ذرا سرک جانا

کے علاوہ اور کوئی غیر وضعیت واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جس حالت کو نیچے کے بر بالہ کی علحدگی کہلاتا

ہے اور وہ عام طور پر دیکھنے میں بھی آتی ہے وہ اکثر حقیقت میں بر بالی حصہ کے عین اوپر

سے پوری کا کسر ہوتا ہے۔ مگر کم عمر بچوں میں ہر ایک بر بالہ اور خامس کوہ بر بالہ جو داخلی سرقندال

کے لئے ہوتا ہے حقیقی طور پر علحدہ ہو سکتا ہے۔



شکل ۱۔ ذراعیہ کا زیرین بر بالہ پیچھے کی طرف سے۔

۱۔ داخلی سرقندال کا مرکز۔ ب۔ ج۔ د۔

متحدہ مراکز کوہ، تارکچیہ اور خارجی سرقندال کیلئے۔

۲۔ بر بالی خط کیسے کی چسپیدگی سرخ

خطوں سے ظاہر کی گئی ہے۔

بالائی جارح کے بر بالے کہنی پر کے بر بالے اپنی اپنی ہڈی کی پوری سے

323

۱۷ سال کی عمر پر متحد ہو جاتے ہیں (سوائے خراجی قندال کی نوک کے جو ۱۸ سال کی عمر پر متحد ہوتی ہے)۔ ہڈیوں کے کندھے اور کلائی کی طرف کے سروں کے بر بالے ۲۰ سال کی عمر پر متحد ہوتے ہیں۔ تینوں ہڈیوں کی مغزی قنالیں کہنی کی طرف کو جاتی ہیں۔ ذراعہ کی مغزی شریان عضدی شریان یا تحتانی عمیق (inferior profunda) شریان سے نکلتی ہے اور کعبہ اور زند کی مغزی شریانیں مقدم بین العظامی سے نکلتی ہیں۔

زنج کے کسور ذراعہ کے نیچے کے سرے یا زند کے اوپر کے سرے پر بلا واسطہ چوٹ

لگنے سے پیدا ہوتے ہیں اور چند واقعات میں یہ شدید بالواسطہ چوٹ سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ عضلی فعل سے کسر پیدا ہونے کی مثالیں چند ہی ہیں اور ان پر کچھ کچھ اعتراض کیا جاسکتا ہے کسر اس زائدہ کے وسط کے قریب عین وہاں جہاں یہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے نہایت کثرت سے پایا جاتا ہے اور یہ بالعموم مستعرض ہوتا ہے۔ مشتتہ الرؤس کی وجہ سے جو غیر وضعیت واقع ہوتی ہے وہ اختلاف پذیر ہوتی ہے اور اس کا انحصار اس امر پر ہوتا ہے کہ اس زائدہ پر کا گرد غلطہ اور اس سے چسپیدہ رباطات کس مدت تک دریدہ ہوئے ہیں۔ زنج کا زیادہ تر نمود زند کی پوری سے ہوتا ہے (نقل ۷۰)۔ مگر اس زائدہ کی چوٹی پر چھلکے کی طرح کا ایک بر بالہ بھی ہوتا ہے جو بقیہ زنج سے ۷۱ سال کی عمر پر متحد ہوتا ہے۔ گاہے گاہے ایک اور بر بالی مرکز بھی نمودار ہو جاتا ہے جس سے زنج کا بالائی ثلث لیا ہوتا ہے (نقل ۷۰)۔ کم عمر موضوعات میں چھلکے کی طرح کا یہ بر بالہ بعض اوقات چوٹ سے علحدہ ہو جاتا ہے، یا غضروفی زنج بقیہ ہڈی سے جدا ہو جاتا ہے۔ بالوں میں زنج کا عام کسر بر بالی خط کی متابعت نہیں کرتا۔

اکلیل نما زائدہ کا کسر ایک نہایت ہی نادر الوقوع حادثہ ہے اور

یہ بعض اوقات زند کے عقبی خلع میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں آنا ناممکن ہے کہ یہ زائدہ عضلہ عضدیہ مقدم کے فعل سے کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، در آنحالیکہ یہ عضلہ اس زائدہ پر پڑتی ہونے کی بجائے زند پر اس مرید کے قاعدہ پر پڑتی ہوتا ہے (نقل ۷۰)۔ نیز یہ بر بالہ کی طرح بھی

علحدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسکی حیثیت بر بال کی نہیں ہے۔

کعبہ کے سر یا اس کی گردن کے کسور نادر الوقوع ہیں۔ اور یہ

824

بالعموم خلع یا دوسری سخت چوٹوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ سر عام طور پر یا تو شق ہو جاتا ہے اور یا آہیں ستارہ کی طرح کا کسرا یا جاتا ہے۔ اور اگر ضرر سرتک ہی محدود ہو تو یہ صرف لاشعاعوں کی مدد ہی سے تشخیص کیا جاسکتا ہے کعبہ کا بالائی بر بال تمام معلقہ نارباط کے حدود کے اندر ہوتا ہے اور سادہ ضرر میں مشکل ہی سے علحدہ ہو سکتا ہے۔ یہ غضروف کے صرف ایک قرص ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ۷ سال کی عمر پر پوری سے متحد ہوتا ہے۔ جب اس ہڈی کی گردن ٹوٹ جاتی ہے تو نیچے کا ٹکڑے کا اوپر کا سرا عضل ذوراسین سے بخوبی اوپر کو کھینچ جاتا ہے۔

کہنی کا استیصال جزئی (resection of elbow) بہت سے

طریقوں سے کیا جاسکتا ہے اور ان تمام طریقوں میں عصب زندگی کو ضرر پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اور نمایاں داخل سرفقدال کو صاف کرنے میں اکثر تکلیف پیش آتی ہے۔ اگر کچا تو ہڈی سے قریب رکھا جائے تو چھوٹا بڑا کوئی عرق نہیں کٹتا۔ جن عضلات میں زیادہ خلل اندازی ہوتی ہے وہ مرفقیہ (anconeus) باطنی (supinator)، عضلہ باسطہ زندیہ (extensor carpi ulnaris)، عضلہ باسطہ رتغیہ کعبیہ قصیرہ (extensor carpi radialis brevis) اور عضدیہ (brachialis) ہیں۔ رزج کے اوپر کے گرد عظمہ کو اور مثلثۃ الرؤس کے وتر کے خارجی جانبی پھیلاؤ کو جو کلائی کی عمیق روتا تک پہنچتا ہے بچانا نہایت اہم ہوتا ہے تاکہ یہ عضلہ بعد میں بھی بطور باسطہ کے فعل کر سکے۔ عضلہ عضدیہ کے منہی کو کاٹنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی اور ذوراسین کے منہی کو کاٹنے کی اس سے بھی کم ضرورت ہوتی ہے، گو قبل الذکر کے چند ریشے زند کی بالائی سطح کو دور کرتے وقت علحدہ کئے جاسکتے ہیں۔ ان تمام حصوں پر سے جبکہ استیصال جزئی منظور ہوتا ہے گرد عظمہ زیر گرد عظمی طریقہ سے با احتیاط اتار لیا جاتا ہے اور اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس طریقہ سے مثلثۃ الرؤس کا اثر زند پر باقی رہتا ہے اور جوڑ کی تجدید زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ استیصال جزئی کے بعد خاص کر جب کہ یہ زیر گرد عظمی طریقہ سے سرانجام دیا جائے جوڑ کے افعال بخوبی بحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مفصل کی تشریحی تفصیل کسی طریقہ سے بھی واپس

نہیں آتیں۔ چنانچہ کامیاب عملیہ میں نیا جوڑ ذو کعبیتی (bimalleolar) شکل اختیار کر لیتا۔ اور کہنی کے جوڑ کی نسبت ٹخنے کے جوڑ سے زیادہ مشابہ ہوگا۔ ذراعیہ سے طبعی قندالوں کی جگہ دو کعبیے پیدا ہو جاتے ہیں اور انکے درمیان قعر میں زند اور کعبہ واقع ہوتے ہیں۔ زند اور ذراعیہ کے درمیان جدید رابطات پیدا ہو جاتے ہیں اور کعبہ کے لئے ایک نیا حلقہ نار باط بنجاتا ہے۔ بخلاف اسکے اگر جۃ ناگزیر ہو تو ایسے ذرائع ضرور اختیار کرنے چاہئیں جن سے تثبیت موزوں ترین زاویہ پر واقع ہو۔ تجویز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جاسی کہنی اس وقت مفید ترین ثابت ہوتی ہے جبکہ پیش بازو بازو پر تقریباً ۶۰ درجہ کے زاویہ پر قائم کر دیا گیا ہو۔ اس زاویہ پر ہاتھ منھ تک لایا جاسکتا ہے۔ ہاتھ حالت بطح میں ہونا چاہئے۔ اگرچہ یہ وضع نسبتاً بدنام دکھائی دیتی ہے، مگر جارحہ مبطلوح حالت ہی میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ حالت کبائ حسب خواہش میان کتفی صدری حرکات سے حاصل کیجا سکتی ہے۔

کہنی پر بڑے بڑے اعصاب کا محل - عضل مرغولی - (musculo-spiral)

(spiral : کعبی : radial) عصب خارجی سر قندال کے سامنے عضدیہ کعبیہ (brachio-radialis) کے نیچے پایا جاتا ہے جہاں یہ موضعین النظامی (posterior interosseus) اور کعبی زیر جلدی (radial subcutaneous) شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عصب سلمی (median) شریان عضدی کے اندرونی کنارہ پر واقع ہوتا ہے اور زندی (ulnar) عصب داخلی سر قندال کے پیچھے کے میزاب میں موجود ہوتا ہے (دیکھو صفحہ 313)۔

باب چہارم پیش بازو

(THE FOREARM)

سطحی تشریح۔ یہ جارحہ اپنے بالائی نصف پر اور خاص کر بالائی ثلث پر مستعرض قشر میں مقدم موخر قطر کی نسبت زیادہ چوڑا ہوتا ہے۔ اس مقام پر کی تراش کا خاکہ کسیندر بیضوی ہوتا ہے اور نیز یہ سامنے کی طرف سے چپٹا اور پیچھے کی طرف سے محدب ہوتا ہے۔ یہ خاکہ قوی العضلات موضوعات میں بہترین طور پر نظر آتا ہے اور اسکا انحصار زیادہ تر عضلات کے ان جانبی تودوں پر ہے جو سر قندالوں سے نیچے اترتے ہیں۔ ضعیف العضلات اشخاص میں اس جارحہ کے خاکہ کا رجحان بلند ترین حصہ پر بھی بیضوی ہونے کی بجائے مدور ہونے کی طرف ہوتا ہے۔ مزید برآں عورتوں اور بچوں میں یہ جارحہ جانبی عضلی تودوں کے بہت کم نمو یافتہ ہونے اور سامنے کی اور پیچھے کی طرف چربی جمع ہونے کی وجہ سے گول ہوتا ہے۔

مضبوط موضوع میں پیش بازو کی موخر سطح کے باہر کے کنارے پر ایک ارتفاع پایا جاتا ہے جو عضلہ عضد یہ کعبریہ (brachio-radialis) اور دو کعبریہ باسط عضلات (radial extensors) سے بنتا ہے اور یہ عضلات اس کنارے کے وسط سے نیچے وتری ہو جاتے ہیں۔

اس کنارہ کے زیریں ثلث پر ایک چھوٹا سا فراز ہوتا ہے جو ترچھے رخ میں نیچے کی اور باہر کی اور آگے کی طرف کو جاتا ہے۔ یہ فراز انگوٹھے کے باسط عضلات کے گزرنے سے بنتا ہے۔ موخر سطح کے وسط پر ایک اور ارتفاع ہوتا ہے جو بیرونی (جانبی) قندال سے نیچے کی طرف آتا ہے اور یہ زیادہ تر باسط مشترکہ (extensor communis) سے بنتا ہے۔ اس فراز کے اندر کی طرف ایک میزاب ہوتا ہے جو بہت قوی العضلات اشخاص میں اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ زند کے موخر نظری کنارہ کو ظاہر کرتا ہے۔

327

زند شروع سے لیکر آخر تک زیر جلدی ہوتی ہے اور اسکا امتحان آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ کعبہ کا بالائی نصف حصہ آنا گہرا واقع ہوتا ہے کہ آسانی شناخت نہیں کیا جاسکتا، لیکن اس لمبی کا زیریں نصف حصہ جلد کے نیچے آسانی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

کبری شریان کا ممر اس خط سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو کہنی کے خم پر سے ذور اسین کے وتر کے بیرونی کنارہ سے لیکر کعبہ کے زائندہ ابریہ (styloid process) کے سامنے تک کھینچا جائے۔ نبض زائندہ ابریہ اور عضلہ قابضہ رسغیہ کبریہ (flexor carpi radialis) کے وتر کے درمیان محسوس کیجاتی ہے جہاں یہ کعبہ کے بعدی سرے پر ممکن ہوتی ہے۔ زندی شریان اس خط کی متابعت کرتی ہے جو خفیف سے بیرونی انفقار کے ساتھ پیش مرفعی حفرہ کے وسط سے لیکر اس خط کے وسطی اور بالائی ایک تہائی حصوں کے مقام اتصال تک کھینچا جائے جو اندرونی سرقندال کو عظم مشنگ (pisiform bone) کی کبری طرف سے ملاتا ہوا اسکے بعد یس دوسرے خط کی متابعت کرتی ہے۔ زندی عصب اس سرقندالی مشنگی خط کے تمام طول کا متناظر ہوتا ہے۔

ان اوتار وغیرہ کا ذکر جن کا مظاہرہ پیش بازو کے نیچے کے سرے پر کیا جاسکتا ہے پونچے کے بیان میں کیا جائیگا۔

عروق۔ کبری شریان کا اوپر کا حصہ عضلہ عضدیہ کبریہ (باطحہ طول)

کی اندر کی کور کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ گری پیش بازو کے زیریں حصہ میں یہ اس عضلہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی بلکہ اسکے وتر اور عضلہ قابضہ رسغیہ کبریہ (flexor carpi radialis) کے وتر کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اوپر سے لیکر نیچے تک اسکے گہرے تعلقات یہ ہیں: ذور اسین کا

وتر - عضل باطنی قصیر (supinator brevis) عضلہ کا بہ مدللجہ کعبیہ (pronator radii teres) - عضلہ قابضہ سطحیہ اصبعیہ (flexor sublimis digitorum) کا کعبی سر - عضلہ قابضہ طویلہ ابهامیہ (flexor longus pollicis) عضلہ کا بہ مرجسہ (pronator quadratus) اور کعبہ - اسکے خط کے اوپر شکاف دیکر اور عضلہ عضدیہ کعبیہ کو باہر کی طرف ہٹا کر اسے آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

زندگی شریان (ulnar artery) اُس خط کی متابعت کرتی ہے جس کا ذکر

پہلے کیا جا چکا ہے۔ اپنے بالائی ایک تہائی ترچھے حصہ میں یہ عضلہ کا بہ مدللجہ کعبیہ (pronator radii teres) کے دونوں سروں کے نیچے گہری چلی جاتی ہے! اور یہاں یہ عصب وسطی سے اس عضلہ کے گہرے سر سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ عضلہ قابضہ اصبعیہ عمقیہ (flexor profundus digitorum) کے اوپر سے اور عضلہ قابضہ رسنغیہ کعبیہ (flexor carpi radialis)، عضلہ راحیہ طویلہ (palmaris longus) اور عضلہ قابضہ اصبعیہ سطحیہ (flexor sublimis digitorum) کے نیچے سے گذرتی ہے۔ نیچے کا انتصابی دو تہائی حصہ عضلہ قابضہ رسنغیہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) کے نیچے ہوتا ہے، سوائے اس حصہ کے جو پہونچنے کے قریب ہوتا ہے اور جو عضلہ قابضہ رسنغیہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) اور عضلہ قابضہ اصبعیہ سطحیہ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ ان عضلات میں سے قبل الذکر اندر کی طرف اور موخر الذکر باہر کی طرف ہوتا ہے۔ زندگی عصب اس شریان کے زیرین دو تہائی حصہ کی اندرونی طرف کے ساتھ ساتھ واقع ہوتا ہے۔

کعبی اور زندگی شریان کے درمیان نفہم نہایت کثرت سے واقع ہوتا ہے اور یہ انکے تقریباً تمام ممروں میں پایا جاتا ہے۔ لہذا ایسا اکثر ہوتا ہے کہ نرف کو بند کرنے کے لئے کٹے ہوئے عرق کے دونوں سروں کا باندھنا ضروری ہوتا ہے۔

پیش بازو کی موخر (ظہری) جانب پر بڑے بڑے عروق اور اعصاب کا ایک خالص فقدان پایا جاتا ہے، اور یہ اس لحاظ سے ایک معنی خیز امر ہے کہ جارحہ کی یہی جانب ضرر کے لئے سب سے زیادہ معرا رہتی ہے۔ نرف سے نیچے کف دست کے برابر چوڑے حصہ پر سطحی وریڈین تقریباً مکمل طور پر غائب ہوتی ہیں۔


وسطی عصب عضلہ کا بہ مدلیہ (pronator teres) کے عضدی اور زندگی

سروں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ پونہچے پر یہ عصب عضلہ قابضہ رنغیہ کبریہ (flexor carpi radialis) اور عضلہ قابضہ اصبعیہ سطحیہ (flexor digitorum sublimis) کے وتروں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور عضلہ راحیہ طویلہ (palmaris longus) کے وتر سے جو اسکا محل معلوم کرنے کے لئے ایک مفید رہنما کام دیتا ہے یہ گہرا واقع ہوتا ہے۔ اس عصب کو ضرر پہنچنے سے جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں انکا ذکر صفحہ 376 پر کیا گیا ہے۔

پیش بازو کی ہڈیاں۔ جارحہ کے مختلف لیولوں پر تراش کاٹنے سے بیظاہر

ہوتا ہے کہ کعبہ اور زند اسکے تمام حصوں میں راحی جانب کی نسبت ظہری جانب کے زیادہ قریب ہوتی ہیں (شکل ۷۲ و ۷۳)۔ تراش جتنی بلند ہوگی یہ تعلق اتنا ہی نمایاں ہوگا۔ جارحہ کے وسطی ثلث کے نرین یا اسکے بعدی سرے کے قریب دونوں ہڈیاں اسکے مرکز کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ پیش بازو کے بالائی یا قریبی حصہ پر عضلات زیادہ تر اطراف پر یا سامنے کی طرف پائے جاتے ہیں۔ تراش جتنی بعدی ہوگی ہڈیاں اطراف پر اتنی ہی کم پوشیدہ ہونگی اور نرم حصے جارحہ کی راحی اور ظہری جانبوں پر اتنی ہی زیادہ مساوات سے منقسم ہونگے۔ یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ جہاں ایک ہڈی زیادہ موٹی ہے وہاں دوسری زیادہ پتلی ہے، جیسا کہ کہنی اور پونہچے کے قریب ہوتا ہے۔ نیز جارحہ کے وسط پر دونوں ہڈیاں مضبوطی میں ایک دوسرے کے تقریباً برابر ہوتی ہیں۔ دونوں ہڈیوں کے اور خاص کر زند کے جارحہ کی ظہری جانب کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے انکا امتحان اس طرف کی سطح سے آسانی کیا جاسکتا ہے اور اسی جانب سے ہڈیوں کے اتصالات جزئی اور دوسرے عملیہ جات نہایت آسانی سے سرانجام دئے جاسکتے ہیں مزید برآں اس سے یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ مرکب کسور میں ٹکڑوں کے باہر نکل آنے سے جو زخم پیدا ہوتا ہے وہ عام طور پر جارحہ کی ظہری جانب پر ہی واقع ہوتا ہے۔ الکباب (pronation) اور بطح (supination) کی اہم حرکتیں انہی ہڈیوں کے درمیان اس محور پر واقع ہوتی ہیں جو اس خط کا متناظر ہوتا ہے جو کعبہ کے سر اور زند کے بعدی سرے اور جھگی کی بعد رنغی ہڈی میں سے گزرتا ہو۔ انتہائی الکباب میں کعبہ زند پر سے ترچھی گزرتی ہے اور مقام تقاطع پر دونوں ہڈیاں

ایک دوسرے سے تقریباً مس کرتی ہیں اور بین العظامی غشتا کے نیچے کے ریشے اور زہری کبیری زندگی رباط
تتار ہوتا ہے۔ "بطح (supination) کے روکنے میں کسی رباط کو حقیقی دخل قطعاً حاصل نہیں ہوتا
بلکہ یہ حرکت کعبہ کے زندگی کٹاؤ کی موخر کور کے عضل باسطہ رسغیہ زندیہ (extensor carpi
ulnaris) کے وتر سے مس کرنے سے کرتی ہے جو زند کے زائدہ ابریہ اور اس کے گول سر کے درمیان



شکل ۲۔ پیش بازو کے وسط میں سے مستعرض تراش۔

(برٹون: Braune کے مطابق)

390 واقع ہوتا ہے" (سر- ایچ مورس: Sir H. Morris) دونوں حرکتوں میں بطح (supination)

زیادہ قوی ہوتا ہے اور بہت سی مثالوں سے اسکی توضیح ہوتی ہے۔ بیچ کش یا برے کا استعمال
کرتے وقت بطح اور اکباب کی دونوں حرکتیں نمایاں طور پر عمل میں آتی ہیں لیکن اصلی طاقت
کا استعمال حالت بطح ہی میں کیا جاتا ہے۔ یہ امر بھی معنی خیز ہے کہ گاہ بیچ کامرغولہ اس طرح
بنا ہوتا ہے کہ وہ حرکت اکباب کی بجائے حرکت بطح ہی سے اندر جاتا ہے۔

صرف ایک ہی وضع ہے جس میں دونوں ہڈیاں آپس میں تقریباً متوازی ہوتی ہیں

اور یہ بطح کی حالت ہے۔ مزید برآں اگر سختی واقع ہو جائے تو حالت اکباب یا وسطی حالت کی نسبت حالت بطح میں تثبیت ہونے سے باز و زیادہ کار آمد ثابت ہوتا ہے۔ اسی لئے پیش بازو کے بہت سے کسور کو درست کرنے کے لئے یہی وضع منتخب کیجاتی ہے۔ بین العظامی فضا ہیلیمی شکل کی ہوتی ہے اور نیچے کی طرف یہ اوپر کی طرف سے ذرا بڑی ہوتی ہے۔ مکمل اکباب میں تنگ ترین ہو جاتی ہے اور بطح میں یہ سب سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے اور وسطی حالت میں بھی یہ اتنی ہی چوڑی ہوتی ہے۔

یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ترچھے کعبی زندگی رباط کا میلان ان توتوں کی مزاحمت کرنے کی طرف ہوتا ہے جو کعبہ کو ذراعیہ سے دور کھینچتی ہیں۔ یہ ذراعیہ سے کعبہ کی طرف کو جاتا ہے اور یہ بمنزلہ ایک بلا واسطہ رباط کے ہے اور اسی کا فعل سر انجام دیتا ہے اور بین العظامی رباط اپنے ریشوں کے ترچھے پن کی وجہ سے زندگی کعبہ کے اس بار کے برداشت کرنے میں شریک ہونے پر مجبور کرتا ہے جبکہ یہ ہڈی اوپر کی طرف کو دھکیلی جا رہی ہو جیسا کہ تھیلی کے سہارے سے آرام کرنے یا اس سے دھکیلنے کی حالت میں ہوتا ہے۔

۳۳۱ کلائی کے کسور - کعبہ یا زندگی علیحدہ علیحدہ ٹوٹنے کی نسبت اکثر اکٹھی ٹوٹتی

ہیں۔ جب کعبہ اکیلی ٹوٹتی ہے تو ایسا بالعموم کسی بلا واسطہ ضرب سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام صدمے جو ہاتھ سے منتقل ہوتے ہیں کم و بیش مکمل طور پر اس تک پہنچتے ہیں۔ عکس اس کے زندگی اکثر بلا واسطہ ضرب سے ٹوٹتی ہے کیونکہ یہ دونوں ہڈیوں میں سے زیادہ سطحی اور زیادہ معرا ہوتی ہے، مثلاً سر کی چوٹ کو روکنے کے لئے جب بازو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو زندگی سب سے اوپر ہوتی ہے۔ قدیم مصریوں میں جو کلہاڑی چلانے کے بہت دلدادہ تھے زندگی بعدی سرے کا کسر بہت عام تھا، جیسا کہ ایلینٹ سمتھ (Elliot Smith) اور وڈ جونز (Wood Jones) کی تحقیقات سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ جب دونوں ہڈیاں اکٹھی ٹوٹتی ہیں تو چوٹ بعض اوقات بلا واسطہ ہوتی ہے اور بعض اوقات بلا واسطہ۔ جب دونوں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور کسور ترچھے ہوتے ہیں تو قابض اور باسط عضلات کے متحدہ فعل سے قصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غیر وضعیت بہت اختلاف پذیر ہوتی ہے اور عضلی فعل کی نسبت زیادہ تر ضرب کی سمت پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر اتحاد آجل ہو تو تاخیر بالعموم کعبہ میں پائی جاتی ہے، کیونکہ دونوں ہڈیوں میں سے یہی

زیادہ حرکت پذیر ہوتی ہے۔

جب اکیلی کعبہ (۱) ذوراسین اور عضلہ کا بہ مدلمجہ (pronator teres)

کے منتہاؤں کے درمیان ٹوٹی ہے تو ذوراسین اوپر کے ٹکڑے کی خم کردگی پیدا کر دیتا ہے اور یہ اور عضلہ باطمہ قصیرہ (supinator brevis) اسکو مکمل بطح کی حالت میں لے آتے ہیں۔ نیچے کے ٹکڑے کو دونوں عضلات کا بہ اکباب کی حالت میں لے آتے ہیں اور اسے کیسینج کر زند کی طرف لے آتے ہیں۔ اگر ایسا کمر اس طرح باندھا دیا جائے کہ ہاتھ اکباب اور بطح کی حالتوں کے عین درمیان ہو تو مندرجہ ذیل خرابیاں پیدا ہونگی۔ اوپر کا ٹکڑا ان عضلات کی وجہ سے مکمل بطح کی حالت میں رہتا ہو اور نیچے کا ٹکڑا جمیروں کی وجہ سے وسطی وضع میں رہتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہڈی کا اصلی محور بار دیگر قائم نہیں کیا جاتا اور ذوراسین اور عضلہ باطمہ کا فعل بطور عضلات باطمہ کے باطل زائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جن مریضوں کا علاج اس طریقہ پر کیا جائے انہیں صحت ہونے پر قوت بطح بہت حد تک زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس نتیجہ سے استرا کر کے لے جارجہ کو مکمل بطح کی حالت میں باندھا جائے تاکہ دونوں ٹکڑے اپنے مناسب محور پر متحد ہو سکیں۔ اوپر کا ٹکڑا ان عضلات سے مکمل بطح کی حالت میں ہوتا ہے اور نیچے کا جمیروں سے اس حالت میں رہتا ہے۔

332

(۲) جب کمر دونوں عضلات کا بہ کے منتہاؤں کے درمیان واقع ہو تو ذوراسین اور عضلہ کا بہ مدلمجہ اوپر کے ٹکڑے کو ذرا آگے کی طرف کو کیسینج لیتے ہیں اور موخر الذکر عضلہ اسکو زند کی طرف کیسینج لیتا ہے۔ نیچے کے ٹکڑے کو عضلہ کا بہ مربعہ (pronator quadratus) زند کی طرف مقرب کر دیتا ہے اور اسکا اوپر کا سرا عضلہ عضلہ کعبہ کے زائدہ ابرہ پر فعل کرنے کی وجہ سے اس ہڈی کے اور بھی زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ عضلہ کا بہ مدلمجہ (pronator teres) کا جو فعل اوپر کے ٹکڑے پر ہوتا ہے اس پر ذوراسین کی قوت باطمہ اس حد تک غالب آ جاتی ہے کہ قبل الذکر کمر کا فعل کسی شمار ہی میں نہیں آتا اور اس حالت میں بھی مکمل بطح کی حالت میں جمیہ باندھا جاتا ہے۔

جب اکیلی زند ٹوٹی ہے مثلاً جب کمر تقریباً وسط میں واقع ہو تو عضلہ عضلہ قریبی

ٹکڑے کو بعض اوقات ذرا آگے کی طرف کو کیسینج لیتا ہے اور عضلہ کا بہ مربعہ (pronator quadratus) نیچے کے ٹکڑے کو کعبہ کی طرف کو لے آتا ہے۔

ذبولی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح بے کار ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت عضلات کے کسی گروہ میں بھی پیدا ہو سکتی ہے بشرطیکہ ان پر شدید اور مسلسل دباؤ ڈالا جائے، جیسا کہ پیٹیوں کے حد سے زیادہ کس کر باندھینے یا کہنی یا گھٹنے کو انتہائی خم کر دگی کی حالت میں بہت عرصہ تک رکھ چھوڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جمیروں اور پیٹیوں کے غیر مناسب استعمال سے کسور کا علاج کرنے میں جو تہج جارہے میں فوراً نمودار ہو جاتا ہے اسکی پیدائش کی توجیہ اس امر سے ہوتی ہے کہ وریدی خون کا زیادہ تر حصہ سطحی وریدوں کے ذریعہ سے واپس جاتا ہے۔

شکل ۷۳ سے حصوں کا جس طرح کہ یہ پیش بازو کے بعدی ثلث پر کے مدور بتر میں کاٹے جاتے ہیں تعلق ظاہر کیا گیا ہے۔

باب پانزدہم

پوہنچا اور ہاتھ

(THE WRIST AND HAND)

سطحی تشریح۔ پوہنچے پر مندرجہ ذیل ساختوں کی شناخت کیجا سکتی ہے۔ کعبی طرف سے شروع کر کے کعبہ کا نیچے کا سرا اور زائدہ ابریہ اچھی طرح سے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ یہ ہڈی یہاں پرانگے کی اور پیچھے کی جانب پر سطحی ہوتی ہے اور مذکورہ زائدہ ابریہ زند کے قناظر زائدہ کی نسبت زیادہ تر راجی جانب کی طرف واقع ہوتا ہے اور نیز یہ ہاتھ کی طرف کو تقریباً ۱/۲ انچ زیادہ نیچے اترتا ہوتا ہے۔ کالس کے کسر (Colles's fracture) کی تشخیص کرنے میں یہ امر عظیم الالہیت ہے، کیونکہ اس حادثہ میں زوائد ابریہ اکثر ایک ہی لیول پر آجاتے ہیں۔

پوہنچے پر کعبہ کی بیرونی یا جانبی سطح پر سے عضلہ مبعده ابہامیہ طویلہ (abductor longus pollicis) اور عضلہ باطلہ ابہامیہ قصیرہ (extensor brevis pollicis) کے وتر گزرتے ہیں۔ جب انگوٹھا تبعید کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ بہت نمایاں ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان کا درز نما وقفہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔

پوہنچے کی راجی جانب پر اسکے وسط کے قریب عضلہ راجیہ طویلہ (palmaris longus)

کا وتر ہوتا ہے اور یہ ان تمام اوتار سے جو بوز کی اس جانب پر واقع ہوتے ہیں عام طور پر سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ جن پونہچوں کا امتحان کیا گیا ہے انہیں سے تقریباً ۱۰ فیصد میں یہ غائب پایا گیا ہے۔ جب پونہچا ذرا ختم کردہ ہوا اور انگلیاں اور انگوٹھا بسط کردگی کی حالت میں ہوں، اور فرازات ابہام و خنصر حتی الامکان ایک دوسرے کے قریب ہوں تو یہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اس سے ذرا باہر کی طرف عضل قابضہ رسنیہ کبریہ (flexor carpi radialis) کا وتر ہوتا ہے جو جسامت میں بڑا کم و واضح ہوتا ہے۔ ان دونوں وتروں کے درمیان جو تنگ میزاب ہے اس میں عصب وسطی واقع ہوتا ہے اور عضل قابضہ رسنیہ کبریہ (flexor carpi radialis) کی کبریہ جانب پر کبریہ شریان جاتی ہے۔ رفیق وریدی اس شریان کے گردا گرد ہوتی ہیں اور جب یہ متدد ہو جاتی ہیں تو نبض کی نوعیت کو بدل دیتی ہیں (ہل Hill)۔ بعض اوقات سطحی اجمی (superficial volar) زیادہ اونچے مقام سے نکلتی ہے اور معمول کی نسبت بڑی ہوتی ہے اور کبریہ کے ساتھ ساتھ پونہچے کے سامنے کیرطف سے گزرتی ہے۔ اس حالت میں یہ نبض کے حجم کو زیادہ کر دیتی ہے اور ”نبض مضاعف“ (double pulse) کے پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہے۔ پونہچے کے زندگی کنارے کی طرف عضل رسنیہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) کا وتر عظم مشگلہ (pisiform bone) کی طرف آتا ہوا نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جب پونہچا خفیف سا خم کردہ ہو اور چھنگلی ہتھیلی کی طرف کو زور سے دبائی ہوئی ہو تو یہ نہایت واضح ہوتا ہے۔ اس وضع میں جو گرلھا موخر الذکر وتر اور عضل راحیہ طویل (palmaris longus) کے درمیان پایا جاتا ہے اس میں عضل قابضہ سطحیہ (flexor sublimis) کا وتر ہوتا ہے اور عضل قابضہ رسنیہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) کی عین کبریہ طرف کو زندگی شریان کے ضربات محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ پونہچے کی راحی سطح کی بوٹی جلد کے نیچے وریدوں کے ایک ضعیفہ کا کچھ حصہ نظر آتا ہے جو وسطی (median) اور راحی (volar) زندگی تنوں پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ زندگی عصب ایک میزاب میں واقع ہوتا ہے جو عظم مشگلہ کی کبریہ جانب پر ہوتا ہے۔

335

پونہچے کی پشت پر سے مستعرضا گزرتے وقت مندرجہ ذیل خصائص (شکل ۷۷) آسانی دکھائی دیتے ہیں خاص کر جبکہ انگوٹھے اور انگلیوں کی زور سے بسط کردگی اور تبعید کی گئی ہو۔ مسطہ (tabatière) یا تنیکی ناسانی (anatomical snuff box) جو ایک عمیق جوف ہے (دیکھو صفحہ 339) اگلی طرف سے عضل مبعده ابہامیہ طویل (abductor longus pollicis)

اور عضل باسط ابہامیہ قصیرہ (extensor brevis pollicis) کے وتروں سے جو قریب طور
مقرب ہوتے ہیں محدود ہوتا ہے اور پونچے کی طرف سے یہ عضل باسط ابہامیہ طویل (extensor
longus pollicis) (عضل باسط سلامیہ ثانیہ: extensor secundi internodii) کے
بہت نمایاں وتر سے محدود ہوتا ہے۔ یہ وتر ایک چھوٹے سے نمایاں عظمی ارتفاح کی طرف رہنمائی کرتا
ہے جو کعبہ کی پشت پر واقع ہوتا ہے اور یہ اس عظمی میزاب کے بیرونی کنارہ کی نشان دہی کرتا ہے
جس میں یہ وتر پایا جاتا ہے۔ کعبہ پر پہنچ کر یہ وتر اسکی ٹھری سطح کے وسط کو ظاہر کرتا ہے اور
زورقی (navicular) (سفینیہ scaphoid) اور قمری (lunate) (نیم قمری: semilunar)
ہڈیوں کے درمیانی فاصلہ کو تنہا ظاہر کرتا ہے۔ دو اور وتر بھی دکھائی دیتے ہیں مگر وہ اتنے نمایاں طور
پر نظر نہیں آتے۔ یہ عضل باسط مشترکہ (extensor communis) اور عضل رستب زندیہ
(extensor carpi ulnaris) کے وتر ہیں۔

زند کا نیچے کا سرا بہت نمایاں ہوتا ہے۔ جب ہاتھ بطح کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا
زائدہ ابریہ پونچے کی وسطانی ٹھری سطح پر عضل باسط رستب زندیہ (extensor carpi ulnaris)
کی وسطانی جانب منتشر ہوتا ہے مگر حالت اکباب میں زائدہ کم نمایاں ہو جاتا ہے اور اسکا سر
پونچے کی پشت پر نمایاں طور پر نکلتا ہے اور یہ عضل باسط رستب زندیہ (extensor carpi
ulnaris) اور عضل باسط خنصریہ (extensor digiti quinti) کے وتروں کے درمیان

336

کعبی رستب جوڑ (پونچے کا جوڑ)۔ زند کے زائدہ ابریہ کی نوک پونچے


کے جوڑ کے خط کی متناظر ہوتی ہے اور اگر اس مقام کے نیچے چاقو داخل کیا جائے تو یہ اس
مفصل میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کعبہ کے زائدہ ابریہ کی عین بعدی طرف پر چاقو افقی سمت میں
داخل کیا جائے تو وہ سفینیہ (scaphoid) سے ٹکرائے گا۔ اگر دونوں زوائد ابریہ کے درمیان
خط کھینچا جائے تو وہ نیچے کی اور باہر کی طرف کو مائل ہوگا اور اسکے دونوں سرے کعبی رستب
جوڑ کے انتہائی تحتانی حدود کو ظاہر کریں گے اور ایک کافی حد تک اس قوس کے وتر کے متناظر
ہونگے جو اس جوڑ کے خط سے بنتی ہے۔ زوائد ابریہ کا درمیانی خط پونچے کی محراب کی چوٹی سے
نصف انچ پرے ہوگا۔

پونچے کی کئی جانب کی جلد میں بہت سے شکن ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعدی نمایاں ترین ہوتا ہے۔ یہ نیچے کی طرف کو ذرا محدب ہوتا ہے اور عظم کبیر (os magnum) عظم تار کی (capitate bone) کی گردن کو تیسری بعد رسنی ہڈی کے لفظ میں ٹھیک ٹھیک کاٹتا ہوا گزرتا ہے (ٹکو: Tillaux)، اور پونچے کے جوڑ کی محراب کی بعدی جانب پر یہ ہم انچ سے ذرا کم فاصلہ پر واقع ہوتا ہے۔ رسنی بعد رسنی جوڑ سے یہ تقریباً ۱ انچ کے فاصلہ پر قریبی جانب کی طرف واقع ہوتا ہے اور مستعرض رسنی (مقدم حلقہ) رباط کو یہ ایک کافی صحیح حد تک ظاہر کرتا ہے (شکل ۷۸ صفحہ ۳۴۷)۔

ہاتھ کی کئی سطح — ہتھیلی اپنے وسط میں جہاں جلد کئی صفاق سے منقسم

ہوتی ہے مقرر ہوتی ہے۔ ہتھیلی کے اس گڑھے کا خاکہ تقریباً مثلث نما ہوتا ہے اور اس کا راس باہر کی طرف کو ہوتا ہے۔ اس کی ایک طرف فرار ابہام اور ایک طرف فراز خنصر ہوتا ہے۔ قبل الذکر ارتفاع کے قریبی سرے پر کعبی زائیدہ ابریہ کی بعدی اور وسطانی جانب پر ایک عظمی مریمیہ نکسپس کیا جاسکتا ہے، جو سفینیہ (scaphoid) کے درنہ اور عظم منحرف (trapezium) (کثیر الزوایا کبیر: multiangulum majus) کے اوپر کے حید سے بنتا ہے (شکل ۷۸)۔ ہڈی کے ان دونوں زائیدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ فراز خنصر کے قریبی سرے پر عظم مشنگ (pisiform bone) کا مریمیہ ہوتا ہے اور اس کے عین نیچے کلاب نما ہڈی (unciform) (خفانی: hamate) زائیدہ شناخت کیا جاسکتا ہے۔ ہتھیلی کے گڑھے کی بعدی جانب پر اور چاروں انگلیوں کی درمیان گھائیوں کے مقابل تین چھوٹے چھوٹے ارتفاعات دیکھنے میں آتے ہیں خاص کر قریبی سلامیات بسطہ کی درمیانی حالت میں ہوں اور وسطی اور بعدی سلامیات خم کردہ ہوں۔ یہ اتار قابضہ کے درمیان کی شیمی بافت اور کئی صفق کی اصبعی دھبوں کے متناظر ہوتے ہیں اور جو میزاب ان ارتفاعات کو علیحدہ کرتے ہیں وہ انہی دھبوں کے متناظر ہوتے ہیں۔ جب ہاتھ بند کیا جاتا ہے تو ہتھیلی میں بعض خاص جھریاں یا شکن نمودار ہو جاتے ہیں۔ بسطہ کردہ ہاتھ کی ہتھیلی میں یہ جھریاں لکیروں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں بیکار لوگوں نے خوش اعتماد اشخاص سے انکی بدولت بہت بیجا فائدہ اٹھا یا ہے۔ لیکن جراح کے لئے یہ گہری ساختوں کے لئے صرف سطحی رہنماؤں کا کام دیتی ہیں۔ انہیں سے دو جھریوں — قریبی مستعرض اور بعدی مستعرض —

کا رخ مستعرض ہوتا ہے (دیکھو شکل ۷۴) جب انگلیوں کو ہتھیلی پر خم کیا جاتا ہے تو یہ دونوں بھریا شجکوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دوجے شجک کبریٰ ترچھا اور زندگی ترچھا (جو اکثر



شکل ۷۴۔ ہتھیلی کے سسطی نشانات۔

موٹے سیاہ خطوط ہتھیلی کے خطوط کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبریٰ اور زندگی شریانوں کا اعتماد دکھایا گیا ہے، جو سسطی اور عمیق راسی مھراؤں پر جھکا ہے۔

متوقف ہوتے ہیں) اسوقت نمایاں ہوتے ہیں جبکہ انگوٹھا (انگوٹھوں کے مقابل لایا جائے یا انکی طرف خم کیا جائے۔ قریبی مستعرض شجک ہتھیلی کے وسط کو عبور کرتا ہوا سسطی کئی مھراب کے اندھاب کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعدی مستعرض شجک پانچویں پوٹھی اور تیسری بعدی سسطی ہڈیوں کی گردنوں پر سے گزرتا ہے اور ہاتھ کی زندگی طرف کے تین اصابع کے زلابی ملاقوں کی ابتدا کو


کسی حد تک نما ہر کرتا ہے۔ بعدی استعرض خط کے متناظر لیول پر کئی صفاق (palmar aponeurosis) (ردا: fascia) چار دھبیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اس شکن اور انگلیوں کی درمیانی جلد کے عین درمیان بعد رسنی سلامی (metacarpo-phalangeal) جوڑو واقع ہوتے ہیں۔ انگلیوں کی قابض طرف پر جو تین استعرض خط ہوتے ہیں ان سے قریبی بعد رسنی سلامی جوڑ سے ۳/۴ انچ آگے (بعدی جانب کی طرف) واقع ہوتا ہے۔ انگشت اشاریہ اور چھبکی پر کئی خط مفرد ہوتا ہے لیکن وسطیٰ اور بنصر پر کا ڈھرا ہوتا ہے۔ انگلیوں کے وسطیٰ اور بعدی خط میان سلامی شکن ہیں۔ سب انگلیوں کے وسطیٰ خطوط دبے ہوتے ہیں اور قریبی میان سلامی جوڑوں کے عین بالمقابل واقع ہوتے ہیں (شکل ۷۴)۔ بعدی شکن مجرد ہوتے ہیں اور متناظر جوڑوں کی ذرا بعدی جانب پر واقع ہوتے ہیں۔ انگوٹھے پر دو مجرد لکیریں ہوتی ہیں، جو دونوں جوڑوں کی متناظر ہوتی ہیں۔ قریبی لکیر بعد رسنی سلامی جوڑ پر سے ترچھے رخ میں گزرتی ہے۔

سطحی راحی محراب (superficial volar arch) ہتھیلی پر سے ایک خمیدہ خط کھینچنے سے ظاہر کیجا سکتی ہے جو عظم مشنگ سے شروع کر کے انگوٹھے کے کئی کنارہ کی سیدھ میں آگے بڑھا دیا جاتا ہے جبکہ انگوٹھا انگشت اشاریہ سے زاویہ قائمہ پر باہر کی طرف کو تنہا ہو۔ عمیق محراب سطحی کی نسبت پونچھ سے ۱/۲ تا ۱/۳ انچ زیادہ قریب ہوتی ہے اور اس کے محل کی نشاندہی اس خط سے کیجاتی ہے جو پانچویں بعد رسنی ہڈی کے قاعدہ سے لیکر دوسری بعد رسنی ہڈی کے قاعدہ تک کھینچا جائے اور یہ دونوں مقامات باسانی شناخت کئے جاسکتے ہیں۔ راحی اصبعی شریانیں انگلیوں کی گھائیوں کی قریبی جانب پر ان سے ۱/۲ انچ کے فاصلہ پر دو دوتاؤ میں تقسیم ہوتی ہیں۔

ہاتھ کی ظہری سطح۔ جب انگوٹھا باسط کر دگی کی حالت میں ہو تو ہتھیلی کی کعبری

جانب پر عضلہ متحدہ ابہامیہ طویل (abductor longus pollicis) اور عضلہ باسطہ ابہامیہ قصیرہ (extensor brevis pollicis) اور عضلہ باسطہ ابہامیہ طویل (extensor longus pollicis) کے درمیان ایک گڑھا دکھائی دیتا ہے۔ فرانسیسی مصنفین نے اس گڑھے کو ”قشری مسط“ (tabatiere anatomique) کے نام سے موسوم کیا ہے (شکل ۷۵)۔ کعبری شریان اس گڑھے کو عبور کرتی ہے اور مذکورہ بالا اوتار کے نیچے ہوتی ہے۔ لہذا یہ گہری

واقع ہوتی ہے اور کعبی رسی جوڑکے خارجی جانبی رباط پر پائی جاتی ہے۔ اسکے بعد یہ سفینیہ (scaphoid) اور عظم منحرفہ (trapezium) کے اوپر سے نیچے کی طرف کو چلی جاتی ہے اور انجام کار پہلی بین العظامی فضا میں سے پہلے بین العظامی عضلہ کے سروں کے درمیان سے گزر کر



شکل ۵۔ پونچھ کی ظہری جانب کے اہم سطحی نشانات۔

عضلہ باسط ابہام حقیقی (ext. prop. poll.) = عضلہ باسط ابہامیہ طویلہ (ext. long. poll.)
عظم زورقی (navicular) = سفینیہ (scaphoid) - عظم کبیر (os magnum) = عظم تارکی
(os capitatum) عظم نیم قری (semi-lunar) = عظم قری (os lunatum) - فانہ شکل ہڈی (cuneiform)
= عظم مثلثیہ الزوایا (os triquetrum)

عمیق کفنی محراب کی کھوپ میں بیشتر حصہ لینے کے لئے آگے کی طرف کو نکل جاتی ہے۔ جلد کے نیچے اس فضا پر بالعموم ایک بڑی ورید دکھائی دیتی ہے۔ یہ انگوٹھے کی قیفالی (cephalic) ورید ہے۔ مزید برآں جلد کی کعبی عصب (cutaneous radial nerve) کی انتہائی شاخ کی جانبی قسمت بھی اس فضا کو عبور کرتی ہے۔ ”ناس دانی“ (snuff box) کے فرش پر عظم سفینیہ اور عظم منحرفہ واقع ہوتی ہیں۔ عضلہ باسط ابہامیہ طویلہ (extensor longus pollicis) پہلی بین العظامی

فضا کے راس کو عبور کرتا ہے۔ انگوٹھے کی سسماہنی ہڈیاں اور نیز عظم مخوفہ اور پہلی پس رسی ہڈی کے درمیان کا جوڑ بخوبی شناخت کیا جاسکتا ہے۔ مخوفہ الذکر مفصل ناس دانی کے فرش پر واقع ہوتا ہے۔

ہاتھ کی پشت پر مختلف اوتار اور اوپری وریس صاف صاف شناخت کی جاسکتی ہیں۔ پہلی اور دوسری بعد رسی ہڈیوں کے درمیان پہلا لہری (dorsal interosseous) عضل ہوتا ہے اور جب انگوٹھا انگشت اشاریہ کے ساتھ دبا کر ملا دیا جاتا تو یہ ایک نمایاں فرار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ انگلیوں کی کانٹھوں کی تینوں قطاریں مختلف جوڑوں کی قریبی ہڈیوں سے بنتی ہیں گریہ جوڑوں کے خطوں کی تناظر نہیں ہوتیں، جو پہلے انچ زیادہ نیچے واقع ہوتے ہیں۔ اگر لیمر فراتش کر دیا جائے تو بعد رسی سلامی جوڑ پر بتر کرتے وقت پوشش ناکافی رہ جاتی ہے۔ انگلی کے تینوں جوڑ اپنی تناظر کانٹھوں سے فرداً فرداً $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ انچ نیچے ہوتے ہیں (جیکبسن - Jacobson):

۱۹۱

841

ہتھیلی اور انگلیوں کے سامنے کی طرف کی جلد موٹی اور کثیف ہوتی ہے اور ہاتھ کی پشت کی جلد بہت باریک ہوتی ہے۔ ہتھیلی اور انگلیوں کی سامنے کی اور جانبی اطراف اور اخیر کے سلامیات کی لہری جانب پر بال اور دہنی خدد قطعاً موجود نہیں ہوتے۔ لہذا یہ حصہ ان امراض سے مبرا ہیں جو شعری جرابوں اور ان کے زوائد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی اور سلامیات کی قریبی اور وسطی قطاروں کی پشت پر بہت سے بال اور دہنی جرابات پائے جاتے ہیں۔ خدد عرقیہ کسی دوسرے حصہ کی نسبت ہتھیلی کی جلد میں زیادہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سپی (Sappey) کے مطابق انکی تعداد دوسرے حصوں کے خدد کی نسبت چار گنا ہوتی ہے۔ کراس (Krause) نے اندازہ لگایا ہے کہ ہتھیلی کے ایک مربع انچ پر ۲۸۰۰ خدد عرقیہ کھلتے ہیں۔ ہاتھ کی پشت پر اس تعداد کا تقریباً نصف پایا جاتا ہے۔

ہاتھ کی جلدی عصبی رسد بہت کثیر ہوتی ہے اور پائینی کے جام (Pacinian bodies) جسم کے کسی دوسرے حصہ کی نسبت ہاتھ میں کہیں زیادہ کثرت سے موجود ہوتے ہیں۔ لمسی حساسیت سوائے زبان کی نوک کے جسم کے کسی دوسرے حصہ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ حساس ترین حصہ انگشت اشاریہ کے بعدی یا ناخن سلامیہ کی کئی سطح ہوتی ہے اور ہاتھ کی پشت لمسی اثرات کے لئے سب سے کم حساس ہوتی ہے۔ انگلیوں کے سرے حس لمس کے لئے کلائی کے وسطی حصہ کی

جلد کی نسبت جو لمبی اثرات کے لئے جلد کے سب سے کم حساس حصوں میں سے ہے تیس گنا زیادہ حساس ہوتے ہیں۔

ہاتھ کی سامنے کی طرف کی اور خاص کر ہتھیلی کی زیر جلدی بافت قلیل المقدار اور کثیف ہوتی ہے اور یہ چاندنی کی زیر جلدی بافت سے ان امور میں کیس قدر مشابہ ہوتی ہے کہ جلد اس سے قریبی طور پر منقسم ہوتی ہے اور جو چربی اس میں موجود ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکٹوں میں جو حفرہ زوں میں واقع ہوتے ہیں مرتب ہوتی ہے۔ جلد جلدی رابطات سے ہتھیلی اور انگلیوں کی نکیروں پر بستہ ہوتی ہے۔ لہر کی جلدی بافت ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے اور جلد سے اسکا بہت کم ورتعلق ہوتا ہے۔ لہذا ہتھیلی اور انگلیوں کی مقدم جانب پر پہنچ اور خون کی زیر جلدی وعادریوں کا پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، مگر لہر پر یہ وسیع ہوتی ہیں ہتھیلی کی جلد کی کثافت کی وجہ سے اسکا التهاب نہایت درد نغیز ہوتا ہے۔ مگر لہر کی ڈھیلی ڈھالی بافتوں کا التهاب بعض اوقات زیادہ درد پیدا کرنے کے بغیر ہی کسی حد تک ترقی کر جاتا ہے۔

ہتھیلی میں دباؤ اور رگڑ کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لئے بخوبی موافقت پائی جاتی ہے بشرطہ موٹا ہوتا ہے اور جلد منقسم ہوتی ہے اور اسکے عین نیچے کثیف کفی صفاق واقع ہوتا ہے جو کفی اعصاب اور بڑے بڑے عروق کی کافی حد تک حفاظت کرتا ہے اور یہ ضروریہ درکنہ چاہئے کہ ہاتھ کا اگلا حصہ اور خاص کر ہتھیلی سطحی وریڈوں سے خاص طور پر مبرا ہوتی ہے۔ ہاتھ سے جو خون واپس جاتا ہے اسکا بیشتر حصہ حقیقتہً انگلیوں اور ہاتھ کی لہری جانب پر کی وریڈوں کے ذریعہ سے واپس جاتا ہے۔ اسی طرح ہتھیلی کے عروق لف جن سے ایک کثیر العروق زیر جلدی ضفیہ طیار ہوتا ہے ہاتھ کی پشت پر کے بڑے بڑے دراکر عروق لف سے ملتے ہیں۔

ناخن کی شکل مختلف افراد میں کیس قدر مختلف ہوتی ہے اور بعض نئی امراض میں بھی تغیر

ہو جاتی ہے۔ لبقراطی ہاتھ (Hippocratic hand) وہ ہاتھ ہوتا ہے جس میں انگلیوں کے سرے گزرنکل ہوتے ہیں اور ناخن بہت خمیدہ ہوتے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے یہ حالت وریڈی خون کی واپسی میں رکاوٹ پیدا ہونے اور خون کی ناقص اکسیجن رسی (oxygenation) سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ اکثر خلقی عارضہ قلب، دق، دہلی (empyema) اور پیچیدہ طول کے دوسرے مزمن عوارض اور بعض مدداری نورسائوں میں پائی جاتی ہے۔ التهاب کی بہت قوی قسمیں ہیں جو

ناخن کے قالب (matrix) اور اسکے ارد گرد کے متصلہ نرم حصوں پر اثر انداز ہوتی ہیں (ناخن کی گدی کا التهاب: onychia اور و احس: paronychia)۔ اس قسم کے التهابات اس ساخت کی بدشکلی کا باعث ہوتے ہیں۔ جب کوئی ناخن قلع یا چوٹ سے گر جاتا ہے تو نیا ناخن پیدا ہو جاتا ہے بشرطیکہ کچھ عمیق سرخلی خلیات باقی رہ گئے ہوں۔ مرض کے بعد کے زمانہ نقیبت میں ناخنوں پر ایک متعوض میزاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ میزاب ناخن کے اس حصہ کو طار کرتا ہے۔ جو دوران مرض میں بنا تھا اور اس کا خیال رکھنے سے ناخن کی رفتار بالیدگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ناخن فی ہفتہ $\frac{1}{16}$ انچ کی اوسط رفتار سے بڑھتا ہے اور اگر ہاتھ کی حرکت جیروں سے روک دیا جائے تو ناخن کی بالیدگی کم ہو جاتی ہے (ہیڈ: Head)۔ ہر ایک اصبعی عصب سے ایک خاص عظیم الجسامہ شاخ ناخن کے نیچے کے لباب کو جاتی ہے اور اس کثیر عصبی رسد اور اس حصہ میں پھیلنے کی قابلیت موجود نہ ہونے سے اس شدید درد کی توجیہ ہوتی ہے جو ناخن کے نیچے کسی جسم غریب کے گھسنے سے پیدا ہوتا ہے۔


کفی ردا (palmar fascia) یا صفاق (aponeurosis)، متصلی کی جلد کے عین نیچے واقع ہوتا ہے۔ اسکی کثافت اور اسکا کڑا پن اور اعصاب اور عروق کی عدم موجودگی اس میں دباؤ برداشت کرنے اور ماتحت ساختوں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور اسکے ملائم ہونے سے حرکت آزادانہ طور پر واقع ہوتی ہے۔ یہ تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک جانبی اور ایک وسطانی جو علی الترتیب فرازا بہام اور فراز خضر کا غلاف ہوتے ہیں (شکل ۷۶)، اور ایک وسطی جو زیادہ بڑا ہوتا ہے اور متصلی کے زیادہ تر حصہ کی پوشش ہوتا ہے اور اس سے ہر ایک انگلی کو دھچال جاتی ہیں۔ ہر ایک دھچی سے ریشے ٹھکر اوتار کے اصبعی غلاف

جلد اور مستعرض رابطے جاملتے ہیں (نیز دیکھو صفحہ 337)۔ جو مرض دو پیرین کے انقباض

(Dupuytren's contraction) کے نام سے موسوم ہے اس میں کفی ردا کا وسطی حصہ اور خاصکر اصبعی دھچیاں منقبض ہو جاتی ہیں۔ بنصر اور خضر میں انقباض خصوصیت کے ساتھ اور ب سے پہلے نمودار ہوتا ہے قریب اسلامیہ تحصیل کی طرف کچھا ہوتا ہے اور اسکے بعد دوسرا اسلامیہ خیرہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسکی خم کردگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ قریب میان سلامی جوڑ میں

خلع واقع ہو جاتا ہے (ہچنسن: Hutchinson) - تجربہ سے یہ ظاہر ہے کہ اس ردا کو کیٹینچ سے قریبی سلامیہ کو آسانی سے خمیدہ کیا جاسکتا ہے اور وسطی سلامیہ کی خم کردگی بھی کیجا جاسکتی ہے مگر اتنی آسانی سے نہیں۔ (کفنی ردا کا درمیانی حصہ عضلہ راحیہ طویلہ: palmaris longus)

344



شکل ۷۶ - فرازاتِ اہام و خنصر کے وسط میں سے ہاتھ کی افقی تراش۔

(ٹیلو : Tillaux)

- (۱) بعد رشتی ہڈی - ج - پہلا نلہری بین العظامی - ج - عضلہ راحیہ قصیرہ - د - عضلہ مبعده خنصریہ - ع - عضلہ قابضہ قصیرہ خنصریہ - ص - عضلہ مقابلہ خنصریہ - ح - عضلہ قابضہ اہامیہ قصیرہ - ط - عضلہ مبعده اہامیہ قصیرہ - ع - عضلہ مقابلہ اہامیہ - ف - عضلہ مقربہ اہامیہ - ق - عضلہ قابضہ اہامیہ طویلہ - ک - نلہری بین العظامی مضلا - لی - راحی بین العظامی عضلات - م - عضلہ قابضہ سطحیہ - ن - عضلہ قابضہ عمقیہ - و - سطحی راحی شلخ (مشریان) - ۱ - عصب وسطی اور (ایک اندر کی طرف) زندگی شریان اور عصب - ۲ - عین راحی محراب - ۱ - کفنی ردا - ۲ - بیرونی فاصلہ - ۳ - اندرونی فاصلہ - ۴ - ہتھیلی کی عین ردا -

کے وتر کو ظاہر کرتا ہے) - اس مرض میں جلد کی طبی چسپیدگیاں جو ماتحت ردا کے ساتھ ہوتی ہیں حد سے زیادہ خمیدہ ہو جاتی ہیں اور جلد میں تقریت (dimpling) ظاہر ہو جاتی ہے - جو کہ کفنی ردا کے درمیانی حصہ کے نیچے موجود ہوتا ہے وہ جانبین پر بند ہوتا ہے مگر نیچے اور اوپر کی طرف کھلا ہوتا ہے - اوپر کی طرف ایک آزاد فتہ موجود ہوتا ہے جو ملتقنا بارہا کھینچ


پایا جاتا ہے اور قابض اوتار کے ساتھ ساتھ کلائی میں چلا جاتا ہے اور نیچے کی طرف سات راستے ہوتے ہیں جو کئی ردا کے انقسام سے بنے ہوتے ہیں۔ ان سات راستوں میں سے چار مختلف انگلیوں کی جزا پر واقع ہوتے ہیں اور انہیں سے قابض اوتار گزرتے ہیں اور بقیہ تین انگلیوں کی درمیانی جلد کے تناظر ہوتے ہیں اور انہیں سے عضلات قطنیہ (lumbricales) اور اصبعی عروق اور اعصاب گزرتے ہیں۔ لہذا جب ہتھیلی میں کئی ردا کے نیچے پیپ بنتی ہے تو یہ کثیف غشا میں سے آگے کی طرف نہیں آ سکتی بلکہ یا تو انگلیوں کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے اور یا اوپر کی طرف پونچھ میں چلی جاتی ہے۔ کئی ردا اس قدر سخت مزاحمت پیش کرتی ہے کہ مجوس پیپ اپنا راستہ بین العظامی فضاؤں میں سے بنا لیتی ہے اور ہتھیلی کے غلافوں میں سے نکلنے کی بجائے ہاتھ کی پشت پر نکل آتی ہے۔

کئی خراج کھولنے وقت جبکہ اسکا منہ پونچھے سے اوپر بنا ہوا ہو، شکاف
پیش بازو کے طویل محور میں دینا چاہئے اور یہ مستعرض رسنی (مقدم حلقہ نما) رباط سے اوپر ہونا چاہئے اور شکاف عضلہ راجیہ طویل کی اندر کی طرف دینا نہایت مناسب ہوتا ہے کیونکہ اس مقام پر شکاف دینے سے زندگی اور کبریٰ ثریا میں اور نیز وسطیٰ عصب بھی محفوظ رہتا ہے۔
پونچھے کے اوپر کے رباطات **مستعرض رسنی** اور **ظہری رسنی** (حلقہ نما) رباطات سے بستہ ہوتے ہیں اور انہی سے اپنی اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں یہ مستعرض رسنی رباط اس قدر کشف ہوتا ہے کہ ہتھیلی کے وسیع خراجات میں بھی جو پیش بازو تک پہنچ گئے ہوں اور اسکے نیچے کے وتری زلابی غلافوں کے شدید تمدد میں بھی یہ راستہ نہیں دیتا۔ ظہری رسنی رباط کانچے کا کنارہ مستعرض رسنی رباط کی اوپر کی کور کا تناظر ہوتا ہے۔

قابض اوتار کے لبنی غلاف بعد رسنی سلامی جوڑوں سے لیکر بعدی سلامی کے قریب سروں تک پھیلے ہوتے ہیں۔ لہذا بعدی یا ناخن سلامیہ کا لباب (pulp) بالکل گرہ عظمہ پر ہی ممکن ہوتا ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں کے مقابل پر یہ غلاف ڈبیل ڈھالے اور جانبین پر ایک ہوتے ہیں اور بعض اوقات غلافوں کے تصلیبی ریشوں کے درمیان ایسی فضائیں رہ جاتی ہیں

جن میں سے زلابی فٹنا جو غلافوں کا استر ہوتی ہے بروز کر آتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر پیپ کے اس غلاف میں سے نکل آنے کا امکان ہوتا ہے۔ باقی مقامات پر غلاف کثیف اور استوار ہوتے ہیں اور کاٹنے پر بالکل کھلے رہتے ہیں (شکل ۷۷)۔ چنانچہ غلاف کو کاٹنے کے بعد جیسا کہ برتر میں کیا جاتا ہے ایک کھلا مجری باقی رہ جاتا ہے جو ہتھیلی کے اندر تک جاتا ہے اور اگر عملیہ سلائٹ کے

346



شکل ۷۷۔ پہلے سلامیہ کے وسط پر سے افقی تراش -


(نکو: Tillaux کے مطابق)

حاد درجہ میں کیا جائے تو یہ پیپ کے اس حصہ تک منتشر ہونے کو نہایت آسان بنا دیتا ہے۔ اور اگر ایفی غلاف بالکل پُر ہوتے ہیں۔ جہاں وتر غلاف میں داخل ہوتا ہے وہاں وتر پر کسی عقدہ نما بیلد کے پیدا ہونے یا غلاف کی تنگی اور وتر کی عدم یکسانیت موجود ہونے سے ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے جو ”انگشت گرننگ“ (snap finger) یا ”لبلی انگلی“ (trigger finger) کے نام سے موسوم ہے۔ ایسی انگلی کی حسب مرضی بسط کر دی نہیں کیجا سکتی لیکن جب اسکو ہاتھ سے ذرا پیچھے کی طرف ہٹایا جاتا ہے تو یہ ”جیسی چا تو کے پھل کی طرح کھٹ کی آواز سے اپنی جگہ پر آ جاتی ہے“

(ایبے: Abbe)۔

چھنگلی کا خلقی انقباض "خفیف سی مقدار میں خاص کر لڑکیوں میں بہت عام ہوتا ہے۔
نمایاں واقعات میں قریبی سلامیہ پیش بسط کردہ ہوتا ہے اور درمیانی خم کردہ ہوتا ہے۔ اسی قسم کے
واقعہ میں لاکٹ ووڈ (Lockwood) نے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ حالت جوڑ کے سامنے کے لمبی غلاف

347



شکل ۷۸۔ پونچے کا مقدم حلقہ نما رباط اور پونچے اور ہاتھ کے زلابی غلاف۔ ہاتھ کی
لیکیریں سیاہ خطوں سے ظاہر کی گئی ہیں۔ زلابی غلاف سرخ دکھائے گئے ہیں۔
مقدم حلقہ نما رباط = مستعرض رسی - کلاب نما (unciform) = عظم حلقائی

(or hamatum)

کے انقباض سے پیدا ہوئی تھی۔ داس کے بعد انگلی میں جو انقباض واقع ہوتا ہے وہ اتار کے
اپنے اپنے غلافوں سے منقسم ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

زلابی تاجہ جات اور غلاف متعرض رسی رباط کے نیچے اتار قابض کے لئے

دو زلابی تاجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عضلہ قابض طولی ابھی (flexor longus pollicis)
کے لئے ہوتا ہے اور دوسرا عضلات قابض سطحیہ اور عرقیہ کے لئے (شکل ۷۸)۔ قبل الذکر پیش بازو میں

اس رباط سے ۱۔ انچ اوپر تک جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عضلہ کے انتہی تک پہنچ جاتا ہے جو انگوٹھے کے آخری سلامیہ پر ہوتا ہے۔ موخر الذکر مستعرض رباط سے ۱۔ انچ اوپر سے شروع ہوتا ہے، اور چاروں انگلیوں کے عطفات میں اکڑ ختم ہوتا ہے۔ چھنگلی کے لئے جو زائد ہوتا ہے وہ بالعموم عضلہ قابضہ عقیقہ کے انتہی تک جاتا ہے جو ناخن سلامیہ پر ہوتا ہے۔ بقیہ تین عطفات تناہ بعد رسنی ہڈیوں کے تقریباً نصف پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ انگشت اشاریہ وسطیٰ اور بنصرہ کے اوتار کے اصبعی حصہ کے جو زلابی غلاف ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف بعد رسنی ہڈیوں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ عظیم زلابی تاجہ سے جو مستعرض رسنی رباط کے نیچے ہوتا ہے تقریباً ۱۔ انچ کے فاصلہ پر ہوتے ہیں۔ لہذا انگوٹھے اور چھنگلی کے سروں سے ایک کھلا مجری شروع ہو کر کلائی میں پونہچے سے ۱۔ انچ اوپر تک جاتا ہے۔ اس ترتیب سے اس مشہور و معروف امر کی توضیح ہوتی ہے کہ انگوٹھے اور چھنگلی کے خراجوں سے کلائی کے خراج پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر بقیہ انگلیوں میں تعیق واقع ہونے کے بعد ایسی پیچیدگی عام طور پر پیدا نہیں ہوتی جہاں عضلات قابضہ کا زلابی تاجہ سخت اور کڑے مستعرض رسنی رباط کے نیچے سے گزرتا ہے وہاں یہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اس لئے ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب یہ تاجہ سیال یا پیپ سے متع ہو جاتا ہے تو اسکا خاکہ شیشہ ساعت (hour-glass) کے خاکہ کی طرح کا ہوتا ہے اور شیشہ ساعت کی کمر اس رباط کی تناظر ہوتی ہے۔ اس رباط کے نیچے کے دونوں زلابی تاجے بعض اوقات ایک دوسرے سے ربط و راہ رکھتے ہیں۔ عضلہ قابضہ ریکیہ (flexor carpi radialis) کا و تر مستعرض رسنی رباط کے انتہی کو جو عظم منخرقہ (trapezium) پر پایا جاتا ہے منقبت کرتا ہے۔ اسکے ارد گرد ایک زلابی غلاف پایا جاتا ہے (شکل ۷۸)۔

داحس (whitlow) کی غلافی قسم میں جس میں پیپ انگلیوں کے و تر

کے زلابی غلافوں میں موجود ہوتی ہے، انگشت اشاریہ وسطیٰ اور بنصرہ کے ماؤف ہونے کی حالت میں تعیق اکثر اعتام غلاف پر دفعۃً ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی تناظر بعد رسنی ہڈیوں کی گردن کے بالمقابل داحس کی ایک اور قسم (انگلی کے سرے کے لباب کا خراج) میں تیسرے سلامیہ کا در عظمہ آسانی متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ اس ہڈی پر کوئی حائل و تری غلاف موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس عارضہ میں ہڈی اکثر متخثر ہو جاتی ہے اور باہر نکل آتی ہے۔ لیکن

تمام سلامیہ شاذ و نادر ہی تباہ ہوتا ہے۔ اس ہڈی کے قاعدہ کے اوپر کا حصہ بالعموم صحیح و سالم رہتا ہے، اور یہ غالباً عضلہ قابضہ عمیقہ کے منہ کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس ہڈی کا قاعدہ ایک برالہ ہوتا ہے جو پوری سے اٹھا روئیں یا بیسویں سال تک متحد نہیں ہوتا۔

داحسوں کے کھولنے کا طریقہ تشریحی نقطہ نگاہ سے اسقدر اہم ہے کہ

اسکا ذکر کر دینا یہاں مناسب ہوگا۔ زیر بشری اور زیر جلدی قسم میں جو انگلی کی گدیوں میں اتار کر چسپیدگیوں سے آگے واقع ہوتی ہے کوئی خاص تشریحی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن زیر ناخن اور غلافی قسموں میں دقیق پیش آتی ہیں۔ جب ناخن کے نیچے پیپ جمع ہو جائے تو صرف ناخن کا دور کر دینا ہی عموماً کافی نہیں ہوتا، بلکہ جلد کے وی (V) کی شکل کا حصہ جو ناخن کے قاعدہ کے اوپر لٹک رہا ہو کاٹ دینا یا اسکے ایک ذواربعتہ الاضلاع رقبہ کو اوپر کی طرف کو الٹا دینا مناسب ہوتا ہے تاکہ نشست گاہ ناخن معرا ہو جائے اور اسکی سیلیٹ ہو سکے۔ اگر پیپ غلاف میں ہو تو ہر ایک سلامیہ کی جانبوں پر اچھی طرح شکاف دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سلامی غلاف اطراف پر ہی کمزور ترین ہوتا ہے، اور یہاں ہی سے پیپ کے اس کو پھاڑ کر مکمل آئینکا امکان ہوتا ہے۔ اگر مناسب ہو تو ایسے شکافوں کو ترجیح دینا چاہئے جو جوڑوں کے بالمقابل متوقف ہوں، کیونکہ میان سلامی اور بعد رسی سلامی جوڑوں کے بالمقابل بافتوں کو کاٹنے سے احتراز کرنے سے وتر کا میکانیٹی سہارا برقرار رہتا ہے اور جو خمیدگی اور فقدان قوت دوسری حالت میں نمودار ہو سکتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جب پیپ کتنی تاچہ میں ہوتی ہے تو شکاف ماؤف وتر کے خط پر دینے چاہئیں، لیکن اس امر کا لحاظ ضرور رکھنا چاہئے کہ انگوٹھے اور چھنگلی کے غلافوں کو سرائت زدہ نہ کیا جائے۔

جب پیپ ملحقہ مارباٹ کے نیچے سے پھیل کر کلائی کیے نیچے کے ۱/۱۱ کے حصہ میں جاتی ہے تو یہ عضلہ کاہ مربعہ (pronator quadratus) اور عضلہ قابضہ عمیقہ (flexor profundus) کے درمیان کے لیول پر سے گزرتی ہے، اسلئے شکاف کعبی اور زندی حاشیوں پر دینے چاہئیں تاکہ وتروں اور وسلی عصب کو نقصان پہنچائے بغیر اوپر اٹھا کر قعبی اجتماع تک رسائی کی جاسکے۔

وتر تاچہ میں آزاد نہیں ہوتے بلکہ زلابی غشا کے شکنوں سے اس سے بستہ ہوتے ہیں۔

شدید میوچوں میں بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں اور اوتار کے مغزی عروق بھی جو انہیں واقع ہوتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں۔ ایسے انشقاق کے بعد تاج میں انصباب پیدا ہو جاتا ہے۔ امبسی غلافوں میں یہ شکن تقریباً غائب ہوتے ہیں اور رباط طویل (ligamenta longa) اور رباط قصیر (ligamenta breva) جو ذرا زرا سے ہوتے ہیں وتروں کے سلامی منہاؤں کے قریب انکے واحد قائم مقام ہوتے ہیں۔ زلابی تاجوں کا استر فلسمانی مرحلہ کا ہوتا ہے اور اس حصہ کے عروق لف سے اسکا نہایت آزادانہ راہ و ربط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے کہنفوں سے سرانستی مادہ بہت جلد جذب ہوتا ہے اور نیز الہتابی اعمال اسی لئے غلافوں کے ساتھ ساتھ باسانی پھیل سکتے ہیں اور اس سے انکے اندر کے وتروں کے درمیان انضمام طیار ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے انضمام کے فیضا و تعضیافتہ ہونے سے وتر مثبت ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اگر لڑ جاتی ہیں اور کیکار ہو جاتی ہیں۔ الہتاب کے رفع ہو جانے کے جلد بعد صرف پونہچے اور انگلیوں کی فاعلی اور انفعالی حرکتیں شروع کرنے ہی سے غلافوں اور وتروں کے درمیان انضمام پیدا ہونے کا سد باب کیا جاسکتا ہے۔

نلہری رسنی رباط کے نیچے وتروں کے لئے جھ زلابی غلاف ہوتے ہیں اور یہ ان جھ قنالوں کے متناظر ہوتے ہیں جو اس رباط سے بنتی ہیں۔ جس غلاف میں وتر زلابی الہتاب (teno-synovitis) کے پیدا ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے وہ عضلہ بعدہ طویلہ ابہامیہ (abductor longus pollicis) اور عضلہ باسطہ قصیرہ ابہامیہ (extensor brevis pollicis) کا غلاف ہے۔ یہ کعبری زائدہ ابریہ سے ۳ انچ اوپر سے شروع ہو کر پہلے رسنی پری رسنی جوڑ تک جاتا ہے۔ دوسرے غلاف اوپر کی طرف نلہری رسنی رباط کے بالائی کنارہ تک پہنچتے ہیں مگر دونوں کعبری باسطات کے غلاف اس رباط سے تقریباً ۱ انچ اوپر سے شروع ہوتے ہیں۔ عضلہ باسطہ مشترکہ (extensor communis) اور عضلہ باسطہ خفصر (extensor minimi digiti) کے غلاف بعدی رخ میں بعد رنغیہ کے وسط تک جاتے ہیں۔ لیکن عضلہ باسطہ اشاریہ (extensor indicis) کا غلاف بعد رنغیہ تک مشکل ہی سے پہنچتا ہے۔ دوسرے غلاف اوتار کے ساتھ ساتھ ان کے منہاؤں تک جاتے ہیں۔ ان غلافوں کے زلابی استر اور شکن کائیس کے کسر (Colles's fracture) میں مجروح ہو جاتے ہیں اور اگر انضمام کا اسناد نہ کیا جائے تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

عروق خون اور عروق لمف - ہاتھ میں رسد خون بہت کافی مقدار میں

ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ لباب انگشت جسم کے نہایت کثیر العروق حصول میں سے ہے۔ کئی محرابوں کے محل کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ کسی ایک کئی محراب کا خون اکیلی کعبی یا زندگی شریان کو باندھنے سے بند نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان محرابوں کا تعلق دونوں عروق سے ہوتا ہے۔ مزید برآں ان دونوں عروق کو بیک وقت باندھنے سے بھی کوئی بہتر اثر نہیں ہوتا جسکی وجہ یہ ہے کہ کئی محرابوں اور بین العظامی عروق کے درمیان تغم موجود ہوتا ہے۔ دونوں کئی محرابوں کا تغم بڑے بڑے عروق کے تغود اور اس ربط و راہ سے قائم ہوتا ہے جو سطحی محراب کی اصبغی شاخوں اور زیادہ گہرے عروق کی کئی بین العظامی شاخوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ ہتھیلی کے جریان خون میں کعبی اور زندگی شریانوں کا بیک وقت باندھنا بھی بعض اوقات ایسے واقعات میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا ہے جنہیں محرابوں کے ساتھ یا تو بڑے بڑے غیر طبعی بین العظامی عروق اگر کثرت متحد ہونے ہیں اور یہ کم و بیش طور پر ایک قائم مقام ہوتے ہیں اور یا انہی جگہ ایک بڑی ”وسطی شریان“ موجود ہوتی ہے۔ جب محرابوں کا کعبی یا زندگی حصہ ناقص ہوتا ہے تو نقص کسی دوسرے عرق سے پورا ہوتا ہے اور یہ معلوم کرنا مناسب ہوگا کہ یہ کمی زیادہ کثرت کے ساتھ یا تو سطحی محراب میں پائی جاتی ہے یا زندگی محراب میں۔

جس مقام پر کعبی شریان ہاتھ کی پشت پر سے ہو کر ہتھیلی کے گہرے حصہ میں داخل ہوتی ہے وہاں یہ انگوٹھے کے رسنی بعد رسنی جوڑ کے ساتھ قریبی تھاس رکھتی ہے (شکل ۷۵)۔ اگر کبھی سالم انگوٹھے کا بتر کیا جائے تو اس امر کو ضرور یاد رکھنا چاہئے۔ مزید برآں پہلی بعد رسنی ہڈی کے اتصال خربی میں بھی اسکا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر سطحی راحی شریان عظیم الجسامتہ ہو تو اس سے بعض اوقات خطرناک جریان خون واقع ہوتا ہے۔ یہ شریان ستر عرض رسنی رباط کی سطح سے منقسم ہو جاتی ہے اور اسلئے جب یہ زخمی ہو جاتی ہے تو اسکا پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔

چونکہ انگلیوں اور ہاتھ کی پشت پر کے عروق لمف زیادہ بڑے اور تعداد میں بھی زیادہ ہوتے ہیں اسلئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان حصوں کے زخموں کے بعد ہتھیلی کے زخموں کے مقابل میں التهاب عروق لمف (lymphangitis) زیادہ کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔

ہڈیاں اور جوڑ۔ بعدی کعبی زندگی جوڑ کو ایک مضبوط مثلثی لیبی غضروف

(مفصلی قرص) سہارے ہوتا ہے۔ اور ان ہڈیوں کے درمیان جو رابطی تعلقات موجود ہوتے ہیں انہیں سے یہ مضبوط ترین اور اہم ترین ہوتا ہے۔ عضلہ باسط خضریہ (extensor quinti digiti) کا زلابی غلاف بعض اوقات اس جوڑے سے مربوط ہوتا ہے اور اس لئے اس مفصل کے مرض سے یہ بھی ماؤف ہو سکتا ہے۔

352

پونچے کے جوڑ کی قوت کا انحصار اتنا اسکے میکانیکی خاکہ اور رابطات

پر نہیں ہوتا جتنا کہ ان کثیر التعداد مضبوط اوتار پر ہوتا ہے جو اسکے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور اس مفصل کے قریب کی ہڈیوں سے قریبی طور پر بستہ ہوتے ہیں۔ مزید برآں پونچے کی حالت میں طویل بریم جوڑ کی بعدی جانب پر نہیں پایا جاتا۔ راجی کجری رستنی رابطہ اس جوڑ کا مضبوط ترین رابطہ ہوتا ہے مگر ظہری کمزور ترین ہوتا ہے۔ قبل الذکر ساخت بسط کردگی کو اور موثر الذکر خم کردگی کو محدود رکھتی ہے۔ لیکن پھر بھی جبری بسط کردگی سے پیدا شدہ تضر بہت زیادہ عام ہوتا ہے کیونکہ جب کبھی آدمی ہاتھ کے بل کرتا ہے تو ہاتھ کی پشت (جبری خم کردگی) کے بل گرنے کے مقابلہ میں زیادہ تر ہتھیلی (جبری بسط کردگی) کے بل ہی کرتا ہے۔ ظہری رابطہ کے پتلا ہونے اور نیز جوڑ کے پچھلے حصہ کے محل کے زیادہ سطحی ہونے کی وجہ سے پونچے کے جوڑ کے مرض میں جو انصاف دکھائی دیتا ہے وہ اول اول ہاتھ کی پشت پر نظر آتا ہے۔

پونچے کے حرکات بین رستنی جوڑ (رستنی ہڈیوں کی پہلی اور دوسری قطا

کے درمیان کا جوڑ) میں بھی اتنی آزادی ہی سے واقع ہوتے ہیں جتنی سے کہ یہ کجری رستنی جوڑ میں واقع ہوتے ہیں (شکل ۵۷)۔ کجری رستنی جوڑ کا محور ایسا ہوتا ہے کہ خم کردگی میں ہتھیلی کا منہ زندی جانب کو ہوتا ہے مگر بین رستنی (mid-carpal) جوڑ پر خم کردگی واقع ہونے کی صورت میں ہتھیلی کجری جانب کی طرف کو حرکت کرتی ہے۔ جب حرکت دونوں جوڑوں پر واقع ہوتی ہے تو یہ رجحانات متوازن ہو جاتے ہیں اور خالص خم کردگی پیدا ہو جاتی ہے۔ عضلہ باسط رستنیہ (extensor carpi ulnaris) کا وتر بین رستنی جوڑ کے محور کے آگے کی طرف اور کجری رستنی جوڑ کے پیچھے کی طرف واقع ہوتا ہے، اسلئے یہ ایک جوڑ میں تو خم کردگی پیدا کرتا ہے اور دوسرے میں بسط کردگی (ایش ڈاؤن: Ashdowne)۔

پوہنیچے پر جو عضلات فعل کرتے ہیں ان سے عضلات کے ان مختلف افعال کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو ارادی حرکت پیدا کرنے میں واقع ہوتے ہیں۔ عضلہ (۱) محرک اعلیٰ (prime mover) کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے اور (۲) منضاد (antagonist) (۳) متحد الفعل (synergie) اور (۴) تیشی عضلہ کے طور پر بھی مثلاً جب انگلیاں خمیدہ ہوتی ہیں تو عمیق اور سطحی قابضات محرکات اعلیٰ ہوتے ہیں اور انکے فعل کے متضادات انگلیوں کے باسط عضلات ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں انگلیوں کے خم کن عضلات پوہنیچے کی خم کردگی میں پیدا کر دیں اگر پوہنیچے کے باسط عضلات بطور عضلات متحد العمل اپنا فعل نہ کریں اور جب انگلیوں کے باسط عضلات اپنا فعل کرتے ہیں تو پوہنیچے کے خم کن عضلات منقبض ہو جاتے ہیں۔ انگلیوں کی خم کردگی اور بسط کردگی میں پوہنیچہ رسیہ کے قابض اور باسط عضلات سے حرکت ناپذیر بنایا جاسکتا ہے اور یہ عضلات اس حالت میں عضلات تشدید کا کام دیتے ہیں۔ چنانچہ حرکت جو بظاہر سادہ معلوم ہوتی ہے عضلات کے گروہوں کے افعال سے پیدا ہوتی ہے اور اسی چیچک کی وجہ سے افعال عضلات کا مطالعہ کرنے کے ذریعہ سے عصبی ضررات کا تشخیص کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پوہنیچے کے عضلات کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ جسم کے تمام عضلات پر بعینہ صادق آتا ہے۔ (دیکھو بریورس کروئین لیکچر سن ۱۹۰۳: Breever's Croonian Lectures, 1903)۔


یہ ایک مشہور و معروف امر ہے کہ قبل اسکے کہ انگلیوں کے خم کن عضلات قوت سے اپنا فعل کریں پوہنیچے کا بسط کردگی کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر پوہنیچہ خم کردہ ہو تو ان کی قوت گرفت زائل ہو جاتی ہے۔ ان تمام حالتوں میں جن میں پوہنیچے کے جوڑے کے اکڑ جانے یا جاکا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے اسکو بسط کردگی (ظہری خم کردگی) کی حالت میں باندھنا چاہئے۔

علاوہ ازیں انگشت اشاریہ، وسطیٰ اور بنصر کے رسیہ بعد رسیہ جوڑوں میں توڑ سی حرکت پائی جاتی ہے۔ گرائنگوٹے اور جھنگلی کے انہی جوڑوں میں حرکت آزادانہ واقع ہوتی ہے اور اسکا محفوظ رکھنا ہاتھ کی عمومی فائدہ مندی کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے (glenoid) (راجی بعد رسیہ سلامی) رابطات انگلیوں کے تین جوڑوں کے سامنے کی طرف پر بعدی ہڈی سے مضبوطی سے پسیدہ ہوتے ہیں مگر قریبی سے ڈھیلے طور پر ہی چپکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعدی ہڈی کے عقبی قلع میں ایسا ہوتا ہے کہ وقبی رابطہ اسکے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اور تو جمیع میں بہت رکاوٹ پیش کرتا ہے۔ اکیلے وسطیٰ اور بعدی سلامیات کو خم کرتے وقت یہ ظاہر ہو جائے گا کہ پہلے

قرنی سلامیہ کا وتر باسط کے ذریعہ سے مثبت ہونا ضروری ہوتا ہے اور عضلات باسط کے شلل میں صرف انہی دونوں جوڑوں کی خم کردگی نامکن ہوتی ہے۔

انگلی کے بعد جوڑ کو ساتھ کے وسطی سلامیہ کو خم کئے بغیر خمیدہ کرنے کی طاقت بہت کم اشخاص میں پائی جاتی ہے۔ لیکن آخری سلامیات کے گرد ونواح کے بعض الہتانی عوارض میں

354



شکل ۷۹۔ کالیں کے کسر کے محل کو ظاہر کرتی ہے۔ زند کا زائده ابیریہ بھی دکھایا ہے۔
زور قوی کے کسر کا عام محل بھی دکھایا گیا ہے۔

سرے کا جوڑ خمیدہ وضع میں مثبت دکھائی دیتا ہے حالانکہ انگلی کے دوسرے جوڑ سیدھے ہوتے ہیں۔ یہ حالت انگلی کے وتر باسط کے جزوی یا مکمل انشقاق سے پیدا ہوتی ہے جو عام طور پر انگلیوں کی انتہائی گمانٹوں پر چوٹ لگنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔

کالیں کا کسر (Colles's fracture)۔ یہ نام ایک کسر کو دیا گیا ہے جو کعبہ کے

نیچے کے سرے میں پونچے کے جوڑے ۱ سے ۱ انچ اوپر تک واقع ہوتا ہے (شکل ۷۹)۔ اس میں ایک معین بدشکلی پائی جاتی ہے اور یہ ہمیشہ بالواسطہ چوٹ مثلاً پھیلے ہوئے ہاتھ پر گرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس امر کے لئے معقول وجہ موجود ہیں کہ ہڈی کو اس مقام پر کیوں ٹوٹنا چاہئے۔ کعبہ کا

نیچے کا سر بہت اسفنجی ہوتا ہے، مگر پوری میں بستہ ہڈی کی بہت مقدار موجود ہوتی ہے۔ مفصلی سطح سے $\frac{3}{4}$ انچ کے فاصلہ پر ہڈی کے یہ دونوں حصے ملتے ہیں اور انہی کثافت کا رجحان جو بہت ہی غیر مساوی ہوتی ہے، اس کسر کو اسی محل میں محدود کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ اس ضرر کے میکا نیسم کے متعلق ابھی تک بہت سی مختلف رائیں قائم ہیں اور اس مضمون پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ پروفیسر چین (Chiene) نے اس ضرر کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ اس ضرر کی نوعیت کے سلسلہ میں جو نظریہ جات عمومی طور پر تسلیم کئے جاتے ہیں انہی کو توضیح بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے۔ کالیں (Colles) کے کسر کی بد شکلی کا انحصار بجا بہ نیچے کے گولے کی غیر وضعیت پر ہوتا ہے۔

یہ غیر وضعیت سر ملضہ ہوتی ہے۔ (ا) غلفی، جہاں تک کلائی کے مقدم موخر قطر کا تعلق ہے۔ (ب) رسی سطح کی غلفی گردش کلائی کے مستعرض قطر پر۔ (ج) اس دائرہ کی قوس پر گردش جس کا مرکز رباط مثلثی کی زندگی سپرڈ پر واقع ہوتا ہے۔ اس دائرہ کا قطر دو خط ہوتا ہے جو رباط مثلثی کی زندگی سپرڈ سے لیکو کبرو کے زائدہ ابریہ کی نوک تک کہنچا جائے۔

۵۰ فیصدی سے زیادہ واقعات میں زندہ کا زائدہ ابریہ بھی اس قوت سے ٹوٹ جاتا ہے جو مثلثی لیغی غضروف میں سے منتقل ہوتی ہے (مورٹن: Morton)۔ اس گردشی غیر وضعیت کی وجہ دونوں زوائد ابریہ کی نوکیں ایک لیول پر آ جاتی ہیں یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبریہ زائدہ زندگی کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تقریباً ہر واقعہ میں ایک ٹکڑا دوسرے میں گس جاتا ہے۔ اوپر کے ٹکڑے کی ٹہری جانب پر جو ٹوس بافت ہوتی ہے وہ (اسی قوت کے تسلسل سے جس سے ہڈی ٹوٹی ہے) اس اسفنجی بافت کے اندر چلی جاتی ہے جو نیچے کے ٹکڑے کی کفی جانب پر ہوتی ہے۔ ایسا صرف بہت نادر الوقوع مثالوں میں ہوتا ہے کہ ٹکڑے اس حد تک ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں۔ ایسے واقعات میں کبریہ زندگی رباطات شائد منقش ہو جاتے ہیں۔ اور نیچے میں کالیں (Colles) کے کسر کی وہ معیاری بد شکلی نہیں پائی جاتی۔ ۱۸۰۰ء واقعات کی جو کالیسٹس کا کسر تشخیص کئے گئے تھے شجاع نگار شوں کا مطالعہ کرنے سے ڈاکٹر آر۔ مورٹن (Dr. R. Morton) نے یہ معلوم کیا کہ ۳ میں کسر او علیہ دونوں موجود تھے اور ۱۱ میں نیچے کا کبریہ بر بالہ

356

علحدہ ہو گیا تھا۔ یہ بر بالہ اتفاقی ضرب سے اکثر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ بیسویں سال کے قریب یہ پوری سے متحد ہوتا ہے۔ اور اسکا مقام اتحاد ایک خط سے ظاہر ہوتا ہے، جو تقریباً افقی ہوتا ہے۔ یہ بر بالہ ایک رنچ پر جو زند کے لئے ہوتا ہے اور عضلہ عضدہ کبریہ کے منتہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب سے امتحان کے لئے شعاع نگاری کے طریقہ رائج ہوئے ہیں اسوقت سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سی چوٹیں جو پہلے موبین تصور کر لی جاتی تھیں فی الحقیقت رسنی ہڈیوں کے کسریا انکی غیر وضعیت یا بعد رسنیہ کے کسر سے پیدا ہوتی ہیں۔

پانچ مفصلی زلابی کہنے ہیں جو رسنیہ سے تعلق رکھتے ہیں (شکل ۸۰)۔ یہ مندرجہ ذیل نکلات پر واقع ہوتے ہیں۔ (ا) رسنیہ اور کلائی کی ہڈیوں کے درمیان۔ یہ بعض اوقات زربا کبریہ زندگی کہنے سے متعلق یعنی غضروف (مفصلی قرص) کے ذریعہ سے راہ و ربط رکھتا ہے۔ (ب) کلاب نما (unciform) ہڈی اور چوتھے اور پانچویں بعد رسنیوں کے درمیان۔ (ج) انگوٹھے کے بعد رسنیہ اور عظم منحرفہ (trapezium) کے درمیان۔ (د) تمام رسنی ہڈیوں کے درمیان جو دوسرے اور تیسرے اصابع کے رسنی بعد رسنی جوڑوں تک پھیلے ہوتے ہیں۔ (ر) عظم مننگہ اور فانا نما ہڈیوں کے درمیان۔ (ب) (ج) اور (د) کہنے اکثر آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ایک بڑا اور پیچیدہ جوڑ بن جاتا ہے۔

سفینیہ (scaphoid) کا کسریا تو مکمل تفصیل کے بل کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور بالابلا واسطہ ضرب کا۔ یہ ناس دانی (snuff-box) کے فرش پر واقع ہوتی ہے اور وہاں اسکا جٹ کیا جاسکتا ہے عظم نیم قمری (semilunar) اکثر اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے اور بعد رسنی ہڈیوں میں سے پانچویں نہایت کثرت سے ٹوٹی ہے

خلوع۔ ا۔ پوہنچے کے جوڑ کے۔ مذکورہ بالا وجہ کی بنا پر یہ جوڑ استعد مضبوط ہوتا ہے کہ رسنی کبریہ خلع نہایت ہی شاذ طور پر واقع ہوتا ہے۔ اور جب کبھی ایسے خلوع واقع ہوتے ہیں تو انہی وجود کی بنا پر یہ بالعموم بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جلد کی دریدگی، اوتار کا اشتقاق، زلابی غلافوں کا ضرر اور ہم پہلو ہڈیوں کا کسریا یا جانا ہے۔

(کفی، وقتی یا راجی معین رباط) رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ صنف سلامیہ سے مضبوطی سے چسپیدہ ہوتا ہے اور طرین پر جانبی رباطات سے ملا ہوتا ہے۔ جب یہ سلامیہ ظلع ہو جاتا ہے تو وقتی یعنی غضروف (glenoid fibro-cartilage) سمسمائی ہڈیاں اور عضلہ قابضہ ابہامیہ قصیرہ (flexor brevis pollicis) کے اوتار بھی اس کے ساتھ ہی ٹل جاتے ہیں اور نیز عضلہ قابضہ طویل کا وتر بعد رسی ہڈی کی گردن کے گرد لپٹ جاتا ہے۔ مگر ترجیع میں زیادہ تر رکاوٹ یعنی غضروف کے بعد رسی کے سر کے پیچھے کی طرف ٹل جانے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جوڑ کی موخر جانب پر شکاف دینے سے تنیدہ ساتیں بغیر کسی شدید نقصان کے ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور جراح اس ظلع کی ترجیع کر سکتا ہے۔

شدید چوٹ سے ایک یا زیادہ انگلیوں کا قلع (avulsion) ہو سکتا ہے۔ ایسی حالتوں

میں جو انگلی علیحدہ ہو جاتی ہے وہ اپنے ساتھ اپنے بعض یا تمام اوتار بھی لے جاتی ہے۔ یہ اوتار علی طول پریش بازو ہی میں سے کچھ آتے ہیں اور انکا طول بعض اوقات معتد بہ ہوتا ہے۔ جب انگلی کے ساتھ صرف ایک ہی وتر ٹوٹ کر نکلتا ہے تو یہ بالعموم عضلہ قابضہ عمیقہ (flexor profundus) کا ہوتا ہے۔


باشبازدہم

جارحہ اعلیٰ کی عصبی رسد

359

سابقہ ابواب میں ہم نے بازو کے ہر ایک عصبی تنے کے جراحی تعلقات کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ اب جارحہ اعلیٰ کی عصبی رسد کا بحیثیت مجموعی بیان کرنا مناسب ہوگا۔ جسم انسان اولاً قطعات میں مرتب ہے۔ کھوپری اور عمود شوکی کے محور کے ساتھ ایک نشری قطعہ کے بعد دوسرا نشری قطعہ واقع ہے اور ہر قطعہ کی اصلی عصبی رسد اپنی ہوتی ہے۔ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ارح دھڑی کی بروں بالید ہیں، ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جسم کا ہر وہ قطعہ جو جو ارح کا متحمل ہے اس کو عصبی رسد بھی ہیا کرتا ہے۔ جنین میں جارحہ اعلیٰ پانچویں چھٹے ساتویں اور آٹھویں عنقی اور پہلے ٹھری قطعوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا انہی قطعات کے شوکی اعصاب ہی عضدی ضغیرہ کی تگوریں میں حصہ لیتے ہیں (شکل ۸۱)۔ اگر ان قطعی اعصاب کے منظم تفرع کو معلوم کرنا ہو تو جارحہ کو ابتدائی یا جنینی حالت میں رکھا ضروری ہے، جس میں باسط یا ٹھری جانب سب سے اوپر ہو اور کمرہ اور انگوٹھا جارحہ کے مقدم یا پیش محوری (preaxial) کنارے پر ہوں اور زند اور چھٹل پس محوری (postaxial) کنارے پر ہوں۔ جب جارحہ اس حالت میں رکھا جاتا ہے (دیکھو شکل ۸۲ ب) تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پانچواں چھٹا ساتواں اور آٹھواں عنقی اور پہلا ٹھری سب کے سب

اعصاب جارجہ کے پیش محوری کنارہ سے لیکر پس محوری کنارہ تک ایک ترتیب سے متفرع ہیں اس ضغیرہ کا وسطی عصب (ساتواں) ہاتھ کے وسطی اصابع کو اور چھٹا ہاتھ کے پیش محوری کنارے اور آٹھواں اسکے پس محوری کنارے کو رسد پہنچاتا ہے۔ پانچواں عنقی اور پہلا نظری علی الترتیب



شکل ۸۱۔ عضلی مرغولی (کعبی radial) عصب کی نظری پیش محوری اور عصب زندی (ulnar) کی بطنی پس محوری ابتدا کو ظاہر کرتی ہے جو عضدی ضغیرہ سے ہوتی ہے۔

بازو اور پیش بازو کے پیش محوری اور پس محوری کناروں کو رسد پہنچاتے ہیں۔ یہ اصلی فلتی اعصاب ہیں لیکن جیسا کہ شکل ۸۱ سے ظاہر ہوگا چوتھا عنقی اور دوسرا نظری شوکی عصب بھی مختلف جہات کے ریٹھے بھیجتا ہے۔ پیش بستہ (prefixed) قسم کے عضدی ضغیرہ (دیکھو صفحات 204 و 205) میں چوتھا عنقی نسبتاً بہت زیادہ حصہ لیتا ہے اور دوسرا نظری کوئی حصہ نہیں لیتا۔

پس بستہ (postfixed) قسم میں اسکے برعکس حالت پائی جاتی ہے۔ نصف یا اس سے زائد عصبی قطعہ کے شوکی تفرع میں کسی حد تک انفرادی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ ضروریہ ذکر کرنا چاہئے کہ فلتی تفرع جلد تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ اس سے جوارح کی تمام عمیق ساختیں اور بالخصوص عضلات متاثر ہوتے ہیں۔

اعصاب کی ایک اور ابتدائی تفریق پر زور دینے کے لئے شکل ۸۱ میں ^{۸۱} ulnar اور عضلی مرغولی (کعبی) اعصاب کے مبادی ظاہر کئے گئے ہیں۔ جو شوکی اعصاب جوارح کی طرف گئے جاتے ہیں وہ فقری سوراخوں میں سے نکلتے ہی بطنی اور ظہری دو قسمتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بطنی کا تفرع جارج کی خم کن جانب پر ہوتا ہے اور ظہری کا اسکی باسط جانب پر۔ یہ معلوم ہو جانا چاہئے کہ زندگی عصب آٹھویں غنتی اور پہلے ظہری سے نکلتا ہے اور عضلی مرغولی عصب پانچویں کے پانچویں اعصاب کی ظہری قسمتوں سے بنتا ہے۔ لیکن اس میں جو حصہ پہلا ظہری لیتا ہے وہ بالعموم ذرا سا ہی ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جانا چاہئے کہ باسط اعصاب کا رجحان پیش محوری اور خم کن اعصاب کا پس محوری ہونے کی طرف ہوتا ہے۔

مزید برآں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عضلہ ایک ہی شوکی عصب کا محتاج نہیں ہوتا۔ عضلی شلخ میں ہمیشہ دو یا دو سے زائد شوکی اعصاب کے ریشے پائے جاتے ہیں۔ لہذا ایک ہی شوکی عصب کے کٹنے سے کسی عضلہ کا صرف جزو شلل ہی نمودار ہوتا ہے اور یہ کسی بھی کٹل نہیں ہوتا۔ جبل شوکی کے اندر کے وہ غلوی مراکز جن سے عضدی ضغیرہ کے عصبی ریشے تعلق رکھتے ہیں فعلی گروہوں میں مرتب ہوتے ہیں۔ اکثر عضلات کا فعل پیچیدہ ہوتا ہے اور ان کا تعلق مختلف افعال یا حرکات سے ہوتا ہے اسلئے یہ ضروری ہے کہ ان تک ریشے مختلف غلوی مراکز سے پہنچیں۔ لہذا یہ ریشے جبل شوکی سے مختلف شوکی اعصاب کے ذریعہ سے نکل کر آتے ہیں۔ کسی عضلہ میں کٹل قتل پیدا کرنے کے لئے تمام شوکی اعصاب کو جن سے اسکی عصبی رسد آتی ہے کا ثنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عضلہ ایک فعل کے لحاظ سے تو مشلول ہو اور دوسرے کے لحاظ سے فعال (کوکن میکنری: Colin Mackenzie)۔ یہ بھی ضروریہ یاد رکھنا چاہئے کہ عضلہ کو صرف حرکی یا درار رسد ہی نہیں ہنہنی، بلکہ اس میں حسی یا برار رسد بھی نہایت افراط سے موجود ہوتی ہے۔

ان نوغوال ذکر ریشوں سے ہم عمیق دباؤ اور انقباض یا درد کا درجہ معلوم کرتے ہیں۔

درآر ریشے جو اتار اور رابطات اور مفصل اور ہڈی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اعصاب کی عضلی شاخوں میں پائے جاتے ہیں۔ جن اعصاب کی ابتدا ان تمام ساختوں سے ہوتی ہے وہ عمیق حس پذیر می کا فعل سرانجام دیتے ہیں۔ جو درآر تہیجات ان اعصاب کے ذریعہ سے منتقل ہوتے ہیں ان سے فتور کی بعض حالتوں میں درد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

سطحی یا جلدی حس پذیر می کے اعصاب جلد میں سے شروع ہوتے

ہیں۔ ہیڈ (Head) اور شیرن (Sherren) کے مطابق جلدی اعصاب کے ریشے دو گروہوں پر مشتمل ہیں۔ (۱) وہ ریشے جو اس حس پذیر می کے فعل کو سرانجام دیتے ہیں جسکو انھوں نے مخز مرضی حس پذیر می (protopathic sensibility) کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ ریشے درخیز تہیجات کو منتقل کرتے ہیں۔ یعنی ایسے تہیجات کو جو تضرر سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً پن کی جھن وغیرہ یا جو ایسے اجسام سے پیدا ہوتے ہیں جسکی تپش جلد کی لمبی تپش سے بہت زیادہ یا کم ہوتی ہے (۲) وہ ریشے جو اس حس پذیر می کے فعل کو سرانجام دیتے ہیں جسکو انہی مصنفین نے برناقد حس پذیر می (epicritic sensibility) کا نام دیا ہے۔ موخر الذکر کم سے کم تین قسموں سے ہوتے ہیں۔ (۱) وہ جو ان تہیجات کو منتقل کرتے ہیں جو کسی ہلکی چیز مثلاً روئی سے چھونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ (ب) وہ ریشے جو ان اشیاء سے پیدا شدہ تہیجات کو منتقل کرتے ہیں جو جسم کی تپش سے بہت زیادہ گرم نہ ہوں۔ (ج) وہ ریشے جو ان تہیجات کو منتقل کرتے ہیں جو ان اشیاء سے پیدا ہوتے ہیں جسکی تپش جلد کی تپش سے بہت کم نہیں ہوتی۔ ہیڈ (Head) اور شیرن (Sherren) کا یہ بیان ہے کہ جب کوئی ایسا جلدی عصب جو ہاتھ یا بازو کے بعد حصہ کو جاتا ہو کاٹ دیا جاتا ہے تو جس رقبہ میں پن کی جھن کی حس پذیر می زائل ہو جاتی ہے وہ اس عصب کے تشریحی تفرع کے رقبہ سے بہت کم ہوتا ہے۔ مگر ہلکے لمس کا فقدان تقریباً تشریحی تفرع کے رقبہ کا متناظر ہوتا ہے (دیکھو شکل ۴ صفحہ ۳۷۵) دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جارحہ کے بعد حصوں میں مخز مرضی حس پذیر می کے متصل نظامات کے تفرع میں ایک بڑی حد تک تراکب

پایا جاتا ہے، مگر اسکے قسری یا قاعدی حصوں میں اسکے برعکس حالت پائی جاتی ہے اور پٹنا (epieritic) نظام میں زیادہ تر اکب پایا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور و معروف امر ہے کہ اگر کسی عصب میں ٹانگے لگنے کے بعد عمل اندام جاری ہو تو اسکے طبعی تفرع کے رقبہ میں سخر (protopathic) حس پذیری برناقد (epieritic) حس پذیری سے پہلے لوٹ آتی ہے۔ مزید برآں یہ امر بھی مشاہدہ میں آچکا ہے کہ جب کبھی کوئی عصب کسی عصبی پٹلی کے مقابل یا کسی مندل ہوتے ہوئے مذہب میں مضبوط ہو رہا ہو تو سخر مرضی حس پذیری کا رقبہ برناقد حس پذیری کے رقبہ کی نسبت زیادہ چھوٹا یا تنگ ہوتا ہے (سٹاپ فورڈ: Stopford) مگر اس امر کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ٹروٹر (Trotter) اور مورسٹن ڈیویز (Morrison Davies) اور ٹائیل (Tinell) جس پذیری کی ایسی واضح تقریبی دریافت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور نیز انھوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ ان حس پذیریوں کے رقبہ جات تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ایک ہی وقت پر لوٹ آتی ہیں۔

جوارح کے اعصاب کے ضغط یا دیگر ضررات میں عرقی حرکی نظام کا

اختلال اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ جارح کی شریانوں کی عرق حرکی رسد پر پروفیسر ونگیٹ ٹوڈ (Prof. Wingate Todd) اور اسکے شاگردوں نے مکرر تحقیقات کی ہے۔ گردن کے جل مشارکی سے ایک خاص شاخ زیر تقویٰ (subclavian) شریان کو جاتی ہے جو اس سے اس کے پہلی سپلی ٹک پہنچنے سے پہلے جالمتی ہے۔ وسطی اور زندگی اعصاب بازو کے پہلے حصے سے گزرتے وقت عضلانی (brachial) اور دوسری شریانوں کو کثیر التعداد شاخیں بھیجتے ہیں۔ یہ عرق حرکی ریشہ عضلانی نہیں ہوتا، تنوں، احوال اور اعصاب میں سے گزرتے ہیں اور جب کوئی دباؤ پڑتا ہے تو انکے خاص طور پر متغیر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ اعصاب کے خلاف مضبوط ہوتے ہیں اور یہ اندر کے عصبی ریشہ جات کی معمولی درجہ کی چوٹ وغیرہ سے محافظت کرتے ہیں عرقی غدود کی بھی جو انگلیوں اور مٹھیلی پر بہت کثرت سے موجود ہوتے ہیں نظام مشارکی سے ایک خاص عصبی رسد ہوتی ہے۔ جو ریشہ مٹھیلی کے عرقی غدود کو جاتے ہیں وہ عصب وسطی میں سے گزرتے ہیں کیونکہ ہاتھ کے ان غدود میں صرف اسی عصب کے کاٹنے یا اس کے مشلول ہو جانے ہی سے اختلال واقع ہوتا ہے۔ ان حالات کے تحت ان سے ایک مشلی افزا بافراط پیدا ہوتا ہے۔

جارج اعلیٰ کے اعصاب کو ضرر پہنچنے سے جو علامات پیدا ہوتی

ہیں انکا انحصار ضرر رسیدہ مقام پر ہوتا ہے۔ اگر پانچواں شوکی عصب اپنے مبدا (جو جبل شوکی میں ہوتا ہے) اور اس مقام کے درمیان جہاں یہ بین فقری سوراخ سے نکلتا ہے عنقی فقرات کے کسریا انکی بوسیدگی سے کچلا جائے تو ضرر کے بعد معین نما عضلات (rhomboids) 364

عضلات شوکیہ (spinati)، عضلہ دالیہ، ذوراسین، عضلہ عضدیہ اور عضلہ عضدیہ کعبیہ (brachio-radialis) میں جزوی یا مکمل شلل واقع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ایک عجیب امر ہے کہ اس ضرر کے ساتھ فقدان حس نہیں پایا جاتا۔ شاید اس امر سے کہ پانچویں عنقی عصب کی منہر جو بہت چھوٹی ہوتی ہے مذکورہ امر کی توضیح میں مدد مل سکے (ڈبلیو ہیرس: W. Harris)۔ انھوں عنقی اعصاب کے مبدا سے عین اوپر جبل شوکی کو ضرر پہنچنے سے بازو کے زدی نصف کی جلد عدیم الحس ہو جاتی ہے اور انگلیوں اور ہاتھ اور پونچے کے عضلات اور نیز کہنی اور کندھے کے بھی کچھ عضلات مشلول ہو جاتے ہیں۔ بازو کے عضلات کے مختلف گروہوں کی تعصیبت کیلئے جو ریشے جاتے ہیں وہ جیسا کہ ہیں ابھی معلوم ہو چکا ہے جبل کے تناظر قطعات سے پانچویں عنقی سے لیکر پہلے ٹھری عصب تک کے تمام اعصاب کے ذریعہ سے بالترتیب نکلتے ہیں۔ جو ریشے کندھے کے عضلات مبعده کے لئے جاتے ہیں وہ پانچویں عصب میں سے گزرتے ہیں۔ اور عضلات مقبرہ کے چھٹے اور ساتویں عصب میں سے اور کہنی کے عضلات قابضہ کے پانچویں اور چھٹے اعصاب میں سے اور ایک عضلات باسطہ کے ساتویں اور آٹھویں عصب میں سے اور پونچے اور انگلیوں کے عضلات باسطہ کے چھٹے اور ساتویں عصب میں سے اور انکے عضلات قابضہ کے آٹھویں عنقی اور پہلے ٹھری میں سے گزرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عنقی شوکی عصب شوکی قنال میں سے اس مقام پر باہر نکلتا ہے جو اس عصب کے بعد کے شوکی عصب کے مبدا کے مقابل ہوتا ہے۔

ہیرنگھم (Herringham) نے جارج بالا کے اعصاب کے اندر کے ریشوں کے معمولی شوکی مبادی اور بڑے بڑے عضلات کی معمولی عصبی رسد کو مندرجہ ذیل طریقہ سے

بیان کیا ہے :-

اعصاب

طویل سیدی - ۵ - ۶ - ۷	صغیر داخلی (وسطانی) جلدی - ۱ -
فوق کتفی - ۵ یا ۵ - ۶	منحن (بغلی) - ۵ - ۶
خارجی (جانبی) جلدی - ۵ - ۶ - ۷	وسطی - ۶ - ۷ - ۸ - ۱
داخلی (وسطانی) جلدی - ۱ یا ۸ - ۱	زندہ - ۸ - ۱
	عضلی مرغولی (کعبی) - ۶ - ۷ - ۸ یا ۵ - ۶ - ۷ - ۸

عضلات


365

۳ - ۴ - ۵ - رافع الکشف	۵ - ۶ - عضلہ والیہ - زیر کتفی عضلہ -
۵ - ۶ - ۷ - معین نام عضلات -	۶ - عضلہ مد لمج کبیرہ - عضلہ کا - مد لمجہ - عضلہ قابضہ ریشیہ
۵ یا ۵ - ۶ - ذوراسین - عضلہ عضلہ - مقدم - فوق شوی	کعبیہ - عضلہ عضلہ کعبیہ - اد عضلہ بالمد - سطحی اہای
اور تحت شوی عضلات - عضلہ مد لمجہ صغیرہ -	عضلات -
۶ یا ۷ - عضلات باسطہ ریشیہ کعبیہ -	۵ - ۶ - ۷ - عضلہ فشاریہ کبیرہ -
۷ - عضلہ غرایبہ عضلہ - عضلہ غریبہ نلہریہ - پیش بازو کی	۷ - ۸ - ۱ - عضلہ قابضہ سطحیہ - عضلہ قابضہ عمیقہ - ریشیہ
پشت پر کے عضلات باسطہ مثلثیہ الرؤس کا بیرونی سر -	طویل اہامیہ - عضلہ کا بہ مریمہ -
۷ - ۸ - عضلہ مثلثیہ الرؤس کا اندرونی سر -	۸ - مثلثیہ الرؤس کا طویل سر - زیر اہای عضلات بین الغضای
	عضلات - عمیق اہامی عضلات -

انگیلیوں کی جلدی عصبی رسد کے متعلق یہ ضروری یاد رکھنا چاہئے کہ

انگوٹھے اور دونوں بیرونی انگیلیوں کی اور منصر کی کعبی طرف کی کفی جانب کو عصب وسطی (median) رسد پہنچاتا ہے! اور بقیہ ایک اور نصف انگی کی اسی جانب کو عصب زندہ (ulnar) سے رسد پہنچتی ہے (شکل ۸۲)۔ انگوٹھے کی نلہری جانب کو جانبی کعبی جلدی عصب (lateral radial cutaneous) اور اشاریہ اور وسطی کی نلہری جانب کو (دوسرے سلامیہ کے قاعدہ تک) عصب کعبی (radial) رسد پہنچاتا ہے اور ان کے دوسرے اور

تیسرے سلامیات کو عصب وسطی (median) سے رمد پہنچتی ہے۔ یہ جھنگلی اور انگشت خاتم کی



366

شکل ۸۲۔ ۱۔ بازو کے قابض یا (راحی) رخ کی جلد پر اکیلے اکیلے جلدی

عصب کا انقسام۔ ۲۔ بغلی۔ ۳۔ بازو کا موٹو جلدی۔ ۴۔ عضل جلدی۔ ۵۔ وسطی۔ ۶۔ زندی۔ ۷۔ وٹلی

۸۔ بین بعلی ذرا عبثی۔

لے اس ام کا خیال رہے کہ دونوں بعد، سلامیات کی ظہری جانب پر کسی لطیفی عصب کا چلانا عمومی قاعدہ کے خلاف ہوتا ہے۔

بقیہ حصہ کو عصب وسطی (median) رسد پہنچاتا ہے (شکل ۸۳)۔ وسطی اور بڑے کے درمیان کی گھٹائی گاہے گاہے عصب زندگی (ulnar) رسد پہنچاتا ہے اور کبھی اس کے کچھ حصہ کو زندگی سے اور کچھ حصہ کو کعبی سے رسد پہنچتی ہے۔ (جن جڑوں اور شوکی قطعوں سے یہ اعصاب تعلق رکھتے ہیں انکی وضاحت شکل ۸۲ اور ۸۳ سے ہو سکتی ہے)۔ ہاتھ کو زیادہ تر رسد ساتویں عصب ہی سے پہنچتی ہے۔ قریب جوار کے شوکی اعصاب معمولی نہائی شاخوں کی طرح اپنے تفرع میں ایک بڑی حد تک متراکب ہوتے ہیں۔ عدم حسیت کا رقبہ تشریحی تفرع کے رقبہ سے ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بازو کی زندگی جانب پر کے اعصاب حمل کے ان قطعات سے آتے ہیں جن سے مشار کی (حسی) اعصاب منکر قلب کو جاتے ہیں۔ ذبحہ صدری (angina pectoris) میں قلب فی الحقیقت درد کا باعث ہوتا ہے لیکن مریض ذریعہ بائیں بازو کی زندگی جانب پر محسوس کرتا ہے اور اسی سے منسوب بھی کرتا ہے۔

368

عضدی ضغیرہ کے نیچے کتنے کا شلل۔ جن مریضوں میں عنقی پسلی موجود ہوتی

ہے، انہیں بازو کے جوہر و شلل کے پائے جانے کا ذکر کیا جا چکا ہے (دیکھو صفحہ 207)۔ ایسا شلل جو عام طور پر سن بلوغ پر پہنچنے کے جلد بعد نمودار ہوتا شروع ہوتا ہے اور جو عورتوں میں مردوں کی نسبت کثرت سے پایا جاتا ہے وہ عضدی ضغیرہ کے سب سے نیچے کتنے کے اس سلی کو دبانے سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ زندگی عصب کا رقبہ تفرع ہی سب سے زیادہ ماؤف ہوتا ہے (شکل ۸۱)۔ وڈ جونز (Wood Jones) نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلی پسلی کا زیر قوی میز اب سب سے نیچے کتنے سے پیدا ہوتا ہے اور نیز اس عصب کا دباؤ بعض حالتوں میں پسلی کو خمیدہ کر دینے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ لہذا یہ امر تعجب خیز نہیں ہے کہ ایسے افراد میں جنہیں عنقی پسلی موجود نہیں تھی سب سے نیچے کتنے کے تفرع میں عصبی احتمال موجود ہونے کے واقعات درج کئے گئے ہیں۔ یہ ناپا ہر ہے کہ سب سے نیچے کتنے جاز کی زیادہ تر عرق حرقی رسد موجود ہوتی ہے، کیونکہ مذکورہ بالا واقعات میں عرق حرقی شلل کی وجہ سے جلد اکثر سرخ اور متورم ہوتی ہے۔

وہ شلل جو ان عصبی ضررات سے پیدا ہوتے ہیں جو ضغیرہ سے نیچے واقع ہوتے ہیں

اگر صریح شغیرہ کا متورم ہونا ایسے ضررات فی الحقیقت توڑے ہی ہیں جن کا اتنے ہی غور سے مطالعہ

کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جتنے غور سے کہ اعصاب کے ضرر کا کیا جاتا ہے۔ ضرر رسیدہ عصب کی تشریح اور فعلیات کے علم ہی کی صرف ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ان مختلف حرکتوں کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے جنکو ہم فیض زائل شدہ فعل کی جگہ بعض اوقات اس خوبی سے سرانجام دیتا ہے کہ تجربہ کار ماہر شخص کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے۔

عضلی مرغولی (کعبی) عصب کو اکثر ضرر پہنچ جاتا ہے۔ اس پر

بغل میں دباؤ ڈر سکتا ہے (عکاز شکل) یا کبھی کبھی عضلی میزاب میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کرسی یا میز کے سخت کنارے پر بازو رکھ کر گہری نیند سو جانے میں (شب ہفتہ شکل) یا یہ ذریعہ کی پوری کے کسر کے بعد دشنبند (callus) سے مجروح یا مضبوط ہو جاتا ہے۔

369

مگر۔ یہ عضدی مضفیہ کی موخر جل سے نکلتا ہے (شکل ۵ صفحہ 204) اور ان تمام شوک اعصاب سے جو مضفیہ میں حصہ لیتے ہیں ریشہ آکر اس میں ملتے ہیں۔ یہ عصب عصبی عرق منڈل کے نیچے سے بغل کو عبور کرتا ہے اور عضلی عصبی میزاب میں ذراعیہ کی موخر جانب کے گرد ایک ترچھے رخ میں پھر جاتا ہے۔ یہاں یہ مثلثہ الرؤس کے اندرونی اور بیرونی سروں کے درمیان اور اس کے لوہل سر کے نیچے واقع ہوتا ہے اور اسکے ساتھ شریان عمیق (profunda artery) بھی ہوتی ہے عضل الدلید (deltoid) کے فہمی اور خارجی سر قذال کے درمیانی فاصلہ کے تقریباً نصف پر یہ خارجی بین عضلی فاصلہ کو منقبت کر کے ذراعین (biceps) اور بالٹھ طویل (supinator longus) کی درمیانی فضا میں چلا جاتا ہے۔ کہنی کے خم پر یہ مندرجہ ذیل شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ (ا) ایک مقدم شاخ جو فافستہ حسی ہوتی ہے اور بالٹھ طویل کے کنارے کے نیچے نیچے چلی جاتی ہے اور اس کے وتر کے نیچے سے گزر کر کعبی جانب کو مل جاتی ہے اور کعبہ کے جانبی حاشیہ کے گرد پھر جاتی ہے اور پو نیچے کی پشت پر تین شاخوں میں تقسیم ہو کر زیر جلدی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ (ب) ایک اہم موخر شاخ یعنی "موخر بین العظامی" (posterior interosseous) جو بالٹھ قصبہ (supinator brevis) میں سے گزر کر کعبہ کی گردن کی بیرونی جانب کے گرد پھر جاتی ہے اور اسکے بعد کلائی کے عضلات کے درمیان آگے بڑھ جاتی ہے اور سب کو محرک شامین سمجھتی ہے۔ بین العظامی رباط کے گرد کر یہ عصب پو نیچے کی پشت پر پہنچ جاتا ہے اور رسنی اور بعد رسنی ہڈیوں کے جوڑوں اور گردن کو ریشہ سمجھتا ہے۔

عضلی مرغولی (musculo-spiral) عصب کا اصلی فعل حرکی ہوتا ہے۔ اس سے مندرجہ ذیل حرکی شاخیں نکلتی ہیں: عضلی مرغولی میز اب میں (۱) مثلثیہ الرؤس کے طویل سہ کو (ج) اس کے اندرونی سر کو (ج) عضلہ مرفقیہ (anconeus) کے بیرونی سر کو۔ (۲) ذوراسین اور باطلہ طویلہ کے درمیان (۱) باطلہ طویلہ کو (ج) عضلہ رسیغیہ کبریہ طویلہ کو۔ (۳) کبریہ کی گردن پر (۱) عضلہ باسط رسیغیہ کبریہ قصیرہ کو (ج) باطلہ قصیرہ کو۔ (۴) کٹائی کی پشت پر (۱) عضلہ باسط رسیغیہ زندیہ کو (ج) عضلہ باسط مشترکہ اصبعیہ کو (ج) عضلہ باسط خنصریہ کو۔ اور اس سے نیچے (۵) عضلہ باسط بعد رسیغیہ ابہامیہ (extensor ossis metacarpi pollicis) کو (۶) عضلہ طویلہ ابہامیہ کو (۷) عضلہ باسط ابہامیہ قصیرہ کو (۸) عضلہ باسط اشاریہ (xtensor indicis) کو۔

حسی شاخیں (۱) ایک داخلی جلدی شاخ جو بازو کے لئے ہوتی ہے بغل کے رین حاشیہ کے بالمقابل نکلتی ہے اور پسلی اندرونی سطح کو زج (olecranon) تک رسد پہنچاتی ہے۔ (۲) ایک خارجی جلدی شاخ جو اس مقام پر نکلتی ہے جہاں یہ عصب ذراعیہ کی کبریہ جانب کے کنارہ کو عبور کرتا ہے۔ یہ بازو کی پسلی بیرونی جانب کو رسد پہنچاتی ہے علاوہ ازیں یہ اس پتلی (دبھی) کو بھی رسد پہنچاتی ہے جو پیش بازو کی پشت پر عضلی مرغولی اور داخلی جلدی اعصاب کے رقبہ جات کے تضرع کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ (۳) مقدم (کبریہ) شاخ پونچھ کی پشت پر تین شاخوں میں منقسم ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شاخیں ابہامی افراز (بیرونی حصہ)، ہاتھ کی پشت کے بیرونی حصہ، انگوٹھے کی پشت اور انگوٹھ اشاریہ اور وسطی کی پشت کو دوسرے سلامتیہ کی اور انگشت خاتم کے ایک ایسے ہی رقبہ کو جو اسکی کبریہ جانب پر ہوتا ہے رسد پہنچاتی ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ محل مضرت کا جو تعلق شاخوں کے مبادی سے ہوگا ضرر کے سرسری مظاہر اسکے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔

عضلی مرغولی شلل میں اگر ضرر اوپر واقع ہو، تو (۱) برط کر دگی کی طاقت کے

فقدان کے ساتھ ہی ایک میزہ اہمیت بھی دیکھنے میں آتی ہے جس میں کہنی نصف خمیدہ ہوتی ہے، ہاتھ اکباب کی حالت میں لٹکا ہوتا ہے، اور انگلیاں کسی حد تک خمیدہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر مشاہدہ قریبی سلامیات کو سہارا دے تو مریض ہر ایک انگلی کے دوسرے اور میرے سلامیہ کی برط کر دگی کر سکتا ہے اور اسکی

وجہ یہ ہے کہ بین العظامی عضلات اور عضلات قطنیہ (lumbricales) سے لیکر باسط وتر کے لمبہ سری پھیلاؤ تک ایک صفائی چسپیدگی موجودگی ہوتی ہے۔ لہذا سرے کے دو سلامیات کو کسی جبریو سے سہارا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ (۲) عضل باسط رسنیہ زندیہ (extensor carpi ulnaris) کے شکل سے پونچنے کی تقریب کمزور ہو جاتی ہے اور یہ حرکت پھر عضل قابضہ رسنیہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) سے کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس حالت میں اسکے ساتھ خم کر دگی بھی موجود ہوتی ہے، کیونکہ باسط متوازن کش زائل ہو جاتی ہے۔ (۳) انگوٹھے کے باسط عضل مشلول ہو جاتے ہیں۔ (۴) بطبع اب بھی (ذو راسین کے ذریعہ سے) کیا جاسکتا ہے جبکہ کہنی نصف خم کر دگی کی حالت میں ہو۔ عضل باطو قصیر (supinator brevis) مشلول ہو جاتا ہے۔ (۵) انگلیوں کی قوت گرفت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ عضلات قابضہ اگرچہ بذات خود متاثر نہیں ہوتے مگر ہاتھ کی خم کر دگی کی حالت کی وجہ سے یہ بخوبی پائصل سرانجام نہیں دے سکتے۔ گرفت کے مضبوط ہونے کا امکان صرف اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جبکہ ہاتھ پہلے باسط کر دگی کی حالت میں ہو۔ (۶) عضل باطو طویل (supinator longus) کی حالت کا خاص طور پر ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عضل اپنے اس نام اور عضلی مرغولی (musculo-spiral) عصب (باسط) سے رسد وصول کرنے کے باوجود اپنے فعل کے لحاظ سے ایک خم کن عضل ہے۔ صحیح سالم بازو میں مریض کی کہنی کو مزاحمت کے مقابلہ میں خمیدہ کرانے سے خاص کر جبکہ اسکی کلائی اکباب اور بطبع فی درمیانی حالت میں یہ بخوبی ابھارا جاسکتا ہے کہنی کی لمبہ سری خم کر دگی میں یہ ذوراسین سے متحد اصل ہوتا ہے۔ محیطی الاصل عضل مرغولی شلل میں یہ اتحاد عمل جو ذوراسین کے ساتھ ہونا ہے زائل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایسے مریض میں جس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ عضلی مرغولی نہ رعضل باطو کو جانے والے عصب کے مہلے سے اوپر واقع ہے، یہ عضل مشلول نہ پایا جائے تو اس امر کے متعلق نہ ورشہ ہونا چاہئے کہ ضرر یا توجڑ میں ہے یا شوکی ہے یا سمومیت سیسہ یا ہسٹیریا (hysteria) سے پیدا ہوا ہے۔

حسی تغیرات غیر اہم ہیں کیونکہ دوسرے اعصاب کی طرف سے بہت سا تر اکب

پایا جاتا ہے۔ اصابع اور ہاتھ کی پشت اور انگوٹھے پر کے سالم رقبہ تفرع میں عدم حسیت شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ لیکن انگوٹھے اور انگشت اشاریہ کی پشت اور وسطی کی نصف پشت پر اور ہاتھ کی پشت کے متناظر حصہ پر یہ اکثر موجود ہوتی ہے۔ کلائی کا جو رقبہ خارجی جلدی تراخ سے رسد

وصول کرتا ہے اسکے وسط میں بعض اوقات ناقص حیدت (hypoaesthesia) کا ایک تنگ رقبہ پایا جاتا ہے۔ تا وقتیکہ نرس بعل میں اونچا واقع نہ ہو ورنہ خلی جلدی شلخ کے تفرع کے خط میں کوئی عدم حیدت نہیں پائی جاتی۔

زندگی عصب (ulnar nerve) ضعیفہ کی اندرونی جل سے شروع ہوتا ہے اور یہ ان ریشوں سے نکلتا ہے جو آٹھویں عقی اور پہلی صدی جردوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ شریان کی وسطانی جانب پر یہ فعل کو عبور کرتا ہے اور پھر یہ بازو میں چلا جاتا ہے جہاں یہ عضدی شریان اور وسطی عصب کے پیچھے رہتا ہے۔ بازو کے نیچے کے ایک تہائی حصہ میں یہ ان ساختوں سے نذر تیج علمذہ ہو جاتا ہے اور بین عضلی فاصل میں سے گزر کر بازو کے موخر خانہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ برکری میزاب میں سے ہو کر عضلہ قابضہ رسیغہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) کے نیچے سے کلائی کے سامنے کی طرف پر آ جاتا ہے اور عضلہ قابضہ رسیغہ زندیہ کی بیرونی کور پر عضلہ قابضہ سطحیہ (flexor sublimis) کے نیچے سے عضلہ قابضہ عمیقیہ (flexor profundus) میں چلا جاتا ہے۔ عظم مشنگہ (pisiform) کے قریب یہ ایک صفاتی قنال میں سے گزرتا ہے جو مقدم حلقہ رباط کی مقدم جانب پر عظم مشنگہ اور کلاب نما (unciform) ہڈی کے ہب کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ یہاں یہ سطحی حسی اور عمیق حرکی دو شاخوں پر منقسم ہو جاتا ہے۔

اسکی حرکی شاخیں مندرجہ ذیل ہیں :- (۱) بازو میں کوئی نہیں۔ (۲) پیش بازو میں (۱) عضلہ قابضہ رسیغہ زندیہ کو (ج) عضلہ قابضہ عمیقیہ کے اندرونی دو بندلوں کو (ہر ایک کو ایک)۔ (۳) ہاتھ میں عمیق کفی شاخ مندرجہ ذیل عضلات کو فروغ دیتی ہے۔ (۱) تمام بین العظامی عضلات کو (ج) دو اندرونی عضلات قطنیہ کو (ج) زیر ابہامی قزاز کے عضلات کو (د) عضلہ قابضہ بہتہ قصیرہ کے اندرونی سر کو (سر) عضلہ مقربہ ابہامیہ کو۔

حسی شاخیں مندرجہ ذیل ہیں :- (۱) کلائی میں (۱) ایک شاخ کلائی کے وسطی ثلث پر نکلتی ہے اور زندی شریان کے ساتھ ساتھ جاکر پونچھے پر سطحی ہو جاتی ہے اور پونچھے کی اندرونی جانب اور زیر ابہامی قزاز کو رسد پہنچاتی ہے۔ (ج) ظہری جلدی (dorsal cutaneous) کلائی کے وسطی ثلث پر نکلتی ہے اور زندی کے گرد گھوم کر پیچھے کی طرف کو چلی جاتی ہے اور وسطی اور زیرین ثلثوں کے مقام اتصال کے قریب سطحی ہو جاتی ہے اور آخر کی ڈیڑھ انگلی اور ہاتھ اور پونچھے کے اس حصہ کو جو اسکا مناظر ہوتا ہے رسد پہنچاتی ہے۔ لہذا یہ ظاہر ہے کہ پونچھے کے سامنے کی طرف پر عصب بندی کو

کاٹنے سے اس حصہ میں عدم حسیت کے نمودار ہونے کی امید نہیں کیجا سکتی۔ ٹہری شاخ صرف قریبی سلامیات کو رسد پہنچاتی ہے اور بعدی سلامیات کو کئی شاخوں سے رسد پہنچتی ہے۔

اس عصب کے ضرر سے جو سریری منطہ ہر پیدا ہوتے ہیں انہیں محل ضرر کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے۔ مگر ضرر کے اسکی پہلی شاخ کے اوپر واقع ہونے کے لحاظ سے ان پر بحث کرنا موزوں ہوگا۔ یہ (۱) حرکتی (عج) حسی (حج) پرورشی ہوتے ہیں۔ عضلہ قابضہ عمقیہ (flexor profundus) کے کچھ حصہ کے مشلول ہو جانے کی وجہ سے اندرونی دو انگلیوں کی ختم کردگی میں کمزوری آجاتی ہے۔

373

عضلہ قابضہ رسیغہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) دوسرے عضلات کے ساتھ پونچھ کی خم کردگی کرتا ہے اور ہاتھ کی تقریب کرتا ہے۔ یہ خم کردگی عضلہ قابضہ رسیغہ کعبیہ (flexor carpi radialis) اور عضلہ راحیہ لولہ (palmaris longus) کے فعل کو بھی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عضلہ قابضہ رسیغہ زندیہ (flexor carpi ulnaris) منقبض نہیں ہو رہا۔ اس حالت میں تقریب اکیلے عضلہ باسطہ رسیغہ زندیہ (extensor carpi ulnaris) کے فعل سے عمل میں آتی ہے۔ لہذا یہ کمزور ہوتی ہے اور اسکے ساتھ بسط کردگی پائی جاتی ہے۔ بین العظامی عضلات اور اندر کی طرف کے دو عضلات قطنیہ کے شمل سے ہاتھ میں ممیز ترین تغیرات واقع ہوجاتے ہیں۔ بین العظامی عضلات کے فرائض حسب ذیل ہیں: ۱) انگلیوں کی وسطی کے خط وسطی سے عبید (ٹہری بین العظامی عضلات) اور تقریب (کئی) کرنا، اور (ب) قریبی سلامیات کو بتعمیل پر خم کرنا اور دوسرے اور تیسرے سلامیات کی بسط کردگی کرنا۔ لہذا ان افعال کو زائل ہوجانا چاہئے اور یہ درحقیقت زائل بھی ہوجاتے ہیں۔ لیکن انکی جگہ تندرست عضلات کو چالاک سے کام میں لانے سے ان وظائف کو سرانجام دینے کی کچھ طاقت ظاہر کیجاتی ہے۔ اگر عصبی ضرر اس مقام سے نیچے واقع ہو جہاں سے عصبی رسد طویل قابضات کو جاتی ہے تو انگلیوں کی خم کردگی اس حالت میں بھی کیجا سکتی ہے۔ لیکن بعد رسیغہ سلامی جوڑوں کی خم کردگی جسکے ساتھ بین سلامی مفصل کی بسط کردگی بھی موجود ہو غیر ممکن ہوتی ہے۔ جیسا کہ ٹینٹیل (Tinel) بیان کرتا ہے۔ خم کردگی انگلیوں کے مستر قی لف (progressive rolling) سے واقع ہوتی ہے جو طویل قابضات کے فعل سے عمل میں آتا ہے۔ مزید برآں دونوں بیرونی عضلات قطنیہ (lumbricales) میں جبکہ عصب وسطی سے رسد پہنچتی ہے

انگشت اشاریہ اور وسطیٰ کے بین العظامی عضلات کے زائل شدہ فعل کا بدل قائم کرنے کی کسب قدرت طاقت موجود ہوتی ہے۔ مزید برآں اگر عضلات علیٰ حالہ ہوں تو انگلیوں کی زائل شدہ تنبید اور تقریب طویل اوتار کے کمزور فعل سے خفیف سی حد تک قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ عضلہ باسطہ مشترکہ (extensor communis) ایک کمزور ممبر ہے اور طویل عضلات قابضہ ضعیف مقرر باست ہیں۔ ابدال (substitution) کی اس قوت سے ایک غیر محتاط مشاہد کو جو یہ امر معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ اس حالت میں تنبید کے ساتھ بسط کردگی اور تقریب کے ساتھ خفیف سی خم کردگی بھی موجود ہے اور یہ حرکت کی وسعت کم ہو گئی ہے دھوکا ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض ہاتھ کو میز پر چٹا رکھ کر انگلیوں کی تنبید اور تقریب نہیں کر سکتا۔ ایسی وضع میں اگرچہ بیرونی عضلات قطنیہ (lumbricales) میں کسی قدر حرکت واقع ہو سکتی ہے مگر انگشت خاتم اور پینگیلی میں کوئی حرکت واقع نہیں ہوتی۔


374

عضلہ قابضہ ابہامیہ قصیر (flexor brevis pollicis) کے شغل کا مظاہرہ مریضی طور پر باسانی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر عضلہ مقربہ ابہامیہ (adductor pollicis) کا شغل اس طریقہ سے آسانی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے کہ مریض کو کاغذ کا ایک تختہ انگوٹھے اور انگشت اشاریہ کے درمیان پکڑا دیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ اس تختہ کو اپنے طبعی ہاتھ سے غیر طبعی ہاتھ میں کیے جیسے طبعی ہاتھ عضلات مقربہ ابہامیہ کو استعمال کرے گا، اور کاغذ کو انگوٹھے کے بعد میسلیہ کے قریبی حصہ اور انگشت اشاریہ کے پہلے مسامیریہ کی پیش جانبی طرف سے پکڑے گا۔ ضرر رسیدہ ہاتھ غالباً عضلہ مقابلہ (opponens) اور طویل قابضات کو استعمال کریگا۔ اور اسکی گرفت انگوٹھے اور انگشت اشاریہ کے آخری سلامیات کے درمیان چپے کی گرفت کی طرح کمزور ہوگی۔ مگر گاہے گاہے مریض اسکی جگہ ایک دوسری چالاکائی سے کام لیتا ہے اور کاغذ کو عضلات باسطہ طویل کے قوی استعمال سے پکڑتا ہے۔ ایسی حالتوں میں ان عضلات کے اوتار اور عاصک پونچے پر عضلات ابہامیہ کے اوتار تندرہ محسوس کئے جاتے ہیں، اور انگوٹھا بائیں طرف کو پھرا ہوتا ہے۔ یہ چالاکائی ایک عورت نے جس میں زندگی شلل موجود تھا بہت اچھی طرح سے دکھائی تھی اور سی سی چوائس (C. C. Choyce) نے اسے دیکھا تھا۔

زیر ابہامی افزاز کے عضلات لاغر ہو جاتے ہیں۔ اور انکے اوپر کی جلد کے طبعی شکن غائب ہو جاتے ہیں۔ ابہامی اور زیر ابہامی افزازات کے غائب ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ چٹا ہو جاتا ہے اور جب مشاہد مریض کے انگوٹھے اور ہاتھ کے درمیان کے حصہ کو انگلیوں سے پکڑتا ہے تو محسوس کی انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں آتا۔

اندرونی دو عضلات قطنیلہ (lumbricales) کے شامل سے بعض اوقات انگشت خاتم اور پچھلی میں خم زدگی پیدا ہو جاتی ہے اور ترجیح پذیر زندگی چنگ (ulnar griffe) کی وضع پیدا ہو جاتی ہے خاص کر جبکہ عضلاتی ہضم عمیقہ علی حالہ ہو۔

عصب وسطی (median nerve)۔ سیکیریونی سر میں وہ ریشے شامل ہوتے ہیں جو چھٹی اور ساتویں عقیقی جڑوں سے آتے ہیں اور عضلی جلدی عصب کے قریب بیرونی جبل سے نکلتا ہے۔



شکل ۸۴۔ عصب زندگی کے کاٹنے کے نتائج (ا۔ ب) اور عصب وسطی کے کاٹنے کے نتائج (ج۔ د)۔

(ہیڈ: Head اور شیرن: Sherren)۔

سیاہ وہ رقبہ ہے جس سے برنا قدس پذیری اور نخر مریضی جس پذیری غائب ہو گئی ہیں۔
نقطہ وار وہ رقبہ ہے جس سے برنا قدس پذیری غائب ہو گئی ہے۔

375

اندرونی سر عصب زندگی کے قریب اندرونی جبل سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں وہ ریشے شامل ہوتے ہیں جو آٹھویں عقیقی اور پہلے ٹھری سے آتے ہیں۔ یہ عصب نقل شریان کے سامنے واقع ہوتا ہے اور پھر زوراسین (biceps) کے اندرونی حاشیہ کے نیچے نیچے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں یہ شریان عقدی سے پیش نما رجی تعلق رکھتا ہے۔ بازو کے نیچے حصہ میں یہ شریان کو عبور کر کے اسکی اندرونی جانب پر پہنچ جاتا ہے۔ عصب زندگی بازو کے ٹکڑے زیرین تک اسکے ساتھ ایسی اندرونی قریبی علاقہ رکھتا ہے لہذا بازو کے بالائی دو تہائی حصوں کے ضرات میں وسطی اور زندگی اعصاب اور عضلہ شریان کو اکٹھا ہی نقصان پہنچتا ہے۔

نیچے کے ایک تہائی حصہ میں عصب وسطی، خط وسطی کی طرف کو چلا جاتا ہے اور پیش مرفعی فضا میں یہ عضلہ عضدیہ (brachialis) کے اوپر اور شریان مذکور کی وسطانی جانب پر واقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ عضلہ کا بہ مدیجہ کعبیہ (pronator radii teres) کے دونوں سروں کے درمیان سے گزر جاتا ہے اور انیس سے جو سر زیادہ عمیق ہوتا ہے وہ اسکو شریان سے علحدہ کرتا ہے یہاں سے یہ عضلہ قابضہ عمقیہ (flexor profundus) کے اوپر سے اور عضلہ قابضہ سطحیہ (flexor sublimis) کے نیچے سے آگے بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ پونچھ کے قریب یہ عضلہ قابضہ رخیہ کعبیہ (flexor carpi radialis) اور عضلہ قابضہ اشاریہ (flexor indicis) کے درمیان تقریباً وسطی ہو جاتا ہے اور پھر مقدم حلقہ نارباط کے نیچے سے گزر کر اندرونی اور بیرونی شاخوں پر منقسم ہو جاتا ہے۔

376

حس کی شاخیں۔ (۱) بازو میں کوئی شاخ نہیں نکلتی۔ (۲) کہنی کے نزدیک شاخیں مندرجہ ذیل ترتیب سے نکلتی ہیں۔ (۱) عضلہ کا بہ مدیجہ کعبیہ کو (پہلا عصب)، (۲) عضلہ باطن مدیجہ کعبیہ کو (دوسرا عصب)، (۳) عضلہ قابضہ رخیہ کعبیہ اور عضلہ رخیہ ٹولیک کو، (۴) عضلہ قابضہ سطحیہ کو۔ (۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷) عضلہ قابضہ اشاریہ کو، (۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو، (۱۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۲۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۳۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۴۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۵۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۶۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۷۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۸۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۱) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۲) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۳) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۴) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۵) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۶) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۷) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۸) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۹۹) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)، (۱۰۰) عضلہ قابضہ عمقیہ کو (دونوں بیرونی سروں کو)۔

حس کی شاخیں۔ (۱) کلائی میں کوئی شاخ نہیں نکلتی۔ (۲) ہاتھ کو جو شاخیں جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ (۱) کفی جلدی (palmar cutaneous) شاخ پونچھ کے عین اوپر سے نکلتی ہے اور ابہامی افرازی کی جلد اور ہتھیلی کو وسطی لیکر تک رسد پہنچاتی ہے۔ (۲) بیرونی انتہائی شاخ انگوٹھے (اندرونی اور بیرونی جانب کو) اور انگشت اشاریہ کی بیرونی جانب کو فروع بھیجتی ہے۔ (۳) اندرونی انتہائی (inner terminal) انگشت اشاریہ کی اندرونی جانب اور وسطی کی دونوں طرفوں اور انگشت اشاریہ کی کعبیہ جانب کو رسد پہنچاتی ہے۔

اصبعی شاخیں سوائے انگوٹھے کی شاخوں کے جس انگوٹھے کو رسد پہنچاتی ہیں اس کے سرے کے

و سلامیات کی پشت کو بھی شائعیں سمجھتی ہیں۔

عصب وسطی کے تغیر سے مندرجہ ذیل سریری مظاہر پیدا ہوتے ہیں بشرطیکہ ضرر مکمل ہو

اور کہنی کے اوپر واقع ہو۔ (۱) اکباب (pronation) زائل ہو جاتا ہے۔ (۲) پوہنیے پر کی خم کردگی بہت کمزور ہو جاتی ہے اور صرف عضلہ قابضہ رشتہ زندہ سے ہی عمل میں آتی ہے جسکو عضلہ باطلہ طویلہ (supinator longus) اور عضلہ باسطہ بعد رشتہ متاخر (extensor ossis metacarpi pollicis) کے اتحاد عمل سے مدد ملتی ہے۔ (۳) انگوٹھے انگشت اشاریہ اور وسطی کی خم کردگی زائل ہو جاتی ہے، مگر عضلہ قابضہ عمیقہ سے انگشت اشاریہ اور چھٹگی کی خم کردگی کچھ سکتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عصب زندگی سے وسطی کے غمتی وتر کو ایک چھوٹی سی شاخ جاتی ہے۔ اس حالت میں اسی انگلی میں خم کردگی کی طاقت موجود رہتی ہے۔ انگشت اشاریہ کو خمیدہ کرتے وقت اگر اس انگلی میں کچھ حرکت واقع ہو تو اس سے مشاہدہ کو مغالطہ نہ ہونا چاہئے۔ یہ حرکت بعض اوقات ان دونوں انگلیوں کے اتار باسطہ کے درمیان صفاتی بند کے کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ڈیجیٹرائٹ (Dejérine) کا کاشف عصب وسطی کا شلل ظاہر کرنے کے لئے مریض کو پوہنیے اور انگلیوں کی خم کردگی کرنے کو کہنے سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ جب مریض اس کرتا ہے تو انگشت اشاریہ میں بست کردگی واقع ہو جاتی ہے۔ جب مریض مضی بند کرتا ہے تو اسکا انگوٹھا خم کردگی اور تقابل کی متحدہ حرکت کرنے کی بجائے بسطہ کردگی کی حالت میں رہتا ہے۔ (۴) کوئی ایسی مہر نہایت نہیں جو اس ضرر کی منظر ہو۔

اگر تغیر کلائی کے نیچے حصہ میں واقع ہو تو مذکورہ بالا حرکتوں میں سے اکثر برقرار رہتی ہیں لیکن ابہامی افزا زنبول ہو جاتا ہے اور عضلہ مبعده ابہامیہ اور عضلہ مقابلہ مشلول ہو جاتے ہیں۔ مگر انکے افعال کا بدلہ جلدی قائم ہو جاتا ہے اور اسلئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قائم ہی ہیں۔ بہر کیف اگر ان ماسعی کا تجزیہ کیا جائے جو مریض تقابل کے لئے کرتا ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ انگوٹھے اور انگلیوں کی خم کردگی سے اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔

حسی نقصان تقریباً اسی رقبہ پر پایا جاتا ہے جسکو یہ رسد پہنچتا ہے لیکن اس کے

حاشی کے قریب عدم حسیت کی جگہ بعض اوقات ناقص حسیت (hypoesthesia) پائی جاتی ہے۔

صحت نامہ

صحیح	غلط	صحیح	غلط
متہج	متہج	إِطْلَاقِي	أَطْلَاقِي
aqueductus	aqueductus	چاہئے	چاہئیں
کردی	کردی	اتصال	اتصال
ورید	ورید	بوسیدگی	ذبول
(ب)	(۲)	دماغ	دماغ
رباط	باط	نظر السرج	نظر السراج
hyoglossus	hyoglossus	ہیں	ہیں -
اوپری	اوپرا	”سماعت الفاظ“ کا	”سماعت الفاظ“
اذینی	اذینی	=	-
حذف کر دیا جائے	عضلہ منحرفہ (م-م)	raphe	raphi
اکثر	کثر	متہج	متہج
وریدوں	وریوں	اور	ور
لوزہ	لوزو	وجہی شلل	جہی استرخا

صحیح	غلط	صفحہ	صفحہ	صحیح	غلط	صفحہ	صفحہ
biceps	diceps	۱۳	۲۸۳	اور	آ اور	۳	۲۳۳
مدلمجہ)	مدلمجہ	۹	۲۸۵	درمیان کے	درمیان کی	۱۲	۲۳۶
پھینکتے	پھینکتے	۱۲	۲۸۸	abdominis	obdominus	۹	۲۳۲
طبعی ہو،	طبعی ہو،	۱۹	۲۹۳	ہوں	ہیں	۹	۲۳۳
ترجیع	ترجیع	۷	۲۹۹	بغل	بغلی	۵	۲۳۵
ہول	بول	۲	۳۰۶	مسدود	مسدود	۷	۷
باطم طویلہ	فوقانی طویلہ	۳۱۷	۳۱۷	پستانی	پستا	۲۳۶	پستانی
پونچے	پہونچے	۱۳	۳۳۰	مفاصل	مفاصل	۱۱	۲۳۷
درمیان پایا جاتا ہے۔	درمیان	۱۶-۱۵	۳۳۹	غضروف	غضروف	۲۱	۷
کلاب نما	کلاب نما ہڈی	۱۵	۳۴۰	رٹوی سکتے	رٹوی سکتے	۱۸	۲۵۰
شکنوں	شکنوں	۲	۳۴۱	دوران	دوران	۴	۲۵۷
ہوتے ہیں (مٹھوری)۔	ہوتے ہیں۔	۷	۳۵۷	brachialis	brachialis	۲۵	۲۶۳
کا	کا۔	۱۱	۳۶۱	آگے	آگے	۱۳	۲۶۷
دالیہ)	دالیہ	۱۳	۳۷۲	جاتا	جانا	۱۷	۷
extensor	xtensor	۹	۳۷۳	فقید المثال	فقید المثال	۲۷۰	۲۷۰

